

اثر دیواره سلولی علوفه فرآیند شده بر روی ترکیب و تولید شیر گاوهای هلشتاین

حمید امانلو^۱، محمد رضا بهشتی^۲ و علی نیکخواه^۳

۱، ۳، دانشجوی دوره دکتری و استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

۲، دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان

تاریخ پذیرش مقاله ۸۰/۹/۷

خلاصه

به منظور تعیین اثر دیواره سلولی انواع علوفه فرآیند شده بر توان تولیدی گاوهای هلشتاین، از چهار جیره که به ترتیب شامل (۱) یونجه هوا خشک، (۲) یونجه نیمه خشک سیلو شده، (۳) ذرت سیلو شده، (۴) مخلوط یونجه خشک و ذرت سیلو شده (به نسبت ۵۰:۵۰) بودند در قالب طرح چرخشی متوازن بر روی ۱۲ راس گاو هلشتاین شیرده در اوایل تا اواسط شیردهی استفاده گردید. جیره‌ها از نظر انرژی خالص شیردهی ۱/۶۵ مگاکالری در هر کیلوگرم ماده خشک، پروتئین (۱۷/۱ درصد) و دیواره سلولی (۳۱/۵ درصد) مشابه بودند. ماده خشک مصرفی گاوهای تغذیه شده با جیره حاوی یونجه نیمه خشک سیلو شده به وسیله گاوها بیشتر از جیره‌های دیگر بود ($P<0/05$)، ولی شیر تولیدی با وجود اینکه از لحاظ عددی بیشتر بود، تفاوت معنی داری بین میانگین‌ها مشاهده نشد ($P>0/05$). همچنین تولید شیر تصحیح شده بر اساس ۳/۲ و ۴ درصد چربی نیز تحت تاثیر منبع علوفه قرار نگرفت. غلظت چربی شیر در مورد جیره حاوی یونجه خشک بیشترین (۳/۸۷ درصد) و در مورد جیره حاوی ذرت سیلو شده کمترین (۳/۲۴ درصد) مقدار را داشت ($P<0/05$) اما غلظت و تولید روزانه بقیه ترکیبات شیر بین جیره‌ها یکسان بود. قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و دیواره سلولی در مورد جیره محتوی مخلوط یونجه خشک و ذرت سیلو شده بیشتر از بقیه جیره‌ها بود ($P<0/05$). جیره‌های حاوی یونجه خشک و یونجه سیلو شده سبب افزایش pH شکمبه شدند ($P<0/05$). اندازه‌گیری ظرفیت بافری علوفه مورد استفاده نشان داد که ظرفیت بافری یونجه خشک و سیلو شده بالاتر از ذرت سیلو شده است که سبب حفظ pH شکمبه و درصد چربی شیر می‌شود.

واژه‌های کلیدی: دیواره سلولی، علوفه، الاف، تولید شیر، ترکیب شیر.

تولیدی گاوهای شیرده از طرف دیگر، سبب شده است که ارقام علوفه‌ای موجود از تامین انرژی مورد نیاز گاوهای پر تولید و در اوج شیردهی ناتوان باشند (۱۲). بنابراین در سیستم‌های پرورشی مرکز^۱ جهت تولید شیر بیشتر، از مقادیر زیادی کنسانتره استفاده می‌گردد.

هر چند امروزه گاوهای شیرده با جیره‌های نسبتاً کم علوفه ولی پر کنسانتره تغذیه می‌شوند، اما دلایل متعددی وجود دارد

مقدمه

علوفه و دیواره سلولی آن نقش مهمی در تامین مواد مغذی مورد نیاز نشخوارکنندگان به ویژه گاوهای شیری و نیز سلامت آنها ایفا می‌کنند. برخلاف دانه‌ها درصد بالایی از ماده آلی بافت‌های رویشی گیاه علوفه‌ای (۳۵ تا ۸۰ درصد)، درون دیواره سلولی آنها قرار دارد. (۱۰). پایین و متغیر بودن قابلیت هضم دیواره سلولی علوفه در اغلب موارد از یک طرف و افزایش توان

مکاتبه کننده: حمید امانلو

1. Haylage

2. Intensive

سطح مشخص NDF تنظیم گردد، توان تولیدی یکسانی از گاوها با استفاده از انواع مختلف علوفه حاصل خواهد شد. به همین منظور جیره‌هایی با انواع مختلف علوفه سیلو شده (ذرت خوش‌هایی، علف باغی، یونجه، گندم و ذرت) با ۳۱ درصد NDF و ۱۸/۱ درصد پروتئین خام تنظیم کرد. نتایج آزمایش نشان داد که هیچ گونه تفاوتی در ماده خشک مصرفی، تولید شیر و ترکیب شیر بین جیره‌ها وجود نداشت. به منظور بررسی متغیر بودن سرعت و مقدار هضم NDF انواع علوفه و اثرات آن روی ماده خشک مصرفی و تولید شیر گاوها هلشتاین اوایل شیردهی، راینسون و مک‌کوین (۲۰) طی آزمایشی با استفاده از سه نوع علوفه سیلو شده در جیره‌هایی با NDF یکسان (۴۵ درصد) نشان دادند که با افزایش تخمیرپذیری الیاف، NDF مصرفی، ماده خشک مصرفی، تولید شیر، چربی و پروتئین شیر افزایش یافت. ابا و آلن (۱۶) نیز اثر منابع مختلف علوفه‌ای و قابلیت هضم NDF را روی توان شیردهی گاوها هلشتاین بررسی کردند. زمانی که علوفه در داخل دو خانواده لگومینه و گرامینه مقایسه شدند، علوفه با NDF قابل هضمتر به مقدار بیشتری مصرف شد و تولید شیر و شیر تصحیح شده بر اساس ۴ درصد چربی افزایش یافت.

امروزه یونجه و ذرت سیلو شده مهمترین علوفه مورد استفاده در اکثر مزارع پرورش گاو شیری محسوب می‌شوند. در ایران یونجه عمدها به صورت خشک و در شرایطی نیز به صورت تازه به مصرف دام می‌رسد. خشک کردن یونجه در مناطق مرطوب و با آب و هوای متغیر معمولاً مشکل بوده و مصرف یونجه تازه نیز خطر نفخ را به همراه دارد و یکی دیگر از مشکلات خشک کردن یونجه، ریزش برگ‌های ترد و شکننده آن است که ارزش تغذیه‌ای بالایی دارند و به همین دلیل برگ‌ریزی معمولاً باعث افت کیفیت یونجه خشک می‌گردد. از طرف دیگر سیلو کردن یونجه به دلیل امکان مکانیزاسیون بیشتر خوراکدهی و کاهش نیروی کار، افزایش سرعت برداشت، کاهش خسارت ناشی از تغییرات آب و هوایی و در نهایت جلوگیری از ریزش برگ‌ها امروزه در اکثر نقاط جهان عملی رایج است. بنابراین به نظر می‌رسد سیلو کردن یونجه به شکلی که مزیت هر دو نوع روش خشک کردن و سیلو کردن را داشته باشد گامی موثر در استفاده هر چه بهتر از این علوفه با ارزش باشد.

که نشان می‌دهد چرا علوفه باید در سطوح بالاتری در جیره نشخوار کنندگان حفظ شود. زمانی که جیره‌ها با مقادیر مناسبی از علوفه تنظیم می‌گردند فعالیت شکمبه و سلامت حیوان در بهترین وضعیت قرار دارد. گاوهای شیرده جهت حفظ فعالیت طبیعی شکمبه و نیز تولید حداقل شیر به مقادیر کافی از دیواره سلولی^۱ (NDF) در جیره نیازمندند (۱۲).

الیاف علوفه‌ای ارتباط نزدیکی با فعالیت جویدن و تحریک pH ترشح بزاویه داشته و از این طریق نقش عمدی در حفظ جیره شکمبه ایفا می‌کنند (۱۱، ۲۵). لذا بخش عمدی از الیاف جیره باید توسط بخش علوفه‌ای تأمین گردد. انجمن ملی تحقیقات^۲ (NRC) جهت تأمین الیاف مورد نیاز گاوها شیرده مقدار ۲۵ تا ۲۸ درصد NDF (بر اساس درصدی از ماده خشک جیره) را توصیه می‌کند که ۷۵ درصد آن باید از طریق علوفه تأمین گردد (۱۵). نتایج تحقیقات نشان داده است که منابع علوفه‌ای (حتی با دیواره سلولی یکسان) از نظر تأمین الیاف مورد نیاز حیوان در یک سطح نیستند بلکه به علت اختلاف در طول ذرات، وزن مخصوص، میزان لیگنینی بودن و میزان آبگیری^۳ تاثیر متفاوتی در تحریک جویدن و نشخوار، حمایت از عمل طبیعی شکمبه و درصد چربی شیر دارند (۹، ۱۴). این خصوصیات موجب ارایه مفهوم الیاف موثر توسط مرتنس (۱۴) گردید.

بیشتر پژوهش‌هایی که در آن‌ها سطوح یکسانی از دیواره سلولی از منابع مختلف علوفه‌ای تأمین شده عملکرد تولیدی یکسانی را نشان داده‌اند. کولنبراندر و همکاران (۵) یونجه نیمه خشک سیلو شده، ذرت سیلو شده و نسبت ۵۰:۵۰ از این دو علوفه را به عنوان منابع علوفه‌ای در گاوهای اوایل شیردهی مورد بررسی قرار دادند همه جیره‌ها دارای ۳۲ درصد NDF و ۱۷ درصد پروتئین خام بودند. ماده خشک مصرفی روزانه (بر حسب درصد وزن بدن) در مورد گاوهای تغذیه شده با جیره حاوی ذرت سیلو شده کمتر بود اما تولید شیر خام، شیر تصحیح شده بر اساس درصد چربی و ترکیب شیر بین جیره‌ها تغییر نکرد. مرتنس (۱۳) نیز فرضیه‌ای را مورد آزمون قرار داد مبنی بر اینکه در صورتی که جیره گاوها شیرده برای یک

1 . Neutral Detergent Fiber

2 . National Research Council

3 . Hydration

کاهش رطوبت به حدود ۴۵ تا ۵۵ درصد به مدت یک شب در سطح مزروعه رها شد تا پژمرده گردید و پس از آن سیلو شد. همچنین از ملاس نیشکر در زمان سیلو کردن یونجه به میزان ۵ درصد استفاده شد. یونجه سیلو شده (با رنگ سبز زیتونی، ۴۱ درصد ماده خشک و pH معادل ۴/۴) پس از ۱۳۰ روز باز شده و مورد استفاده قرار گرفت. ذرت سیلو شده (با رنگ سبز روشن، ۲۵/۵ درصد ماده خشک و pH معادل ۴) نیز از سیلوی ذرت دانشگاه استفاده شد.

جیره‌ها روزانه در دو نوبت صبح و عصر پس از شیردوشی و در حد اشتها در اختیار گاوها قرار می‌گرفت به طوری که ۵ درصد از خوارک روزانه در آخر باقی بماند. جهت تعیین ماده خشک مصرفی روزانه گاوها، باقیمانده خوارک هر روز جمع‌آوری، توزین و پس از تصحیح بر اساس ماده خشک از خوارک روزانه آنها کم می‌شد. جهت تعیین ماده خشک علوفه سیلو شده از آون با دمای ۶۵ درجه به مدت ۷۲ ساعت و در مورد بقیه مواد خوارکی از آون با دمای ۱۰۵ درجه به مدت ۲۴ ساعت استفاده شد.

جهت تعیین پروتئین خام از دستگاه کلداال و جهت تعیین دیواره سلولی و دیواره سلولی منهای همی سلولز از روش ون سوست (۲۶) استفاده گردید. دیواره سلولی موثر^۱ (eNDF) از مقادیر گزارش شده توسط اسپینف و همکاران (۲۳) و بقیه اطلاعات مربوط به مواد خوارکی از جداول NRC (۱۵) به دست آمد.

مجموع شیر تولیدی هر گاو در دو نوبت صبح و عصر، به عنوان تولید روزانه ثبت می‌شد. جهت تعیین ترکیبات شیر هفت‌های یکبار نمونه‌ای از شیر تولیدی روزانه تهیه و پس از افزودن بیکرومات پتابسیم به آن جهت حفظ ثبات نمونه، به آزمایشگاه شیر جهاد سازندگی شهرستان قزوین منتقل و ترکیبات آن (چربی، پروتئین، لاکتوز، مواد جامد بدون چربی و کل مواد جامد شیر) توسط دستگاه میلکواسکن تعیین می‌شد. به منظور تعیین ترکیبات خون، نمونه‌ای از خون هر گاو در روز آخر هر دوره دو ساعت پس از خوراکدهی صبح از محل

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات دیواره سلولی منبع علوفه جیره (یونجه هوا خشک، ذرت سیلو شده، یونجه نیمه خشک سیلو شده و مخلوط یونجه خشک و ذرت سیلو شده) بر روی توان تولیدی و ترکیبات خون گاوهای هلشتاین و بررسی ظرفیت بافری علوفه مورد استفاده بود.

مواد و روش‌ها

در این تحقیق از ۱۲ راس گاو هلشتاین شیرده با میانگین وزن $۶۲۰/۶ \pm ۴۹$ کیلوگرم، میانگین تولید شیر $۲۸ \pm ۲/۸$ کیلوگرم در روز و با میانگین روزهای شیردهی $۵/۷ \pm ۲/۸/۶$ ، در قالب طرح چرخشی متوازن (با ۴ جیره، ۳ دوره، ۴ بلوک و ۳ واحد آزمایشی در هر بلوک) استفاده گردید. گاوها بر اساس فاصله از زایش در ۴ بلوک تقسیم شده و بلوک‌ها به طور تصادفی در ۴ جایگاه مسقف قرار گرفتند. هر گاو در جای خود توسط زنجیر گردنی مقید شده بود و در طول دوره آزمایشی به صورت انفرادی تغذیه می‌شد. آزمایش طی ۳ دوره زمانی متواالی ۲۱ روزه انجام گرفت که بین دوره‌ها به منظور از بین رفتن اثرات جیره قبل و عادت به جیره جدید فاصله‌ای یک هفته‌ای در نظر گرفته شد. گاوها روزانه در دو نوبت صبح و عصر دوشیده می‌شدند و پیش از هر بار شیردوشی به مدت ۱ تا ۲ ساعت در محوطه بهاربند گردش می‌کردند. بستر گاوها روزانه دو نوبت تمیز می‌شد و بستر مجددی از کاه فراهم می‌گردید.

در این آزمایش از چهار جیره جیره غذایی کاملاً مخلوط شده^۱ استفاده گردید که از نظر منابع علوفه‌ای با هم متفاوت بودند بخش علوفه‌ای جیره‌های ۱ تا ۴ به ترتیب عبارت بود از یونجه هوا خشک، یونجه نیمه خشک سیلو شده، ذرت سیلو شده و مخلوط یونجه هوا خشک و ذرت سیلو شده (به نسبت ۵۰:۵۰). جیره‌ها از نظر انرژی، پروتئین خام، پروتئین غیر قابل تجزیه و دیواره سلولی مشابه بودند (جدول ۱).

یونجه خشک از چین دوم یونجه و در مرحله اواسط گله‌ی مزارع دانشگاه زنجان تهیه شد. جهت تهیه یونجه نیمه خشک سیلو شده، از همان یونجه مورد استفاده جهت یونجه خشک (از همان چین و در همان مرحله از بلوغ) مقداری جدا و جهت

جدول ۱- ترکیب مواد خوراکی و مواد مغذی جیره‌ها

جیره				مواد خوراکی
۴	۳	۲	۱	
درصدی از ماده خشک				
۲۰/۱	-	-	۳۹/۸	یونجه خشک
-	-	۳۹/۸	-	یونجه نیمه خشک سیلو شده
۲۰/۱	۴۰/۱	-	-	ذرت سیلو شده
۳۵/۴	۲۵/۰	۴۱/۴	۴۱/۴	جو
۱۰/۰	۱۰/۰	۵/۰	۵/۰	کنجاله تخم پنبه
۷/۸	۱۲/۶	۷/۰	۷/۹	کنجاله سویا
۴/۰	۴/۰	۴/۰	۴/۰	سبوس گندم
۱/۰	۱/۰	۱/۰	۱/۰	آرد ماهی
۰/۳	۰/۳	۰/۳	۰/۳	نمک سفید
۰/۸	۱/۰	۰/۲	۰/۲	کربنات کلسیم
۰/۰	۰/۰	۰/۰	۰/۰	مکمل ویتامینه / مواد معدنی
				مواد مغذی
۱/۶۵	۱/۶۶	۱/۶۶	۱/۶۵	انرژی خالص شیردهی (مگاکالری در کیلوگرم)
۱۷/۰	۱۷/۱	۱۷/۱	۱۷/۲	پروتئین خام (درصد)
۴۲	۲۳	۲۱	۳۰	پروتئین غیر قابل تجزیه در شکمبه (درصدی از پروتئین خام)
۳۱/۲	۳۱/۵	۳۱/۳	۳۱/۵	دیواره سلولی (درصد)
۱۸/۹	۱۷/۹	۱۸/۲	۲۰/۰	دیواره سلولی موثر (درصد)
۱۹/۱	۱۸/۹	۱۹/۲	۱۹/۳	دیواره سلولی منهای همی سلولز (درصد)
۰/۷۷	۰/۸۳	۰/۸	۰/۷۷	کلسیم (درصد)
۰/۴۸	۰/۵۴	۰/۴۶	۰/۴۵	فسفر (درصد)
۱/۶	۱/۰	۱/۷	۱/۷	نسبت کلسیم به فسفر
۲۵/۰	۲۵/۱	۲۵/۸	۲۵/۷	تعادل کاتیون - آئیون جیره ^۱ (میلی اکی والان در ۱۰۰ گرم جیره)

۱- بر اساس فرمول $\text{Na}^+ + \text{K}^+ - \text{Cl}^-$ محاسبه شده است.

داد (جدول ۲) به طوری که ماده خشک مصرفی در مورد جیره حاوی یونجه نیمه خشک سیلو شده بیشترین و در مورد جیره حاوی ذرت سیلو شده کمترین بود. به علت رابطه دیواره سلولی با پرشدگی شکمبه و خوراک مصرفی، برخی محققان (۱۹) اثرات سطح NDF جیره، قابلیت هضم و سرعت هضم آن را بر تغییرات ماده خشک مصرفی گزارش کردند.

با توجه به یکسان بودن سطح NDF بین جیره‌ها به نظر می‌رسید تغییرات ماده خشک مصرفی ناشی از تغییرات قابلیت هضم جیره‌ها باشد، اما نتایج قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و NDF جیره‌ها ممکن است نظریه نمی‌باشد (جدول ۲). این نتایج با نتایج لوکین و همکاران (۱۷)، رابیسون و مک‌کوین (۱۹) و پور و همکاران (۱۸) که هیچ اثر معنی‌داری از تغییر قابلیت هضم NDF جیره روی ماده خشک مصرفی نیافتند مطابقت داشت.

از طرف دیگر نتایج پژوهش‌های محققان دیگر نشان داده است که پژمرده کردن علوفه و افزایش ماده خشک آن پیش از سیلو کردن سبب افزایش مصرف آن نسبت به علوفه خشک یا علوفه مستقیماً سیلو شده می‌شود (۹). همچنین کولنبراندر و همکاران (۵) و بیو چمین و همکاران (۲) نیز ماده خشک مصرفی بیشتری را در مورد یونجه در مقایسه با ذرت سیلو شده مشاهده کردند.

میانگین تولید شیر خام، شیر تصحیح شده بر اساس ۳/۲ درصد و شیر تصحیح شده بر اساس ۴ درصد چربی برای جیره‌های ۱ تا ۴ به ترتیب ۱/۵۱، ۲۶/۵۱، ۲۸/۲۱، ۲۶/۸۴، ۲۷/۹۶، ۲۸/۲۱ و ۲۶/۴۲ کیلوگرم در روز بود که تغییر معنی‌داری بین جیره‌ها دیده نشد هر چند تولید شیر خام از نظر عددی در مورد جیره حاوی یونجه نیمه خشک سیلو شده بیشتر بود (جدول ۲). عدم تغییرات معنی‌دار در تولید شیر را با توجه به تغییرات ماده خشک مصرفی می‌توان به کاهش قابلیت هضم جیره‌هایی که به مقدار بیشتری مصرف شده‌اند (جیره‌های ۱ و ۲) نسبت داد. همچنین نتایج تغییرات وزن بدن و امتیاز وضعیت بدنی نشان داد که گاوها چاق نشده بودند. در بیشتر پژوهش‌هایی که در آنها جیره‌ها با منابع مختلف علوفه در سطح معینی از الیاف تنظیم شده‌اند تفاوت معنی‌داری در تولید شیر دیده نشده است.

ورید دم گرفته شده بلافضلله به آزمایشگاه منتقل و پس از سانتریفوج (۳۰۰۰ دور در دقیقه به مدت ۱۵ دقیقه) پلاسمای آن جدا می‌گردید. نمونه‌های پلاسما در دمای ۲۰- درجه نگهداری و پس از اتمام آزمایش متابولیت‌های پلاسمای خون از قبیل گلوكز، ازت اورهای، کل پروتئین، فسفر، کلسیم و منیزیم توسط دستگاه اسپکتروفوتومتر با استفاده از کیت‌های شرکت پارس آزمون اندازه‌گیری شد.

در هر دوره دوبار از مایع شکمبه گاوها حدود ۳ ساعت پس از خوراک‌دهی صبح و با استفاده از لوله معدی نمونه‌گیری شده و pH نمونه‌ها بلافضلله توسط pH متر اندازه‌گیری می‌شد. جهت اندازه‌گیری pH مدفع در پنج روز آخر هر دوره روزی سه بار و هر بار با یک ساعت تاخیر نسبت به روز قبل نمونه مدفع از طریق راست روده گرفته می‌شد. نمونه‌ها به نسبت ۱:۱ با آب مقطر رقيق شده و pH آن تعیین می‌گشت. به منظور تعیین pH ادرار هر دوره دو بار با استفاده از تحریک دستی مهبل نمونه ادرار گرفته شده و pH آن بلافضلله تعیین می‌گشت.

به منظور تعیین قابلیت هضم جیره‌های آزمایشی از روش خاکستر نامحلول در اسید^۱ به عنوان معرف داخلی استفاده شد (۲۴). جهت اندازه‌گیری ظرفیت بافری علوفه مورد استفاده در این تحقیق، روش والت و همکاران (۲۸) مورد استفاده قرار گرفت. در این روش از تیتراسیون با اسید کلریدریک ۱/۱ نرمال و یا با سود سوزآور ۱/۰ نرمال به ترتیب تا کاهش pH مخلوط به ۴ (ظرفیت بافری اسیدی) و یا افزایش pH مخلوط به ۹ (ظرفیت بافری بازی) استفاده گردید.

تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها توسط نرمافزار آماری SAS (۲۲) انجام گرفت و از آزمون دانکن به منظور مقایسه میانگین‌های حداقل مربعات مربوط به هر صفت در سطح احتمال ۵ درصد استفاده شد.

نتایج و بحث

میانگین ماده خشک مصرفی گاوها که با جیره‌های ۱ تا ۴ (جدول ۲) تغذیه شدند به ترتیب ۲۱/۷۳، ۲۱/۱۶، ۲۱/۰۴ و ۲۱/۱۱ کیلوگرم در روز بود. مقایسه میانگین‌ها اختلاف معنی‌داری ($P < 0.05$) را بین ماده خشک مصرفی جیره‌ها نشان

جدول ۲- میانگین حداقل مرتعات صفات تولیدی در گاوهای تغذیه شده با جیره‌های مختلف

صفت	جیره ها					
	اثر جیره	میانگین خطای استاندار	۱	۲	۳	۴
			۱	۲	۳	۴
ماده خشک مصرفی(کیلوگرم)	ns	۰/۶۳	۲۱/۱۱ ^{a,b}	۲۱/۰۴ ^b	۲۱/۷۳ ^a	۲۱/۱۶ ^b
تولید شیر خام (کیلوگرم)	ns	۲/۴۳	۲۶/۸۴	۲۷/۹۶	۲۸/۲۱	۲۶/۵۱
تولید شیر تصحیح شده (کیلوگرم) ^۱	ns	۲/۲۸	۲۹/۰۳	۲۸/۲۹	۲۹/۲۴	۲۹/۳۷
تولید شیر تصحیح شده (کیلوگرم) ^۲	ns	۲/۱	۲۵/۰۰	۲۴/۸۹	۲۵/۷۴	۲۵/۸۴
چربی شیر (درصد)	ns	۰/۰۴	۳/۶۹ ^b	۳/۲۴ ^b	۳/۴۶ ^{a,b}	۳/۸۷ ^a
پروتئین شیر (درصد)	ns	۰/۱۲	۳/۱۴	۳/۱۵	۳/۱۵	۳/۱۷
چربی شیر (کیلوگرم)	ns	۰/۱۲	۰/۹۸	۰/۹۱	۰/۹۶	۱/۰۱
پروتئین شیر (کیلوگرم)	ns	۰/۰۷	۰/۸۴	۰/۸۷	۰/۸۸	۰/۸۳
لакتوز شیر (کیلوگرم)	ns	۰/۱۶	۱/۲۵	۱/۳۲	۱/۳	۱/۲۴
مواد جامد بدون چربی شیر (درصد)	ns	۰/۳۷	۸/۴۴	۸/۴۶	۸/۳۶	۸/۴۳
مواد جامد بدون چربی شیر (کیلوگرم)	ns	۰/۲۴	۲/۲۰	۲/۳۷	۲/۳۶	۲/۲۳
کل مواد جامد شیر (درصد)	ns	۰/۰	۱۲/۱	۱۱/۸۳	۱۱/۸۵	۱۲/۲۸
کل مواد جامد شیر (کیلوگرم)	ns	۰/۲۰	۳/۲۴	۳/۳۱	۳/۲۳	۳/۲۵
pH شکمبه	۰/۰۰۱	۰/۲۴	۷/۰۹ ^b	۷/۰۳ ^b	۷/۴۸ ^a	۷/۶۹ ^a
pH ادرار	۰/۰۴	۰/۱۵	۸/۰ ^a	۷/۹۴ ^b	۷/۷۸ ^b	۷/۸۳ ^b
pH مدفع	ns	۰/۲۶	۷/۴۶	۷/۶۱	۷/۲۸	۷/۴
تغییر وزن روزانه (کیلوگرم)	ns	۰/۸۵	۰/۲۷	-۰/۲۸	-۰/۰۴	-۰/۰۰۶
تغییر امتیاز وضعیت بدنی	ns	۰/۰۸	۰/۱	۰/۰۳	۰/۱۳	
قابلیت هضم ماده خشک (درصد)	۰/۰۳۷	۹/۱	۶۹/۶ ^a	۶۳/۰ ^b	۶۲/۹۵ ^b	۶۱/۶ ^b
قابلیت هضم ماده آبی (درصد)	۰/۰۱۸	۲/۸۶	۷۰/۶ ^a	۶۲/۶۳ ^b	۶۰/۲۳ ^b	۶۴/۱ ^b
قابلیت هضم NDF (درصد)	۰/۰۱۲	۲/۴۵	۴۸/۲۹ ^a	۴۶/۵ ^b	۴۲/۲۲ ^{b,c}	۴۰/۱۶ ^c

۱ - تصحیح شده بر اساس ۳/۲ درصد چربی ۲ - تصحیح شده بر اساس ۴ درصد چربی

ns - اثر مربوطه معنی دار نیست

- میانگین های هر ردیف که دارای حروف غیر مشترک هستند با هم اختلاف معنی دار دارند.

جدول ۳- میانگین حداقل مرتعات غلظت متابولیت‌های خون گاوهای تغذیه شده با جیره‌های مختلف

صفت	جیره ها					
	اثر جیره	میانگین خطای استاندار	۱	۲	۳	۴
			۱	۲	۳	۴
کلسیم (میلی گرم در دسی لیتر)	ns	۰/۴۴	۷/۲۷	۷/۰۴	۷/۴۷	۷/۴۴
فسفر (میلی گرم در دسی لیتر)	ns	۱/۲۱	۷/۲۶ ^{a,b}	۸/۰۵ ^a	۶/۷ ^b	۷/۸۴ ^{a,b}
منیزیم (میلی گرم در دسی لیتر)	ns	۰/۴۸	۱/۰۸	۱/۶	۱/۶۲	۱/۴۸
گلوبک (میلی گرم در دسی لیتر)	ns	۱۵/۷	۹۷/۶	۱۰۳/۵	۱۱۱/۷۶	۹۲/۹۷
کل پروتئین پلاسمای (گرم در دسی لیتر)	ns	۱/۲۶	۹/۱	۸/۷	۷/۸	۸/۸
ازوت اوره ای پلاسمای (میلی گرم در دسی لیتر)	۰/۰۰۱	۱/۶۳	۱۷/۷۸ ^b	۲۱/۰۵ ^a	۱۸/۷ ^b	۱۶/۹۵ ^a

ns - اثر مربوطه معنی دار نیست

- میانگین های هر ردیف که دارای حروف غیر مشترک هستند با هم اختلاف معنی دار دارند.

a,b,c - میانگین های هر ردیف که دارای حروف غیر مشترک هستند با هم اختلاف معنی دار دارند.

می شود (۱، ۳، ۸). مقادیر برآورده شده دیواره سلولی موثر جیره‌ها (جدول ۱) نیز نشان دهنده تحریک بیشتر ترشح بزاق توسط الیاف موثر در جیره حاوی یونجه خشک است. مسئله دوم ظرفیت بافری مواد خوارکی است که با توجه به ظرفیت بافری اندازه‌گیری شده علوفه در این تحقیق مشخص می‌گردد که ظرفیت بافری انواع علوفه یونجه بالاتر از ذرت سیلو شده است (جدول ۴).

جدول ۴- مقادیر ظرفیت بافری علوفه مورد استفاده در آزمایش

pH	اسیدیته قابل ظرفیت بافری قلیانیت قابل ظرفیت بافری	ذرت سیلو شده		
اولیه	تیتر ^۱	اسیدی ^۲	تیتر ^۳	بازی ^۴
۹۰	۴۵۰	۰	۴	
۱۰۴	۴۸۰	۱۰۰	۴۰	۴/۴
۵۵	۱۶۰	۱۱۹	۲۵۰	۶/۱

(۱) میلی‌اکیوالان‌های HCl مورد نیاز جهت کاهش pH مخلوط به ۴

(۲) میلی‌اکیوالان‌های HCl مورد نیاز جهت کاهش یک واحد pH

(۳) میلی‌اکیوالان‌های NaOH مورد نیاز جهت افزایش pH مخلوط به ۹

(۴) میلی‌اکیوالان‌های NaOH مورد نیاز جهت افزایش یک واحد pH

میانگین pH ادرار گاوها تغذیه شده با تیمارهای چهارگانه نشان داد که بیشترین pH ادرار مربوط به تیمار ۴ (مخلوط یونجه خشک و ذرت سیلو شده) و کمترین pH مربوط به تیمارهای ۱ و ۲ بود. زمانی که بار اسیدی یا بازی به سیستم اسید - باز مایعات بدن تحمیل شود، سیستم‌های بافری بیکربنات و آمونیوم کلیه با افزایش یا کاهش ترشح یون‌های مذکور سبب تنظیم وضعیت اسید - باز بدن می‌شوند. اما با توجه به مشابه بودن تعادل کاتیون - آئیون جیره‌ها، تغییرات pH ادرار مورد انتظار نبود.

pH مدفع گاوها تغذیه شده با جیره‌های ۱ تا ۴، تغییرات معنی‌داری را نشان ندادند. pH پایین مدفع معمولًا نشانگر تخمیر بیشتر در انتهای دستگاه گوارش است و این ناشی از ورود کربوهیدرات‌های قابل تخمیر (مثل نشاسته) به انتهای روده بزرگ است. ظرفیت بافری و ظرفیت تبادل کاتیونی خوارک نیز از عوامل دیگر تغییرات pH در انتهای دستگاه گوارش است (۲۵، ۲۶).

اوکین و همکاران (۱۷) هیچ اثری از تغییر منبع علوفه (یونجه سیلو شده و علف مرغ سیلو شده) در سطوح مختلف NDF روی تولید شیر خام و تصحیح شده در گاوها هلشتاین اواخر شیردهی نیافتند. همچنین کولنبراندر و همکاران (۵) نیز تفاوتی بین میانگین‌های تولید شیر خام و تصحیح شده گاوها یی که از سه جیره مشتمل از یونجه نیمه خشک سیلو شده، ذرت سیلو شده و نسبت ۵۰:۵۰ از این دو علوفه تغذیه شدن، نیافتند.

از بین ترکیبات شیر تنها درصد چربی شیر بین جیره‌ها تفاوت معنی‌داری نشان داد ($p < 0.05$) به طوری که درصد چربی شیر در موردهای جیره حاوی یونجه هوا خشک بالاترین (۳/۸٪ درصد) و در موردهای سیلو شده کمترین مقدار (۲/۴٪ درصد) را داشت (جدول ۲).

عامل اصلی افزایش درصد چربی را در مورد جیره حاوی یونجه خشک می‌توان بالاتر بودن pH شکمبه در مورد این تیمار دانست (جدول ۲). یونجه خشک به دلیل داشتن ظرفیت بافری نسبتاً بالا (۲۵) و تحریک فعالیت جویدن و نشخوار (۱۴، ۱۵) باعث افزایش pH شکمبه و افزایش جمعیت میکرووارگانیسم‌های تجزیه کننده کربوهیدرات‌های ساختمانی می‌شود. با تجزیه سلولز نسبت استات در شکمبه افزایش یافته که پیش‌ساز اصلی سنتز چربی شیر است (۲۵) و چربی شیر افزایش می‌یابد. البته اردمن (۸) با مرور تعدادی از پژوهش‌های انجام شده هیچ رابطه‌ای بین pH شکمبه و درصد چربی شیر نیافت.

تولید روزانه چربی شیر، درصد و تولید روزانه پروتئین، لاکتوز، مواد جامد بدون چربی و کل مواد جامد شیر تغییر معنی‌داری را بین تیمارها نشان ندادند (جدول ۲).

میانگین pH شکمبه گاوها تغذیه شده با جیره‌های ۱ تا ۴ به ترتیب $6/69$, $6/48$, $6/03$ و $6/09$ بود که نشان دهنده تغییر معنی‌دار بین تیمارها بود ($p < 0.05$) به طوری که جیره حاوی یونجه خشک بالاترین pH و جیره حاوی ذرت سیلو شده کمترین pH شکمبه را سبب شدند. بالاتر بودن pH شکمبه در مورد یونجه خشک نسبت به ذرت سیلو شده می‌تواند به دو عامل عملده مربوط باشد. اول این که وجود علوفه خشک در جیره در مقایسه با ذرت سیلو شده معمولًا باعث افزایش زمان جویدن و نشخوار شده و با افزایش ترشح بزاق، جریان بافرهای بزاق به شکمبه افزایش یافته و سبب بافری شدن محیط شکمبه

تجزیه پروتئین و غلظت ازت اورهای خون مقایسه کردند مطابقت داشت. همچنین غلظت فسفر پلاسمای خون نیز در مورد جیره حاوی ذرت سیلو شده بیشتر از بقیه بود ($P < 0.05$) که می‌توان آنرا به بالاتر بودن غلظت فسفر جیره‌اکاهاش نسبت کلسيم به فسفر در مورد اين جيره مربوط دانست (جدول ۱).

ميانگين غلظت کلسيم، منيزيم، گلوكز و کل پروتئين پلاسمای خون بين جيره‌های آزمایشي تغيير معنی‌داری را نشان ندادند. مقادير گلوكز خون گاوهای آزمایشي کاملاً بالاتر از حدود طبيعي گلوكز خون نشخوارکنندگان بود که علتی برای آن یافت نشد (جدول ۳).

مقادير اندازه‌گيری شده ظرفيت بافری علوفه مورد استفاده در اين تحقیق در جدول ۴ ذکر شده است. ظرفيت بافری یونجه خشک جهت جلوگيری از تغييرات pH ناشی از تحمل يك بار اسیدی بيشتر از یونجه نيمه خشک سيلو شده و در مورد اين دو علوفه بيشتر از ذرت سيلو شده بود. انوع علوفه خشبي (مخصوصاً لگومينه‌ها) جدا از اثری که روی تحريك جويدن و نشخوار دارند، داراي ظرفيت بافری بالايی هستند که عمدتاً از خاصيت تبادل کاتيوني ديواره سلولی آنها و تجزيه‌پذيری پروتئين آنها ناشی می‌شود (۲۶، ۲۵). والت و همكاران (۲۸) و جاسيتيس و همكاران (۱۱) نشان دادند که علوفه لگومينه در مقاييسه با خوراک‌های انرژی‌زا و علوفه گرامينه ظرفيت بافری بيشتری دارند. همچنین اردمان (۸) نشان داد که ظرفيت بافری علوفه خشک بيشتر از علوفه سيلو شده است. نتایج اين تحقیق همچنین با نتایج سالیمي و همكاران (۲۱) و وسن سوست (۲۵، ۲۶) که ظرفيت تبادل کاتيوني و ظرفيت بافری بيشتری را برای یونجه خشک و یونجه سيلو شده در مقاييسه با ذرت سيلو شده نشان دادند مطابقت داشت.

با وجود اين که ظرفيت بافری یونجه خشک و سيلو شده بالاتر از ذرت سيلو شده بود (جدول ۴) انتظار می‌رفت pH بالاتری را در روده بزرگ نشان دهند. مقدار بيشتر جو در اين دو جيره ممکن است باعث ورود نشاسته بيشتری به انتهای دستگاه گوارش و خنثی شدن اثرات منابع علوفه‌ای جيره شده باشد.

ميانگين تغييرات وزن بدن و امتياز وضعیت بدنی گاوهایي که با جيره‌های آزمایش تغذيه شدند معنی‌دار نشد. معمولاً ارتباط متقابل و مهمی بين نياز به انرژي، انرژي مصرفی و توازن انرژي در گاوهای شيرده پر تولید وجود دارد. تغييرات در وزن بدن اغلب به عنوان شاخصی از توازن انرژي به کار می‌رود اما تفسير تغييرات وزن بدن مخصوصاً در اوایل شيرده‌ي به دليل پرشدگی شکمبه در اثر افزایش مصرف معمولاً اشتباه است و به همین علت استفاده از امتياز وضعیت بدنی روشی جايگزين جهت ارزیابی توازن انرژي است (۴) با توجه به تغييرات امتياز وضعیت بدنی بين تماره‌های آزمایشي مشخص می‌شود که منبع علوفه جيره اثر معنی‌داری روی توازن انرژي گاوهای نداشته است. از بين متابوليتهای خون که در اين تحقیق اندازه‌گيری شد (جدول ۳)، ميانگين غلظت ازت اورهای و فسفر پلاسمای خون گاوهایي که از ذرت سيلو شده تغذيه شده بودند بيشتر از بقیه ($P < 0.05$) به طوری که ازت اورهای پلاسمای خون گاوهایي که با جيره حاوی ذرت سيلو شده تغذيه شده بودند بيشتر ازت جيره‌ها بود (۲۱/۰۵ ميلي گرم در دسي ليتر). غلظت بيشتر ازت اورهای پلاسمای خون گاوهایي که از ذرت سيلو شده تغذيه شده بودند می‌تواند ناشی از دو عامل باشد: مقدار بيشتر ازت غير پروتئينی در ذرت سيلو شده و تجزيه سريع پروتئين خام آن در شکمبه که هر دو باعث افزایش مخزن آمونياکی در شکمبه می‌شوند (۲۷). نتایج اين تحقیق با نتایج وربیج و همكاران (۲۷) که اثرات روش‌های مختلف ذخیره کردن انوع علوفه را روی

REFERENCES

- Allen, M. S. 1997. Relationship between fermentation acid production in the rumen, and requirement for physically effective fiber. *J. Daily Sci.* 80: 1447.
- Beauchemin, K.A. B. I. Farr, L. M. Rode & G. B. Schaalje. 1994. Optimal Neutral detergent fiber concentration of barley based diets for lactating dairy cows. *J. Dairy Sci.* 77: 1013.
- Brouk, M., & R. Belyea. 1993. Chewing activity and digestive responses of cows fed forages. *J. Dairy Sci.* 76: 175.
- Chase, L. E., 1993. Developing nutrition programs for high producing dairy herds. *J. Dairy Sci.* 76: 3287.

5. Colenbrander, V. f., D. L. Hill, M. L. Eastridge & D. R. Mertens. 1986. Formulating dairy rations with neutral detergent fiber 1. Effect of silage source. *J. Dairy Sci.* 69: 2718.
6. Dado, r. G. & M. S. Allen. 1996. Enhanced intake and production of cows offered ensiled alfalfa with higher neutral detergent fiber digestibility. *J. Dairy Sci.* 79: 418.
7. Dewhurst R. J. D. W. R. Davies. W. J. Fisher, J. Bertilsson & R. Wilkins. 2000. Intake and milk production responses to legume silage offered to Holstein - Frisian cows. Programme Annual Meeting 2000. Brit. Society of Anim. Sci. (BSAS).
8. Erdman, R. a., 1988. Dietary buffering requirement of lactating dairy cow: a review. *J. Dairy Sci.* 76: 826.
9. Forbes, J. M. 1995. Voluntary Food Intake and Diet selection in Farm Animals. CAB International. Wallingford. U.K.
10. Giger- Reverdin, S. 1995. Review of the main methods of cell wall estimation: interest and limits for ruminants. *Anim. Feed Sci. Technol.* 55: 295.
11. Jasaitis, D. K. J. E. Wohlt & J. L. Evans. 1987. Influence of feed ion content on buffering capacity of ruminant feedstuffs in Vitro. *J. Dairy Sci.* 70: 1465.
12. Jung, H. g. & M. S. Allen. 1995. Characteristics of plant cell walls affecting intake and digestibility of forages by ruminants. *J. Anim. Sci.* 73: 2774.
13. Mertens, D. R. 1995. Comparing forage sources in dairy rations containing similar neutral detergent fiber concentration. *J. Anim. Sci.* 73(Suppl. 1) 210 (Abstr).
14. Mertens, D. R. 1997. Creating a system for meeting the fiber requirement of dairy cows. *J. Dairy Sci.* 80: 1463.
15. National research Council. 1989. Nutrient requirements of dairy cattle. 6th rev. ed. Natl. Acad. Sci. Washington, D. C.
16. Oba, M. & M. S. Allen. 1999. Evaluation of the importance of the digestibility of neutral detergent fiber from forage: Effects on dry matter intake and milk yield. *J. Dairy Sci.* 82: 589.
17. Okine, E. K., G. R. Khorassani & J. J. Kennelly. 1997. Effect of forage and level of concentrate on chewing activity and milk production response in late lactation cows. *Can. J. Anim. Sci.* 77: 253.
18. Poore, M. H., J. A. Moore. R. S. Swingle, T. P. Eck & W. H. Brown. 1991. Wheat Straw or alfalfa hay in diets with 30% neutral detergent fiber for lactating Holstein cows. *J. Dairy Sci.* 74: 3152.
19. Robinson, P. H. & R. E. Mc Queen. 1992. Influence of rumen fermentable neutral detergent fiber levels on feed intake milk production of dairy cows. *J. Dairy Sci.* 75: 520.
20. Robinson, P. H., & R. E. McQueen. 1997. Influence of level of concentrate allocation fermentability of forage fiber on chewing behaviour and production of dairy cows. *J. Dairy Sci.* 80: 681.
21. Salimei, E. P. J. Van Soest, B. I. Ginerchaves. O. Pedron. V. Dell' Orto & F. Polidori. 1994. Cation exchange capacity, cell wall composition and fermentation kinetics in forages. *Livest. Prod. Sci.* 39: 101.
22. SAS, User's Guide: Statistics, Version 6 edition. 1996. SAS inst., Inc. Cary, NC.
23. Sniffen, C. J., J. D. O' Connor, D. J. Fox. P. J. Van Soest & J. B. Russel. 1992. A net carbohydrate and protein system for evaluation cattle diets: II. Carbohydrate and protein availability. *J. Anim. Sci.* 7-: 3562.
24. Vankeulen, J. & B. A. Young. 1997. Evaluation of acid insoluble ash as a natural marker in ruminant digestibility studies. *J. Anim. Sci.* 44: 282.
25. Van Soest, P. J. 1994. Nutritional Ecology of the Ruminants. (2nd Ed). Cornell Univ. Press. Ithaca, NY.
26. Van Soest, P. J., J. B. Robertson & B. A. Lewis. 1991. Methods for fiber neutral detergent fiber and non starch polysaccharides in relation or animal nutrition. *J. Dairy Sci.* 74: 3583.
27. Verbic, J. & E. R. Orskov. 1999. The effect of method of forage preservation on the protein degradability and microbial protein synthesis in the rumen. *Anim. Feed Sci. Technol.* 82: 195.
28. Wohlt, J. E., D. K. Jasaitis & J. L. Evans. 1987. Use of acid base titrations to evaluate the buffering capacity of ruminant feedstuffs in Vitro. *J. Dairy Sci.* 70: 1465.

Effects of Cell Wall of Different Forage Sources on Milk Production and Composition in Lactating Holstein Cows

H. AMANLOU¹, M. R. BEHESHTI² AND A. NIKKHAH³

1,3, Ph.D. Student and Professor, Faculty of Agriculture, University of Tehran

2, M.Sc. Student, University of Zanjan

Accepted Nov. 28, 2001

SUMMARY

Alfalfa hay, alfalfa haylage, corn silage and a 1:1 combination of corn silage and alfalfa hay were evaluated as sources of forage cell wall in diets for twelve early to mid lactation Holstein cows. Diets were formulated to contain equal amounts of natural detergent fiber (31.5%), crude protein (17.1%) and NE_L (1.65 M K Cal/ KgDM) in an incomplete change – over design. Dry matter intake was highest for cows fed alfalfa haylage diet ($P<0.05$), but no significant difference was found among the experimental means for actual milk yield, 4% and 3.2% fat corrected milk yield, although actual milk yield was higher for cows fed alfalfa haylage diet. Milk composition was not affected by experimental diets with exception of milk fat percentage, so that corn silage caused lowest and alfalfa hay the highest milk fat percentage ($P<0.05$). Dry matter, organic matter and cell wall digestibility were highest for diet containing both alfalfa hay and corn silage ($P<0.05$). Alfalfa hay and haylage had highest buffering capacity and caused highest rumen pH ($P<0.05$), maintaining higher milk fat percentage.

Key words: Cell wall, Forage, Fiber, Milk production, Milk Composition.