

بررسی و معرفی مناسب‌ترین دانه گرده برای نارنگی پیچ

علیرضا طلائی^۱، بهروز گلعنی^۲، یونس ابراهیمی^۳ و علی وزوائی^۴
۱، ۲، ۴، دانشیار، دانشجوی سابق کارشناسی ارشد و استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران.

۳، محقق موسسه تحقیقات مرکبات کشور

تاریخ پذیرش مقاله ۸۰/۹/۲۱

خلاصه

بهمنظور بررسی اثر دانه گرده نه رقم از مرکبات روی خصوصیات کمی و کیفی نارنگی پیچ این پژوهش انجام شد. برای تجزیه نتایج این تحقیق از طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار به مدت ۲ سال استفاده گردید. این آزمایش در ایستگاه تحقیقات مرکبات کترا (از توابع شهرستان تنکابن) اجرا گردید. بعد از عمل گردهافشانی درختان نارنگی پیچ، داده‌برداری‌های ضروری انجام شد و پس از رسیدن میوه‌ها برداشت شدند و فاکتورهای وزن، قطر، طول، حجم، ضخامت پوست، مقدار آب میوه، تعداد بذر سالم و چروکیده، کل مواد جامد محلول، اسید کل، ویتامین ث و درصد تشکیل میوه نهایی اندازه‌گیری شدند. محاسبات آماری، تجزیه واریانس مرکب دو ساله و مقایسه تیمارها از طریق آزمون دانکن نشانگر آن است که دانه گرده پرنتقال محلی سیاورز بیشترین اثر را روی درصد تشکیل نهایی میوه داشت و دانه گرده دو رگ طبیعی شل محله و پرنتقال هاملین بیشترین اثر را روی صفات کمی و کیفی میوه به ترتیب بروز دادند. اما در مجموع در این مطالعه دانه گرده پرنتقال هاملین بهترین اثر را از نظر صفات کمی و کیفی روی نارنگی پیچ داشت.

واژه‌های کلیدی: زنیا، متازنیا، نارنگی پیچ، دانه گرده.

(۲). و یا ممکن است دانه گرده بر قسمت‌های مختلف میوه اثر متفاوتی داشته باشد، مانند پدیده متازنیا^۱ که عبارت است از اثر دانه گرده بر خصوصیات میوه و یا زنیا^۲ که بر تغییر و تبدیل شکل بذر توسط دانه گرده حاصل می‌گردد اثر زنیا یک اثر مستقیم است که خصوصیات مشخصی را در بذر کنترل می‌کند (۴). اثر متازنیا در درختان میوه نظیر نارگیل، زغال، اخته، خرماء مرکبات و همچنین اثر زنیا در گردوبی آمریکایی، بلوط، خرما و مرکبات توسط محققان مختلف گزارش شده است (۴). اصطلاح متازنیا را برای اولین بار توسط سوینگل در سال ۱۹۲۸ عنوان گردید. وی در آزمایش‌های خود متوجه شد که دانه‌های گرده تغییراتی در شکل، اندازه، وزن و زمان رسیدن میوه بوجود می‌آورند (۹).

مقدمه

در مرکبات برای تولید محصولی کافی در ارقام خودناسازگار و غیر پارتتوکارپ، وجود دانه گرده زنده و سازگار در زمان گردهافشانی روی کلاله ضروری است. نوع گرده در مرکبات می‌تواند روی خصوصیات فیزیکی و شیمایی میوه اثر گذارد، به طوری که در تعیین کیفیت و کمیت میوه مؤثر می‌باشد. بنابراین انتخاب دانه گرده مناسب برای گردهافشانی در ارقام خودناسازگار و غیر پارتتوکارپ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

نارنگی پیچ بدیل زودرسی، عطر و طعم بسیار خوب و شیرین و درشتی میوه در بین باغداران مناطق شمالی کشور و مصرف کنندگان بازارهای داخلی جایگاه قابل توجهی یافته است (۲). این رقم از خود ناسازگاری و نیز دگر ناسازگاری با بعضی از ارقام مرکبات را دارد و در صورت عدم وجود گرده دهنده مناسب، میوه‌های کوچک، نامرغوب و یا پر بذری تولید می‌کند

بذر، وزن و درصد تشکیل میوه دارند، به طوری که در کشت توان هر رقم خود ناسازگار با گرده دهنده مناسب آن و مدیریت صحیح انتقال دهنده‌های گرده (زنبور عسل) می‌توان باعث بهبود عملکرد کمی و کیفی میوه شد (۱۰).

اسدی (۱۳۷۵) اعلام کرد که پرتفال خونی مورو مناسب‌ترین گرده دهنده برای کاهش تعداد بذر در نارنگی کلماتین و لیمو خوش‌های بهترین گرده دهنده برای افزایش تشکیل میوه در نارنگی مذکور می‌باشد (۱).

از آنجایی که نارنگی پیچ یکی از ارقام مرغوب در ایران می‌باشد بنابراین انتخاب دانه گرده مناسب از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد، لذا ضرورت تحقیق حاضر به منظور دستیابی و معرفی مناسب‌ترین گرده دهنده برای این رقم وجود داشت تا بتوان با کشت توان، موجبات افزایش میزان محصول با کیفیت مطلوب‌تر را فراهم نمود.

مواد و روش‌ها

این تحقیق در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با ۹ تیمار (۹ رقم دانه گرده) و تیمار شاهد (گرده‌افشانی آزاد) در ۳ تکرار به مدت ۲ سال انجام شد.

قطعه آزمایشی نارنگی پیچ در ایستگاه تحقیقات مرکبات کترا برای این منظور انتخاب و ۲۷ درخت (هر درخت به عنوان یک واحد آزمایشی) که از نظر رشد، اندازه و شکل تاج و حتی میزان شکوفه‌دهی یکسان بودند بر اساس نقشه طرح آزمایشی علامتگذاری گردیدند. روی هر درخت در هر تکرار ۸ تا ۱۰ شاخه گلدار در جوانب مختلف انتخاب و به موقع گلهای آن اخته و با پاکت‌های موی شفاف پوشانده شدند و انتهای هر پاکت با نخ بسته شد. این گلهای پس از آماده شدن کلاله با گرده مورد نظر گرده‌افشانی مصنوعی (با استفاده از قلم مو) گردیدند. همچنین روی هر درخت دو شاخه به عنوان گرده افشانی آزاد (شاهد) انتخاب شد.

به منظور تهیه دانه گرده ارقام گرده دهنده، همزمان با پوشاندن شاخه‌های درختان مادری، ۲۰۰ عدد از شکوفه‌های هر یک از ارقام گرده دهنده در مرحله نزدیک به باز شدن جمع‌آوری شد، سپس بساکها را جدا کرده و درون ظرف پتیری کوچک در دمای معمولی اطاق (۲۴ تا ۲۶ درجه سانتی‌گراد)

ال - تومی (۱۹۵۷) در مطالعاتش روی پرتفال واشنگتن ناول دریافت که میوه‌هایی که از طریق پارتنوکاربی تولید می‌شوند بی بذر بوده و یا فقط شامل یک بذر توحالی در میوه می‌باشند، در حالی که در گرده افشانی غیر مستقیم که از دانه گرده نارنج استفاده شده بود میوه‌ها دارای تعداد بذر بیشتری بودند. نهایتاً او نشان داد که میانگین تعداد بذر تشکیل شده در نتیجه گرده افشانی با دانه گرده لیموشیرین و نارنج به ترتیب از ۲ تا ۶/۶۷ عدد متغیر است (۵).

جهانگیر زاده (۱۳۷۴) در ارزیابی اثر دانه گرده ارقام مختلف مرکبات روی تشکیل و تثبیت میوه رقم پرتفال واشنگتن ناول نشان داد که دانه گرده رقم‌های نارنج، نارنگی محلی و نارنگی دانسی باعث افزایش وزن میوه و دانه گرده پرتفال پارسون براون منتج به افزایش تعداد بذر در میوه پرتفال واشنگتن ناول می‌گردد. نتایج تحقیقات نامبرده نشان داده است که کشت توان پرتفال بی اسید یا نارنگی دانسی با پرتفال واشنگتن ناول باعث افزایش میزان محصول خواهد شد (۳).

زیاوو (۱۹۷۶) در مطالعه اثر دانه گرده لیموایچانگ، یوکو، یوزو، پونسیروس و گریپ فروت دانکن روی تولید میوه و بذر در نارنگی انشو اعلام کرد که بیشترین درصد تشکیل میوه و تعداد بذر از اثر دانه گرده گریپ فروت و کمترین از اثر دانه گرده پونسیروس به دست می‌آید (۱۱).

سایری (۱۹۶۰) در تحقیقی که روی پرتفال بلدی انجام داده است گزارش نموده است که میزان قند در میوه‌های ناشی از گرده افشانی غیر مستقیم از گرده‌افشانی مستقیم بیشتر و میزان اسیدیته آن کمتر است (۸).

کیتات و همکاران (۱۹۷۴) در ارزیابی اثر دانه گرده لایم‌های بلدی و آگامی و نارنگی بلدی وری لایم‌های بلدی، آگامی و حسنی نتیجه گرفتند که هیچ اختلاف معنی‌دار از لحاظ مواد جامد محلول، اسیدیته و ویتامین ث در دو سال آزمایش انجام شده وجود ندارد، منتها استثناء در لایم حسنی در یک سال آزمایش بود که مواد جامد محلول وقتی توسط دانه گرده نارنگی بلدی گرده‌افشانی شده بود افزایش یافته بود (۶).

والاس ولی (۱۹۹۹) در بررسی اثر نوع دانه گرده روی ۳ رقم نارنگی (مورکات، امپریال و النور) گزارش کردند که منابع مختلف دانه گرده اثر معنی‌داری روی مقدار قند، اسیدیته، تعداد

آمده نشان داد که درصد تشکیل میوه از شمارش سوم (۹۰ روز بعد از گردهافشانی) تا شمارش نهایی یکسان بوده و اختلافی بین تیمارها تا زمان برداشت دیده نشد. مونسلیس (۱۹۸۶) معتقد است که طول دوره ریزش از زمان گلدهی تا حدود ۱۴ هفته بعد از آن اتفاق می‌افتد و در پایان این دوره تقریباً ریزش اضافی تا موقع برداشت وجودندارد، مگر اینکه قبل از برداشت در بعضی ارقام و تحت شرایط آب و هوای ناسازگار ریزش صورت گیرد (۷). بنابراین ملاحظه می‌گردد که درصد تشکیل نهایی میوه در نارنگی پیچ را می‌توان ۹۰ روز بعد از گردهافشانی برآورد نمود.

در جداول ۲ و ۳ نتایج میانگین اثر تیمارها روی صفات کمی و کیفی میوه مورد مطالعه درج شده است. همانطور که از این جداول مشهود است بین تیمارها از لحاظ وزن، قطر، طول، حجم، ضخامت پوست، مقدار آب میوه، تعداد بذر سالم و چروکیده، اسید کل و ویتامین ث میوه اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۵٪ وجود دارد. توضیح اینکه دانه گرده نارنگی از نظر افزایش وزن میوه، دانه گرده گریپ فروت دانکن از نظر کاهش ضخامت پوست، دانه گرده لیموشیرین از نظر افزایش مقدار آب میوه، دانه گرده پرتقال هاملین از لحاظ کم کردن تعداد بذر و افزایش کل مواد جامد محلول و دانه گرده پرتقال مارس ارلی در کاهش دادن اسیدیته میوه به عنوان تیمارهای برتر شناخته شدند. همچنین با توجه به جداول ۲ و ۳ می‌توان دریافت که گرده دو رگ طبیعی شل محله بیشترین اثر را روی صفات کمی و گرده پرتقال هاملین بیشترین اثر را روی صفات کیفی میوه دارد، اما در مجموع پس از امتیاز بندی تیمارها، گرده پرتقال هاملین بهترین اثر را از نظر صفات کمی و کیفی در طی دو سال آزمایش نشان داد. این نتایج با گزارش زیاو (۱۹۷۶)، والاس و لی (۱۹۹۹)، سابری (۱۹۶۰)، کیتات و همکاران (۱۹۷۴)، ال - تومی (۱۹۵۷)، جهانگیر زاده (۱۳۷۴) و اسدی (۱۳۷۵) که نشان داده‌اند دانه گرده می‌تواند روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی میوه و بذر تغییر و تبدیلی ایجاد کند مطابقت دارد. بنابراین وجود اختلاف معنی‌دار بین تیمارها از لحاظ صفات کمی و کیفی می‌تواند به دلیل پدیده متازیا و زیما در مرکبات باشد.

نگهداری شدن و پس از ۲۴ ساعت دانه گرده آنها آزاد شدند و برای تعیین درصد جوانهزنی، دانه‌های گرده از محیط کشت ۱۵٪ محلول ساکارز، ۱٪ آگار محتوی ۱۰۰ میلی‌گرم در لیتر اسید بوریک، ۳۰۰ میلی‌گرم در لیتر نیترات کلسیم، ۲۰۰ میلی‌گرم در لیتر سولفات منیزیم و ۱۰۰ میلی‌گرم در لیتر نیترات پتاسیم استفاده شد (۱۱).

در گرده افشاری کنترل شده (گردهافشانی غیر مستقیم) به محض مشاهدات ترشحات کلاله، گلها با گرده مورد نظر گرده افشاری شدن و یک هفته بعد از گردهافشانی مصنوعی پاکتها را روی گلها برداشته شد.

در دوران رشد و نمو میوه‌ها، در هفت مرحله تعداد ریزش (به فواصل زمانی هر ۳۰ روز یکبار)، قطر و رنگ آنها یادداشت برداری شد. زمانی که رنگ میوه‌ها از سبز به نارنجی مایل به قرمز تبدیل شد میوه‌ها برداشت و درصد تشکیل نهایی میوه محاسبه گردید. برای اندازه‌گیری صفات کمی و کیفی میوه از هر تیمار در هر تکرار ۱۰ میوه به طور تصادفی انتخاب گردید و صفاتی مانند وزن، قطر، طول، حجم، ضخامت پوست، مقدار آب میوه، تعداد بذرها سالم و چروکیده، کل مواد جامد محلول (با استفاده از رفراتومتر)، اسید کل (از روش تیتراسیون و استفاده از سود ۰/۱ نرمال) و ویتامین ث (از روش تیتراسیون و با استفاده از یدور پتاسیم ۰/۱ نرمال) محاسبه و یادداشت برداری شد. کلیه نتایج به دست آمده حاصل از اندازه‌گیری‌های متعدد میوه طی دو سال آزمایش با استفاده از طرح بلوک‌های کامل تصادفی تجزیه مرکب شده و تیمارهای مختلف با آزمون دانکن مورد مقایسه قرار گرفتند.

نتایج و بحث

نتایج حاصله در جدول ۱ نشان می‌دهد که بین رقم‌های گرده دهنده از نظر درصد تشکیل میوه اختلاف معنی‌دار در سطح احتمال ۵٪ وجود دارد و تیمار دانه گرده پرتقال هاملین سیاوز در سال اول و تیمار دانه گرده پرتقال هاملین در سال دوم آزمایش به عنوان تیمارهای برتر شناخته شدند. این بدان معناست که برخی گرده راه‌ها نسبت به بقیه برتری دارند. این تحقیق با گزارش‌های اسدی (۱۳۷۵)، جهانگیر زاده (۱۳۷۴)، والاس (۱۹۹۹) و زیاو (۱۹۷۶) مطابقت دارد. نتایج به دست

جدول ۱- میانگین اثر تیمارها روی درصد تشکیل میوه رقم نارنگی پیچ

سال دوم				سال اول				تیمارها	
شمارش اول	شمارش دوم	شمارش سوم ونهایی	شمارش اول	شمارش اول	شمارش دوم	شمارش سوم ونهایی	شمارش دوم	(نوع دانه گرده)	
۳۸/۲۳cf	۱۸/۵۳gh	۰/۶۶Vef	۳۷/۷۵cfg	۲۰/۳۶fg	۶/۲۴۰cf	نارنگ			
۳۵/۴۳g	۱۵/۶۳i	۱/۵۴۰g	۳۵/۶۸fg	۱۴/۷۱ij	۲/۲۴۳g	گریپ فروت دانکن			
۴۱/۳۷d	۲۱/۵۳f	۶/۲۹۰cf	۴۱/۱۹d	۲۳/۶۰c	۷/۱۸۰c	لیموشیرین			
۳۸/۱۲cfg	۱۷/۷۷h	۰/۰۵۷f	۳۸/۵۵e	۲۱/۳۷i	۵/۰۴۳i	برنتقال سالوستیانا			
۳۸/۲۷c	۲۷/۸۰d	۱۵/۳۷a	۴۰/۰۳dc	۲۷/۶۶d	۱۴/۸۰ab	نارنگی محلی			
۵۸/۹۷b	۳۱/۴۰c	۱۰/۷۱cd	۵۷/۱۳b	۳۱/۹۱bc	۱۳/۴۰b	پرنتقال هاملین			
۶۲/۲۷a	۳۳/۸۳b	۱۴/۴۷ab	۶۳/۷۲a	۳۸/۰۷a	۱۵/۵۴a	پرنتقال محلی سیاورز			
۱۴/۶۰i	۷/۸۰Vk	۲/۳۳Yg	۱۴/۳۵i	۸/۴۲Vk	۱/۶۸۹g	پرنتقال مارس ارلی			
۴۵/۵۳c	۲۸/۷۷d	۹/۳۲Vd	۴۵/۶۷c	۲۷/۳۸d	۱۱/۵۸c	دورگ طبیعی شل محله			
۲۵/۴۰h	۱۴/۷۷h	۱/۵۳۳g	۲۳/۴۵h	۱۲/۴۳j	۱/۷۴۷g	گرده افشاری آزاد			

+ میانگین‌ها در هر ستون که حداقل دارای یک حرف مشابه هستند معنی‌دار نمی‌باشد.

جدول ۲- میانگین اثر تیمارها روی صفات کمی میوه رقم نارنگی پیچ

سال اول									تیمارها (نوع دانه گرده)	
تعداد بذر سالم	تعداد بذر سالم	مقدار آب میوه	ضخامت پوست	حجم	طول	قطر	وزن			
۲/۶۰۰ cf	۲۶/۵۳ ab	۳۷/۲۷ fg	۳/۲۸۷ fg	۱۳۷/۳ a	۵۸/۰۰ a	۶۷/۸۳ ab	۱۳۸/۴ a	نارنگ		
۰/۰۰۰ j	۹/۱۶۷ fg	۴۳/۰۷ abc	۲/۵۴۳ ghi	۱۰/۵/۱gh	۵۷/۷۳ a	۶۲/۸۰ def	۱۱۴/۶ gh	گریپ فروت دانکن		
۰/۵۳۳ i	۹/۴۰۰ fg	۴۵/۴۰ a	۳/۲۱۳ b	۱۱۰/۳ fg	۵۳/۹۳ bcd	۶۴/۳۰ cde	۱۱۸/۵ cfg	لیموشیرین		
۲/۰۰۰ g	۲۴/۴۷ c	۴۰/۲۲ cde	۳/۰۹۷ bc	۱۲۵/۲cd	۵۵/۵۳ abc	۶۵/۲۷ bcd	۱۲۸/۱ bcd	برنتقال سالوستیانا		
۱/۰۰۰ h	۹/۸۰۰ fg	۴۲/۴۳ abc	۲/۵۳۰ hi	۱۰/۸/۷gh	۵۲/۶۰ cde	۶۲/۶۰ def	۱۰۹/۶ hi	نارنگی محلی		
۲۱/۹۳۳ d	۸/۱۰۰ g	۴۴/۵۷ ab	۲/۶۷۰ fg	۱۳۰/۰ bc	۵۴/۹۰ abc	۶۵/۷۰ bcd	۱۲۵/۰ cde	پرنتقال هاملین		
۴/۵۶۷ a	۲۵/۰۳ bc	۴۰/۲۲ cde	۳/۱۲۳ bc	۱۳۰/۲ bc	۵۷/۲۲ a	۶۶/۸۷ abc	۱۳۵/۱ ab	پرنتقال محلی سیاورز		
۳/۰۳۳ d	۱۸/۰۳ c	۳۹/۹۷ cde	۳/۱۱۰ bc	۱۱۰/۲ c	۵۲/۵۷ bcd	۷۲/۴۷ def	۱۱۳/۴ gh	پرنتقال مارس ارلی		
۲/۸۰۰ dc	۲۲/۱۰ d	۴۲/۲۲ bcd	۲/۸۴۰ de	۱۳۹/۴ a	۵۶/۵۰ ab	۶۹/۳۰ a	۱۳۸/۹ a	دورگ طبیعی شل محله		
۳/۴۶۷ c	۲۵/۲۳ bc	۴۴/۹۷ ab	۲/۸۶۰ d	۱۲۹/۱ cd	۵۵/۹۰ ab	۶۴/۹۳ bcd	۱۱۵/۰ gh	گرده افشاری آزاد		

+ میانگین‌ها در هر ستون که حداقل دارای یک حرف مشابه هستند معنی‌دار نمی‌باشد.

ادامه جدول ۲- میانگین اثر تیمارها روی صفات کمی میوه رقم نارنگی پیچ

سال دوم									تیمارها (نوع دانه گرده)	
تعداد بذر سالم	تعداد بذر سالم	مقدار آب میوه	ضخامت پوست	حجم	طول	قطر	وزن			
۲/۳۳۳ i	۲۷/۱۷ a	۳۶/۷۰ g	۳/۴۵۳ a	۱۳۲/۵ abc	۵۷/۲۷ a	۶۰/۷۰ gh	۱۳۶/۸ a	نارنگ		
۰/۱۳۳ j	۹/۳۶ fg	۴۰/۱۰ cde	۲/۴۵۵ i	۱۰/۱/۹ h	۵ۮ/۳۷ ab	۵۸/۹۰ h	۱۱۶/۵ fgh	گریپ فروت دانکن		
۰/۰۰۵ i	۹/۰۵۷ fg	۴۴/۹۷ ab	۳/۱۴۳ bc	۱۰/۵/۸ fgh	۵۰/۷۷ ef	۶۲/۴۰ def	۱۲۰/۹ def	لیموشیرین		
۲/۳۰۰ fg	۲۴/۰۷ c	۳۸/۷۷ cfg	۳/۰۱۷ c	۱۲۰/۰ e	۵۲/۲۲ def	۶۴/۵۰ bcd	۱۱۵/۳ fgh	برنتقال سالوستیانا		
۰/۶۶۷ i	۱۰/۶۷ f	۴۰/۲۲ cde	۲/۵۰۷ fgh	۱۰/۲/۸ gh	۴۹/۶۳ f	۶۶/۸۰ abc	۱۰/۵/۸ i	نارنگی محلی		
۲/۸۳۳ de	۸/۶۰ g	۴۴/۳۰ ab	۲/۵۹۷ gh	۱۲۱/۵ e	۵۲/۶۰ cde	۶۳/۲۰ def	۱۱۸/۳ cfg	پرنتقال هاملین		
۳/۹۶۷ b	۲۰/۹۰ d	۳۹/۴۰ def	۳/۲۷۰ a	۱۲۶/۴ cd	۵۳/۸۳ bcd	۶۴/۰۳ cde	۱۳۱/۵ abc	پرنتقال محلی سیاورز		
۳/۱۰۰ d	۱۷/۱۷ e	۳۷/۴۳ fg	۳/۲۸۰ a	۱۰/۳/۰ gh	۵۱/۲۰ ef	۶۱/۸۰ fgh	۱۰/۵/۹ i	پرنتقال مارس ارلی		
۳/۱۲۳ d	۲۱/۲۳ d	۴۱/۱۳ cde	۲/۷۷۷ cf	۱۳۲/۸ abc	۵۱/۲۰ ef	۶۵/۷۷ bcd	۱۳۲/۷ ab	دورگ طبیعی شل محله		
۳/۷۶۷ bc	۲۵/۲۳ bc	۴۲/۱۷ bcd	۲/۸۶۳ d	۱۲۲/۴ de	۵۱/۰۳ ef	۶۲/۲۰ cfg	۱۲۲/۷ def	گرده افشاری آزاد		

+ میانگین‌ها در هر ستون که حداقل دارای یک حرف مشابه هستند معنی‌دار نمی‌باشد.

جدول ۳- میانگین اثر تیمارها روی صفات کیفی میوه رقم نارنگی پیچ

(نوع دانه گرده)	تیمارها					
	سال دوم			سال اول		
کل مواد جامد محلول	اسیدکل	ویتامین ث	کل مواد جامد محلول	اسیدکل	ویتامین ث	
۱۰/۲۰ iii	۰/۸۹۰ ab	۵۱/۲۰ cde	۱۰/۶۸ efg	۰/۹۸۷ ab	۵۱/۴۳ abc [†]	نارنگی پیچ
۱۰/۸۰ def	۰/۸۹۶ ab	۵۱/۰۷ ef	۱۱/۸۱ a	۰/۹۰۶ ab	۵۱/۳۰ bcd	گریپ فروت دانکن
۱۰/۲۸ ghi	۰/۸۶۹ abc	۵۱/۱۳ def	۱۰/۵۱ fgh	۰/۸۷۳ abc	۵۱/۰۰ f	لیموشیرین
۱۰/۲۰ hi	۰/۹۱۰ ab	۵۱/۸۰ a	۱۰/۵۸ efg	۰/۸۷۳ abc	۵۱/۷ ab	پرتقال سالوستیانا
۱۱/۰۹ bcd	۰/۹۱۵ ab	۵۰/۹۳ fg	۱۱/۶۲ ab	۰/۹۳۱ a	۵۱/۰۰ f	نارنگی محلی
۱۱/۳۲ abc	۰/۸۳۲ c	۵۱/۵۳ abc	۱۱/۳۶ abc	۰/۸۴۸ bc	۵۱/۳۲ bcd	پرتقال هاملین
۱۰/۷۲ efg	۰/۸۹۰ av	۵۱/۶۷ av	۱۱/۰۹ ccd	۰/۸۷۶ abc	۵۱/۸۰ a	پرتقال محلی سیاورز
۹/۲۵۷ j	۰/۸۱۲ c	۵۰/۶۰ gh	۹/۸۷۳ i	۰/۷۵۰ d	۵۱/۶۶ abc	پرتقال مارس ارلی
۹/۸۵۰ i	۰/۸۶۱ abc	۵۱/۲۰ cde	۱۰/۶۲ efg	۰/۸۲۳ c	۵۱/۸۱ a	دورگ طبیعی شل محله
۱۱/۰۰ cde	۰/۸۴۴ c	۵۰/۳۳ h	۱۰/۷۷ def	۰/۸۳۴ c	۵۱/۶۰ abc	گرده افسانی آزاد

+ میانگین‌ها در هر ستون که حداقل دارای یک حرف مشابه هستند معنی دار نمی‌باشند.

دو ساله چنین نتیجه می‌شود که تیمار دانه گرده پرتقال هاملین به دلیل اینکه میزان بذر را در میوه بطور چشمگیری کاهش می‌دهد و از لحاظ درصد تشکیل میوه و صفات کمی و کیفی در حد بالا و مطلوبی می‌باشد این رقم به عنوان بهترین گرده دهنده برای نارنگی پیچ معرفی می‌گردد و با کشت توان این دو رقم (narngi پیچ و پرتقال هاملین) می‌توان باعث افزایش میزان محصول با کیفیت مطلوب‌تر شد.

سپاسگزاری

این تحقیق با اعتبارات شورای پژوهشی دانشگاه تهران به اجراء آمده است و یکی از زیر طرح‌های مستمر بهزیستی و بهبودی گیاهان با غی ایران است که بدینوسیله سپاسگزاری می‌گردد.

در مشاهدات ما مشخص شد که میانگین تعداد بذر در نارنگی پیچ از اثر دانه گرده ارقام مختلف متفاوت می‌باشد به طوری که دانه گرده پرتقال هاملین کمترین کمترین و دانه گرده نارنگی بیشترین تعداد بذر در میوه را تولید کردند. این نتیجه با گزارش‌های زیاوی (۱۹۷۶)، والاس ولی (۱۹۹۹)، جهانگیرزاده (۱۳۷۴) و اسدی (۱۳۷۵) که گزارش کردند نوع دانه گرده می‌تواند روی تعداد بذر در میوه اثر بگذارد همانگنی دارد. به نظر می‌رسد وجود اختلاف معنی دار بین تیمارها از لحاظ تعداد بذر به دلیل اثر متفاوت دانه گرده هر رقم روی میوه و بذر، عدم سازگاری جنسی کامل بین نارنگی پیچ و ارقام گرده دهنده و تفاوت در میزان درصد جوانه‌زنی دانه گرده هر تیمار باشد. از جمع‌بندی نتایج مربوط به اندازه‌گیری‌ها و آزمایش‌های

REFERENCES

۱. اسدی آبکنار، ا. ۱۳۷۵. بررسی اثر دانه گرده ارقام مختلف مرکبات روی پاره‌ای از صفات کمی و کیفی نارنگی کلمانتین. پایان نامه نویسی لیسانس، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران.
۲. انوری، ف. ۱۳۶۹. موقعیت ارقام و مناطق کشت و مرکبات در شمال ایران. نشریه نهال و بذر، شماره ۱۲۸، کرج، ایران.
۳. جهانگیرزاده خیاوی، ا. ۱۳۷۴. بررسی و ارزیابی اثر دانه گرده ارقام مختلف مرکبات در تشکیل و تثبیت رقم پرتقال واشنگتن ناول. پایان نامه فوق لیسانس، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران.
4. Denney, J. O. 1992. Xenia includes metaxenia. Hort Science. 27(7): 722-728.

5. El-Tomi, A. L. 1957. Effect of cross – pollination on june drop, preharvest drop and cropping in Washington Navel, Orange. Ann. Agri. Sci. Fac. Agri. Ain- Shams. Univ. Cario, 11, No.11.
6. Kitat, E. M., F. M. El-Azad and B. M. Wehida. 1974. Metaxenia in limes (*Citrus aurantifolia* Swin.) Alex. J. Agric. Res. 22: 85-90.
7. Monselise, S. P. 1986. Citrus. In: CRC hand book of fruit set and development (Monselies, S. P. Ed.), CRC Press. Boca Raton, Florida, P. 87-108.
8. Sabry, H. I. 1960. The effect of the honey bees as a pollinating agent on the yield of broad bean, clover, cotton and citrus trees. M.Sc. Thesis, Cario University.
9. Swingle, W. T. 1928. Metaxenia in the date palm. J. Hered. 19: 257-268.
10. Wallace, H. M. and H. S. Lee. 1999. Pollen source, fruit set and xenia in mandarins. J. Hort. Sci. and Biote. 74: 82-86.
11. Ziao, N. D. 1976. Seed producting by satsuma. Subtropicheskie Kul'tury, 5: 62-63.

Investigation and Introducing the Appropriate Pollen for Page Mandarin

A. TALAEI¹, B. GOLEIN², Y. EBRAHIMI³ AND A. VEZVAEI⁴

1,2,4, Associate Professor, Former Graduate Student and Assistant Professor, Faculty of Agriculture, University of Tehran.

3, Center of Citrus Research in Iran.

Accepted Dec. 12, 2001

SUMMARY

This research was conducted to investigate the effects of pollen of nine citrus cultivars on the quantitative and qualitative characteristics of Page mandarin. To carry out and for analyzing the results of the research, a Randomized complete Block Design with three replications was implemented for a period of two years, (1997, 1998). After artificial pollination, data were recorded and the fruits were harvested at a ripe stage. Factors such as weight, diameter, length, volume, peel thickness, juice content, developed and undeveloped seeds, total soluble solids, total acid, vitamin C and percentage of final fruit set were measured. The results indicated that the pollen of Siavaraz local sweet orange, had the highest effect on the percentage of final fruit set and pollen of Shel – Mo – Haleh (natural hybrid) and Hamlin orange had the highest effect on the quantitative and qualitative characteristics of the fruit respectively. It was concluded that the pollen of Hamlin orange had the best effect on the quantitative and qualitative characteristics of Page mandarin.

Key words: Xenia, Metaxenia, Page mandarin, Pollen.

