

آناتومی و بافت شناسی گره سینوسی-دهلیزی در قلب موش صحرایی

دکتر ابوالقاسم نبی پور*

دریافت مقاله: ۲۵ تیر ماه ۱۳۸۲

پذیرش نهایی: ۱۶ مهر ماه ۱۳۸۲

Anatomy and histology of the sinu-atrial node in the heart of rat (*Rattus norvegicus*)

Nabipour, A.¹

¹Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad-Iran.

Objective: To provide information about the anatomy and histology of the cardiac sinu-atrial node of rat. This information is needed in various fields of veterinary sciences, such as anatomy, histology, physiology, pathology and cardiology.

Design: Compare the anatomy and histology of the rat with the available data on the sinu-atrial node of human being and other animals.

Animals: Four male rats.

Procedure: A piece consisted of the upper part of the interatrial septum along with the right cranial vena cava and a part of lateral wall of right atrium and right auricle was separated from each heart. The sinu-atrial node was studied by using routine anatomical and histological techniques.

Results: The sinu-atrial node of the rat was almost triangular in shape. The mean dimensions of the node were 225 μ m in length, 83 μ m in width and 216 μ m in thickness. The cells of the node were organized into groups and chains of cells. In general, the color differences between the nodal cells and the ordinary myocardial fibers of the right atrium were very weak and there were no intercalated discs at intercellular connections. Also, the cells near the sinu-atrial node artery were organized around it.

Conclusion: The anatomical location of the sinu - atrial node in the rat is similar to those of human being, dog, cattle, horse, camel, cat and goat. In the heart of rat there was a central artery. In this respect, it was resemble to those of human being, dog and camel. However, in goat, sheep, rabbit, cat, cattle and guinea pig there is no central artery in the node. There was a little amount nerve fibers within the sinu-atrial node of rat. In this respect, it is similar to that of guinea pig. Whereas, in man, horse, dog, cat and goat the nerve fibers are abundant within the node. *J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran.* 59, 1: 3-7, 2004.

Key words: Rat, Heart, Anatomy, Histology, Sinu-Atrial node.

Corresponding author email: nabipour@ferdowsi.um.ac.ir

مواد و روش کار

تعداد ۴ قطعه موش صحرایی (Rattus norvegicus) نر بالغ مورد مطالعه قرار گرفت. مراحل کار ابتدا به صورت آزمایشی بر روی یک قطعه انجام شد و سپس مطالعه بر روی قلب سه موش صحرایی دیگر انجام گرفت. ابتدا موشهای بیهوش و خونگیری می شدند. سپس قلب از محوطه صدری خارج می گردید. پس از برداشتن پریکارڈ، سطح قلب با سرم فیزیولوژی شستشو داده می شد و مقداری سرم فیزیولوژی به داخل آورت نیز تزریق می شد. این عمل باعث خروج کاملتر خون از بافت قلب و در نتیجه افزایش کیفیت اسلامیدها می شود. به دنبال آن از هر قلب، قطعه ای مشتمل از بخشی از دیواره

هدف: فراهم آوردن اطلاعات مربوط به آناتومی و بافت شناسی گره سینوسی-دهلیزی قلب موش صحرایی، این اطلاعات موردنیاز رشته های مختلف علوم دامپزشکی نظری آناتومی، بافت شناسی، فیزیولوژی، آسیب شناسی و کار迪ولوژی می باشد.

طرح: مقایسه آناتومی و بافت شناسی گره سینوسی-دهلیزی موش صحرایی با اطلاعات موجود در مورد انسان و سایر حیوانات.

حيوانات: چهار قطعه موش صحرایی.

روش: از هر قلب قطعه ای مشتمل از قسمت بالای دیواره بین دهلیزی، سیاهرگ میانخالی قدامی راست، بخشی از دیواره جانبی دهلیزی راست و گوشک راست جدا شد. با استفاده از روشهای متداول در آناتومی و بافت شناسی، گره سینوسی-دهلیزی مورد مطالعه قرار گرفت.

نتایج: گره سینوسی-دهلیزی قلب موش صحرایی تا حدودی متشابه شکل بود. میانگین ابعاد گره ۲۲۵ میکرون طول، ۸۳ میکرون عرض و ۲۱۶ میکرون ضخامت بود. سلولهای گره به صورت گروهها و زنجیرهای سلولی قرار داشتند. به طور کلی اختلاف رنگ سلولهای گره با سلولهای میوکارد دهلیزی راست بسیار اندک بود و بین سلولهای گره صفحات پلکانی وجود نداشت همچنین سلولهای نزدیک سرخرگ گره سینوسی-دهلیزی در اطراف آن سازماندهی شده بودند.

نتیجه گیری: موقعیت تشریحی گره در موش صحرایی مشابه انسان، سگ، گاو، شتر، گربه و بز می باشد. گره در موش صحرایی دارای سرخرگ مرکزی است که از این نظر به انسان، سگ و شتر شباهت دارد در حالی که در بز، گوسفند، خرگوش، گربه، خوکچه هندی و گاو فاقد سرخرگ مرکزی است. در داخل گره سینوسی-دهلیزی موش صحرایی میزان اندکی الیاف عصبی وجود دارد که از این نظر شبیه خوکچه هندی است، در حالی که در انسان، اسب، سگ، گربه و بز میزان زیادی الیاف عصبی در داخل گره وجود دارد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (۱۳۸۳)، دوره ۵۹، شماره ۱-۷.

واژه های کلیدی: موش صحرایی، قلب، آناتومی، بافت شناسی، گره سینوسی-دهلیزی. سیستم هدایتی قلب از یک بخش پیشاپنگ یا ضربان ساز به نام گره سینوسی-دهلیزی تشکیل شده است. جهت تفسیر صحیح عمل قلب و شناخت دقیق نارساییها و بیماریهای قلبی، شناخت کامل گره سینوسی-دهلیزی در گونه های مختلف ضروری است. به طور مثال تعدادی از آریتمی های قلبی از ضایعات پاتولوژیک یا ناقص آناتومیک در گره سینوسی-دهلیزی یا خونرسانی آن ناشی می شوند.

آناتومی و بافت شناسی گره در انسان، سگ، گاو، اسب و قاطر، خرگوش، شتر، گربه، بز و خوکچه هندی مطالعه شده است (۱.۵.۶.۸.۹.۱۴). از آنجا که اطلاعات دقیق در مورد آناتومی و بافت شناسی گره سینوسی-دهلیزی در قلب موش صحرایی موجود نیست، این مطالعه انجام شد تا این اطلاعات را فراهم نماید.

(۱) کروه آموزشی علوم پایه دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد - ایران.
* نویسنده مسؤول nabipour@ferdowsi.um.ac.ir



"پی" و سلولهای انتقالی هستند. سلولهای "پی" دارای میوفیبریل کمتری نسبت به سلولهای معمولی دهليز راست هستند و به همین دلیل تا حدودی کم رنگتر از سلولهای معمولی میوکارد مشاهده می شوند. سلولهای مذکور به صورت گروهی و بیشتر در نواحی مرکزی گره قرار دارند. این سلولهای یک هسته کروی یا بیضی شکل هستند. سلولهای انتقالی نسبت به سلولهای "پی" دارای میزان بیشتری میوفیبریل در سیتوپلاسم خود هستند که به همین دلیل پر رنگتر از سلولهای "پی" هستند. این سلولها اختلاف رنگ اندکی با سلولهای معمولی میوکارد دهليز دارند ولی کوچکتر از آنها می باشند. همچنین بین سلولهای گره صفحات پلکانی وجود نداشت. ضمناً در برخی از نمونه ها تراکم سلولی گره شدیدتر بود (تصاویر ۴، ۵ و ۶).

خونرسانی گره سینوسی- دهليزی مosh صحرایی توسط انشعابات مختلف سرخرگی از نوع شریانچه انجام می شود. این سرخرگ کاملاً در مرکز گره قرار ندارد. بلکه در نزدیک ناحیه مرکزی و به طرف حاشیه خلفی گره قرار داشته و سلولهایی از گره که در مجاورت آن قرار دارند، سرخرگ را احاطه نموده و در اطراف آن سازماندهی شده اند (تصویر ۶). در مجاورت گره سینوسی- دهليزی و در نزدیک انتهای قدامی آن، گانگلیون های عصبی تحت عنوان گانگلیون های سینوسی- دهليزی وجود دارد. این گانگلیون ها ساختاری شبیه ساختار یک گانگلیون پاراسیمپاتیک دارند و توسط کپسولی از بافت پیوندی احاطه شده اند و شامل تعدادی جسم سلولی یا پریکارپون و الیاف عصبی می باشند. جسم سلولی و الیاف عصبی، به طور نامنظم قرار گرفته اند. سلولهای عصبی از نوع چند قطبی و سیتوپلاسم آنها حاوی یک هسته گرد و روشن می باشد (تصویر ۷).

این نکته نیز قابل ذکر است که هیچ گونه سلولهای تغییر شکل یافته میوکارد که از گره سینوسی- دهليزی وارد میوکارد دیواره جانبی دهليز راست شوند که مؤید وجود مسیرهای بین گرهی قلب می باشند، در قلب مosh صحرایی مشاهده نشد.

بحث

موقعیت استقرار گره سینوسی- دهليزی قلب mosh صحرایی مشابه انسان، گاو، شتر، اسب، گربه و بز می باشد (تصویر ۱). در سگ، خرگوش و خوکجه هندی موقعیت قرار گیری گره سینوسی- دهليزی در قسمت عقب تر شیار انتهایی است، در حالی که در انسان، اسب و گاو قدامی تر قرار گرفته است. اگر چه تغییرات قابل ملاحظه ای در اندازه و موقعیت گره در بین گونه های مختلف و حتی در یک گونه وجود دارد (۱۱.۱۵). گره سینوسی- دهليزی قلب mosh صحرایی تا حدودی مثلثی شکل است که از این نظر شبیه سگ و گربه می باشد (۴.۶). گره مذکور در انسان هلالی شکل (۶)، در اسب نعل اسبی شکل که دارای یک بدنه و دو شاخه جانبی و میانی است (۱.۱۳)، در بز تا حدودی به شکل یک مخروط ناقص، در شتر به شکل یک دوک خمیده و بسیار کشیده است و در خوکجه هندی به شکل ذوزنقه ای با اضلاع خمیده می باشد (۳.۱۴.۱۵). در پرندگان برخلاف سایر گونه ها،


جانبی دهليز راست، گوشک راست، قسمت بالایی دیواره بین دهليزی و یک سانتیمتر ابتدایی سیاهرگ میانخالی قدامی راست جدا شد. سپس جهت ثابت نمودن، قطعه مزبور در ظرف حاوی محلول فرمالین ۱۰ درصد قرار می گرفت. عملیات آماده سازی بافت توسط دستگاه اتماتیک آماده کننده بافت انجام شد. قطعه مورد نظر به نحوی قالبگیری شد که سیاهرگ میانخالی قدامی راست در پایین قرار می گرفت، یعنی برش به صورت عرضی و از سیاهرگ مذکور شروع می شد. برش نمونه ها توسط میکروتوم چرخان انجام گرفت. از تمام بلوکها برشهایی به ضخامت ۶ میکرون به صورت برشهای پی در پی (serial sections) تهیه می شد و مقاطع مربوط به هر نمونه با فاصله ۳ برداشته شده و پس از شماره گذاری به روی لام منتقل می شد. به دنبال آن مقاطع مربوط به هر نمونه با رنگ آمیزی شد (۱۲). برشهای رنگ آمیزی شده تری کروم سبز و ارسین رنگ آمیزی شد (۱۲). برشهای رنگ آمیزی شده در بزرگنمایی های مختلف با میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار می گرفت و مورفولوژی و ساختار بافت شناسی قسمتهای مختلف گره سینوسی- دهليزی مطالعه می گردید. همچنین اندازه گره از نظر طول و ضخامت به روش استاندارد میکرومتری تعیین و محاسبه می گشت. عرض این گره نیز بر اساس حاصل ضرب تعداد برشهایی که گره را نشان می دادند در عدد ۶ میکرون، تعیین و محاسبه می گشت.

نتایج

از نقطه نظر تشریحی گره سینوسی- دهليزی قلب mosh صحرایی در حد فاصل محل اتصال سیاهرگ میانخالی قدامی راست به دیواره جانبی دهليز راست و گوشک راست و ۱۷/۵-۲۰ میکرون زیر اپیکارد شیار انتهایی قرار گرفته است. لازم به ذکر است مosh صحرایی دارای سیاهرگ میانخالی قدامی چپ نیز می باشد. گره مذکور از اپیکارد شیار انتهایی توسط لایه ای از بافت پیوندی جدا شده است. این گره در قلب mosh صحرایی تا حدودی مثلثی شکل است، انتهای خلفی آن یعنی ناحیه ای که در مجاورت میوکارد گوشک راست است عریض می باشد ولی انتهای قدامی آن (قسمت مجاور میوکارد دیواره جانبی دهليز راست) باریک می باشد (تصویر ۱). میانگین ابعاد گره سینوسی- دهليزی قلب mosh صحرایی ۲۲۵ میکرون طول، ۸۳ میکرون عرض و در عریض ترین قسمت ۲۱۶ میکرون ضخامت بود. گره مذکور در تمام طول خود توسط لایه ای از بافت پیوندی دارای الیاف کلارزن از اپیکارد جدا شده ولی در قسمت داخلی توسط لایه نازکی از میوکارد دهليز راست از اندوکارد جدا می شود (تصویر ۲). این گره دارای داریست نسبتاً متراکمی از الیاف کلارزن بود که به صورت نامنظم قرار گرفته بودند. همچنین در بین الیاف کلارزن، میزان کمی الیاف الاستیک نیز وجود داشت (تصاویر ۲ و ۳).

سلولهای گره سینوسی- دهليزی قلب mosh صحرایی عمدتاً به صورت گروهها و زنجیره های سلولی قرار گرفته اند. علاوه بر سلولهای فیبروبلاست که در لابلای الیاف کلارزن قرار دارند، سلولهای اصلی پارانشیم گره سلولهای





تصویر ۲- جدا شدن گره سینوسی - دهلیزی قلب موش صحرایی از اپیکارد توسط الیاف کلاژن و اندوکارد توسط لایه نازکی از میوکارد دهلیز راست.

گره سینوسی - دهلیزی (SAN) میوکارد دیواره جانبی دهلیز راست (CF) کلاژن جدا کننده گره از اپیکارد، پیکان) میوکارد جدا کننده گره از اندوکارد، (رنگ آمیزی اختصاصی ماسون تری کروم سبز، بزرگنمایی $\times 220$).



تصویر ۱- نشان دهنده موقعیت استقرار میکروسکوپ و شکل گره سینوسی - دهلیزی قلب موش صحرایی (M*) گوشک راست، (M) دیواره جانبی دهلیز راست، پیکان ضخیمتر) انتهای خلفی عریض گره، پیکان نازکتر) انتهای قدامی باریک گره، (رنگ آمیزی اختصاصی ماسون تری کروم سبز، بزرگنمایی $\times 160$).



تصویر ۴- سلولهای ماهیچه ای گره سینوسی - دهلیزی قلب موش صحرایی.
(T) سلول "پی". (T) سلول انقلابی، پیکان) هسته سلول فیبروبلاست، (M) میوکارد دیواره جانبی دهلیز راست، (رنگ آمیزی اختصاصی ماسون تری کروم سبز، بزرگنمایی $\times 640$).

می باشد (۴). در خرگوش اندازه طول گره از 0.010 mm تا 0.018 mm میلیمتر متغیر است (۹). میانگین ابعاد گره در خوکچه هندی نیز $0.015 \text{ mm} \times 0.014 \text{ mm} \times 0.013 \text{ mm}$ میلیمتر می باشد (۱۵).

به طور کلی پارانشیم گره سینوسی-دهلیزی قلب موش صحرایی از سلولهای مخصوصی تشکیل شده است که شباهتی کلی بین نوع و مورفولوژی سلولهای گره سینوسی- دهلیزی قلب موش صحرایی و انسان، سگ، اسب، گربه و بزر وجود دارد، با این تفاوت که اختلاف رنگ گره با سلولهای معمولی میوکارد دهلیز راست در قلب موش صحرایی بسیار اندک است و به نظر می رسد ناحیه روش اطراف هسته در سلولهای "پی" کوچکتر از گونه های مذکور می باشد (۱۶). به عبارت دیگر میزان میوفیبریل در سیتوپلاسم سلولهای گره زیادتر است. ناحیه روش اطراف هسته مربوط به سلولهای "پی" در گره سینوسی- دهلیزی قلب بزر و گاو بزرگتر از سایر حیوانات مذکور است، در حالی که حالت موجود در پیچ رشته های سلولی گره کمتر است (۱۷). همچنان تعداد کل سلولهای گره سینوسی- دهلیزی



تصویر ۳- نشان دهنده الیاف الاستیک در داریست گره سینوسی - دهلیزی، پیکان ضخیم (الیاف کلاژن، پیکان نازک) الیاف الاستیک، (NC) سلولهای گره، (رنگ آمیزی اختصاصی ارسنین، بزرگنمایی $\times 640$).

گره سینوسی- دهلیزی را نمی توان به صورت مستقل و مشخص مشاهده نمود، بلکه به صورت انشعابات و شاخه هایی از سلولهای کوچک در محل ورود سیاهرگ میانخالی قدامی به دهلیز راست قابل تشخیص است (۱۶). میانگین ابعاد گره در قلب موش صحرایی 0.0225 mm میکرون طول، 0.018 mm میکرون عرض و 0.016 mm میکرون ضخامت است. گره در انسان 0.015 mm میلیمتر طول، 0.015 mm میلیمتر عرض و 0.015 mm میلیمتر ضخامت دارد (۵). میانگین ابعاد گره در بزرگنمایی 0.01275 mm میلیمتر طول، 0.015 mm میلیمتر عرض و 0.0177 mm میلیمتر ضخامت است (۱۴). اندازه حجمی گره سینوسی- دهلیزی قلب سگ حدود 0.005 mm^3 میلیمتر و در اسب تقریباً 0.0034 mm^3 میلیمتر در برش عرضی است (۱). گره سینوسی- دهلیزی قلب شتر به طور میانگین $0.028 \text{ mm} \times 0.025 \text{ mm} \times 0.025 \text{ mm}$ میلیمتر عرض و 0.018 mm میلیمتر ضخامت دارد (۳). میانگین ابعاد گره سینوسی- دهلیزی در گریه های نر 0.0278 mm میلیمتر طول، 0.0218 mm میلیمتر عرض و 0.0154 mm میلیمتر ضخامت است، در حالی که این میانگین در گریه های ماده 0.0275 mm میلیمتر طول، 0.0264 mm میلیمتر عرض و 0.0245 mm میلیمتر ضخامت





تصویر ۴- نشان دهنده ساختار سلولی متراکم تر و سرخرگ تغذیه کننده گره سینوسی - دهليزی قلب موش صحرابی.
سرخرگ گره سینوسی - دهليزی، پیکان) احاطه شدن سرخرگ تغذیه کننده گره توسط سلولهای
محاور آن، (رنگ آمیزی اختصاصی ماسون تری کروم سبز، بزرگنمایی ۴۰×).

تشکیل دهنده داریست گره سینوسی- دهليزی قلب موش صحرابی الیاف الاستیک نیز به صورت پراکنده وجود دارد که از این نظر مشابه انسان، سگ و گربه می باشد (۱۰، ۴۶).

گره سینوسی- دهليزی قلب موش صحرابی دارای سرخرگ تغذیه کننده است که موقعیت قرارگیری آن کاملا مرکزی نیست بلکه در نزدیک ناحیه مرکزی قرار دارد ولی چون سلولهای نزدیک سرخرگ تغذیه کننده در اطراف آن سازماندهی شده اند، می توان آن را سرخرگ مرکزی محسوب نمود. این گره در انسان، سگ و شتر نیز دارای سرخرگ مرکزی است که سازماندهی سلولهای گره در اطراف سرخرگ وجود دارد (۳، ۵، ۶). در بز و گوسفند گره مذکور فاقد سرخرگ مرکزی است و به جای آن در نزدیک ناحیه مرکزی و به طرف حاشیه قدامی سرخرگ مشخصی وجود دارد که خونرسانی گره را انجام می دهد و سلولهای گره در اطراف این سرخرگ سازماندهی نشده اند (۲۱۴). گره سینوسی- دهليزی قلب گربه و گاو نیز سازماندهی نشده اند (۲۱۴). گره سینوسی- دهليزی قلب سرخرگ کوچک وجود دارد که تغذیه گره را انجام می دهد و سلولهای گره در اطراف هیچ کدام از این سرخرگ ها سازماندهی نشده اند. همچنین در گربه در بعضی از موارد هیچگونه سرخرگ گره سینوسی- دهليزی را نمی توان مشخص کرد (۴، ۸). در اسب سرخرگ گره ممکن است منفرد یا چندتایی باشد که در داخل یا نزدیک بازوی قدامی گره واقع شده اند (۱). در خرگوش نیز گره سینوسی- دهليزی فاقد سرخرگ مرکزی است و به جای آن چند شاخه سرخرگی کوچک نقش تغذیه گره را به عهده دارند (۹). در گره سینوسی- دهليزی قلب خوکچه هندی یک یا چند آرتربول در انتهای قدمای و در بعضی از نمونه ها هم در انتهای قدمای و هم در انتهای خلفی گره قرار دارند، که خونرسانی گره را انجام می دهند (۱۵).

در داخل گره سینوسی- دهليزی قلب موش صحرابی میزان اندکی الیاف عصبی موجود است ولی گانگلیون های عصبی در داخل گره وجود ندارند بلکه در مجاورت گره و در نزدیک انتهای قدامی آن مشاهده می شوند. در



تصویر ۵- سلولهای معمولی میوکارد دهليز راست در قلب موش صحرابی، به اختلاف رنگ و تفاوت انداه این سلولها با سلولهای گره توجه شود (رنگ آمیزی اختصاصی ماسون تری کروم سبز، بزرگنمایی ۴۰×).



تصویر ۶- ساختار یک گانگلیون گره سینوسی - دهليزی قلب موش صحرابی.
(پریکاریون، پیکان) هسته و هستک، (رنگ آمیزی اختصاصی ماسون تری کروم سبز، بزرگنمایی ۴۰×).

قلب انسان بیشتر از گوسفند است (۲). در اسب سلولهای بدن و شاخه میانی گره با سلولهای شاخه جانبی تفاوت دارند. بدین ترتیب که سلولهای شاخه جانبی واکوئل دار بوده و بصورت دسته جمعی و متراکم قرار دارند، به طوری که قابل تشخیص نیستند که این حالت در بدن و شاخه میانی وجود ندارد (۱). همچنین گره سینوسی- دهليزی قلب خرگوش و خوکچه هندی دارای درصد بالایی از سلولهای بی است، به طوریکه میزان بالای سلولهای "بی" باعث ضوح بیشتر حاشیه های گره سینوسی- دهليزی قلب این حیوانات می شود (۹، ۱۵).

بین سلولهای گره سینوسی- دهليزی قلب موش صحرابی صفحات پلکانی وجود ندارد که از این نظر مشابه سایر گونه های مطالعه شده می باشد. داریست گره سینوسی- دهليزی قلب موش صحرابی دارای میزان زیادی الیاف کلازن است که به صورت نامنظم قرار گرفته اند که از این نظر مشابه انسان، سگ، اسب، شتر، گربه و بز می باشد (۱۴، ۴۶). در حالی که تراکم یا میزان الیاف کلازن گره سینوسی- دهليزی قلب گاو، خرگوش و خوکچه هندی کمتر از گونه های مذکور می باشد (۸، ۹، ۱۵). در لابه لای الیاف کلازن



References

1. Bishop, S. P. and Cole, C. R. (1967): Morphology of the specialized conducting tissue in the atria of the equine heart. *Anat. Rec.* 158: 401-416.
2. Copenhaver, W. M. and Truex, R. C. (1952): Histology of the atrial portion of the cardiac conduction system in man and other mammals. *Anat. Rec.* 114: 601-614.
3. Ghazi, S. R. and Tadjalli, M. (1995): Anatomy of the sinus node of camel (*Camellus dromedarius*). *Anat. Histol. Embryol.* 24:1-5.
4. Ghazi, S. R., Tadjalli, M. and Baniabbas, A. (1998): Anatomy of the sinus node of domestic cats (*Felis catus*). *J. Appl. Anim. Res.* 14: 57-64.
5. James, T. N. (1961): Anatomy of the human sinus node. *Anat. Rec.* 141: 109-116.
6. James, T. N. (1962): Anatomy of the sinus node of the dog. *Anat. Rec.* 143: 255-266.
7. James, T. N. (1963): The connecting pathways between the sinus node and AV node and between the right and left atrium in the human heart. *Am. Heart. J.* 66: 498-508.
8. James, T. N. (1965): Anatomy of the sinus node, AV node and os cordis of the beef heart. *Anat. Rec.* 153: 361-372.
9. James, T. N. (1967): Anatomy of the cardiac conduction system in the rabbit. *Circ.* 20: 638-648.
10. James, T. N. (1970): Cardiac conduction system: Fetal and postnatal development. *Am. J. Cardiol.* 25: 213-225.
11. James, T. N. (1977): The sinus node. *Am. J. Cardiol.* 40: 965-972.
12. Luna, L. G. (1968): Manual of histologic staining methods of the armed forces institute of pathology. 3rd ed. McGraw-Hill Book Company, New York, USA. PP: 77 and 94-95.
13. Mayling, H. A., and Terborg, H. (1957): The conducting system of the heart in hoofed animals. *Cornell Vet. J.* 47: 419-447.
14. Nabipour, A., Khanzadi, S. and Moradi, G. H. (2000): Anatomy of the sinu-atrial node in the heart of Goat (*Capra hircus*). *J. Fac. Vet. Med. Tehran Univ.* 55, 2: 93-96.
15. Nabipour, A. (2004): Anatomy and histology of the sinu-atrial node in the heart of Guinea pig (*Cavia porcellus*). *J. Appl. Anim. Res.* 25: 41-43.
16. Truex, R. C. and Smythe, M. Q. (1965): Comparative morphology of the cardiac conduction tissues in animals. *Ann. Y. Acad. Sci.* 127: 19-32.

داخل گره سینوسی - دهليزی خوکچه هندی نیز مقدار بسیار اندکی الیاف عصبی وجود دارد. ضمناً در این حیوان هیچ گونه گانگلیون عصبی در داخل یا اطراف گره وجود ندارد (۱۵). در حالی که در اسب، انسان، سگ، گربه و بز میزان زیادی الیاف عصبی در داخل گره وجود دارد و در تمام این حیوانات گانگلیون عصبی نیز در اطراف گره وجود دارد (۱۴,۵,۶,۱۴,۱۵).

در قلب موش صحرایی هیچ گونه سلولهای تغییر شکل یافته‌ای که از گره سینوسی - دهليزی وارد می‌کارد دهليز راست شوند، مشاهده نشد. بنابراین مسیرهای بین گرهی که گره سینوسی - دهليزی را به گره دهليزی - بطنه قلب مرتبط می‌سازند، در این حیوان وجود ندارند در حالی که مسیرهای بین گرهی در قلب انسان، میمون، سگ، گربه، خرگوش و خوکچه هندی گزارش شده است (۲,۴,۶,۷,۹,۱۵).



