

پنومونی پاستورالایی (برونکوپنومونی فیبرینی) در بره با عامل پاستورلا همولیتیکا (بیوتیپ T)

دکتر فرهنگ ساسانی^۱ دکتر ناهید اطیابی^۲ دکتر مهدی راعی دهقی^۳

Pneumonic pasteurellosis (Fibrinous bronchopneumonia) in lamb due to *Pasteurella hemolytica* (Biotype T)

Sasani, F.¹ Atyabi, N.² Raie Dehaghi, M.³

¹Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran - Iran. ²Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran - Iran. ³Private Veterinary Practitioner.

Objective: Identification of etiopathogenesis and the type of pneumonia.

Animal: 4- months old lamb.

Procedure: Microbiological and pathological (H & E) study.

Results: There was fibrinous and lobar bronchopneumonia in cranioventral region of the lungs. Histopathological examination showed coagulation necrosis, fibrin, neutrophils and other inflammatory cells infiltration into the alveoli and bronchioles, accompanied by atelectasis and emphysema. By tissue culture and biochemical tests, *Pasteurella hemolytica*, biotype T was specified.

Conclusion: *Pasteurella hemolytica* biotype T usually produces septicemia but in this case fibrinous bronchopneumonia (Pneumonic pasteurellosis) was seen. *J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran.* 57, 3: 73-74, 2002.

Key words: Fibrinous bronchopneumonia, Lamb, *Pasteurella hemolytica* (Biotype T).

ضمناً در بررسی آنتی بیوگرام مشخص گردید که این باکتری به آنتی بیوتیک های کلرامفینیک، پنی سیلین تتراسیکلین و اکسی تراسیمیکلین و جنتامایسین حساس می باشد.

بحث و نتیجه گیری

پنومونی های گوسفند معمولاً به اشکال پاستورلوز ریوی: پنومونی انژوئتیک مزمن و سپتی سمی همورازیک بروز می نماید که غالباً باکتری پاستورلا در این موارد نقش مهمی دارد. ضایعات دیگر ریه ها در گوسفند آذنوماتوز یا کارسینوماتوز ریوی و بیماری مدنی(Maedi) می باشد. یکی از شایعترین موارد پنومونی ها که از نظر اقتصادی نیز مهم است پنومونی پاستورالایی گوسفند است که معمولاً توسط باکتری پاستورلا همولیتیکا بیوتیپ A ایجاد می شود اما موردی که مشاهده شد توسط پاستورلا همولیتیکا بیوتیپ T ایجاد گردیده بود. معمولاً این باکتری در بره های با سنین ۵ ماه به بالا سپتی سمی همورازیک ایجاد می نماید.

ضمناً پاستورلا همولیتیکا بیوتیپ A نیز می تواند در بره ها سپتی سمی پاستورلایی ایجاد نماید. بلکه بیشتر پاستورلا مولتوسیدا برای دستگاه تنفس پاتوژن نمی باشد. تا ۴.۵ در گوسفند پاستورلا همولیتیکا بیوتیپ A باعث بروز علایم بالینی از قبیل دیسپنه سرفه، تب، ریزش از بینی، افسردگی و بی اشتہایی به همراه صدای تنفسی می گردد که در طی ۱ تا ۳ روز می توانند باعث مرگ گردد. سپتی سمی همورازیک باعث ایجاد خونریزی زیرجلدی، بروز ترشحات خونی و کف آلو در نای و برونشها به همراه ادم ریه و خونریزی اکیموز در پوست می گردد اما معمولاً پنومونی وجود ندارد. البته نکروزو و اولسر در حلق و مری و شیردان به وجود می آورد. معمولاً برای درمان

هدف: مطالعه و تعیین اتیوباتولوژی و نوع پنومونی حیوان: بره ۴ ماهه.

روش: میکروب شناسی و آسیب شناسی (رنگ آمیزی H&E).

نتایج: در ظاهر ماکروسکوپی نواحی قدامی شکمی ریه ها مبتلا به برونکوپنومونی لوبار و فیبرینی بود. در بررسی هیستوپاتولوژی آلوئولها و برونشیولها، دچار نکروز انعقادی، نفوذ فیبرین، نوتروفیل و دیگر سلولهای آماسی بودند و آمفیزم آتلکتازی هم مشهود بود. در کشت بافت و آزمایشات بیوشیمیایی باکتری پاستورلا همولیتیکا بیوتیپ T مشخص گردید.

نتیجه گیری: باکتری پاستورلا همولیتیکا بیوتیپ T، معمولاً سپتیبیمی ایجاد می کند ولی در این مورد باعث ایجاد برونکوپنومونی فیبرینی (بنومونی پاستورلایی) شده است. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ۱۳۸۰(۱)، دوره ۵۷، شماره ۳.

.۷۲-۷۴

واژه های کلیدی: برونکوپنومونی فیبرینی، بره، پاستورلا همولیتیکا (بیوتیپ T).

در تاریخ ۷۸/۸/۴ لاشه بره ای ۴ ماهه به بیمارستان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران ارجاع گردید که دچار ضایعه شدید در دستگاه تنفس بود. صاحب دام تعدادی گوسفند را از غرب کشور به شهرستان کرج انتقال داده بود که پس از چند روز گوسفندان دچار سرفه های متواتی توام با صدای خس خس، بی اشتہایی، کسالت و ریزش از بینی شدند. سپس با تجویز داروی تایلوزین و الیندازول بهبودی حاصل شد به جز این بره که با بروز علایم شدید قبل از مرگ ذبح گردید از بافت های مبتلا دستگاه تنفس نمونه هایی در داخل محلول فرمالین ۱۰ درصد قرار داده شد و پس از طی مراحل؛ برشهایی به ضخامت ۵ میکرون تهیه و به روش معمولی همانوگسیلین، اثوزین رنگ آمیزی به عمل آمد. همچنین نمونه های بافتی برای آزمایش باکتری شناسی ارسال گردید.

نتایج آسیب شناسی و باکتری شناسی: ریه ها به صورت دوطوفی دچار برونکوپنومونی فیبرینی و لوبار بود که مرز بین ناحیه مبتلا و قسمت سالم ریه در لوب های قدامی مشخص بود. نقاط دیگری از بافت ریه دچار پرخونی آمفیزم و آتلکتازی بود و قسمت هایی از بافت مبتلا که کاملاً کبدی شده بود در داخل آب فورفت. ضایعات پلوروبنومونی و پلوریت فیبرینی مشهود بود. در بررسی میکروسکوپی نقاط نکروز انعقادی؛ فیبرین؛ ادم و چرک فراوان در داخل کیسه های هوایی و برونشیولها و فضاهای بین لوبی ریه وجود داشت. در بررسی باکتری شناسی کوکوپلیسلهای گرم منفی با قطری در حدود ۰/۴ میکرون دیده شد که روز اول در محیط بلاد آگار کلنج بیرنگ با قطر ۱ تا ۲ میلیمتر به همراه مرزی از همولیز در اطراف آن مشاهده گردید. در بررسی بیوشیمیایی این باکتری گلوبزر و لاکتوز را تخمیر نمود ولی کاز SH₂ تولید نکرد. در محیط اوره تغییر رنگ نداد و اوره آز آن منفی بود. محیط سیمون سیترات را قلیایی نکرد و اندول آن نیز منفی بود. نیترات را احیاء نمود کاتالاز و اکسیداز مثبت بود ولی حرکت نداشت و به علت آن که این باکتری قند ترhaloz را تخمیر نمود پاستورلا همولیتیکا بیوتیپ تعیین گردید.

(۱) گروه آموزشی آسیب شناسی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران.

(۲) گروه آموزشی علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران.

(۳) دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران.



References

1. Brogden, K.M., Adlam, C., Lehmkuhi, Cutlip, R.C., Knights, J. M., Engen, R. L. (1989): Effect of Pasteurella Haemolytica (Al) capsular polysaccharide on sheep lung in vivo and on pulmonary surfactant in vitro. Am. J. Vet. Res. 50, 4: 555-559.
2. Haritani, M., Narita, M., Murata, H., Hashimoto, K., Takizawa, T. (1989): Immunoperoxidase evaluation of pneumonic lesions induced by pasteurella multocida in calves. A. J. Vet. Res. 50, 12: 2162-2167.
3. Jericho, K.W. F. (1989): Histological Changes in Lungs of Calves Exposed to an Aerosol of Pasteurella haemolytica. J. Comp. Path. 101: 87-99.
4. Jones, T. C., Hunt, R. D., King, N.W. (1997): Veterinary Pathology. Sixth ed. Williams & wilkins. PP: 458-460.
5. MacGavin, M. D., Carlton, W. W., Zachary, J. F. (2001): Thomson's Special Veterinary Pathology, 3rd ed. Mosby. Co. PP: 174-175.
6. Radostits, O. M., Gay, C. C., Blood, D. C., Hinchcliff, K. W. (2001): Veterinary Medicine, A Textbook of the Diseases of the cattle, Sheep, Pigs, Goats and Horses. 9th ed. W. B. Saunders. PP: 852-855.



تصویر ۱- بروتکنومونی فیرینی (لوبار) که نقاط قدامی شکمی ربه های پره امتلا نموده است.

پاستورلوز ریوی گوسفند تجویز داروی اکسی تتراسیکلین به مدت سه روز و یا پنی سیلین G پروکائین و یا مخلوط تریمتیپرم و سولفادوکسین و یا تیلماکوزین (مایکوتیل) صورت می گیرد و آنتی بیوگرام این باکتری نیز موضوع را تایید می نماید. به منظور پیشگیری از بروز این بیماری باید در صورت امکان گوسفندان را از ایجاد استرس تغییرات جوی تغذیه ای و مدیریتی محافظت نمود (۱.۲.۳.۶)

