

بررسی مقایسه ای اثرات فلونیکسین مگلومین و کتوپروفن بر روی پارامترهای هماتولوژیک و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاو

دکتر سعید نظیفی^۱ دکتر علی رضاخانی^۱ دکتر فاطمه قنبری مهارلو^۲

Comparative study on the effects of flunixin meglumine and ketoprofen on haematological and some biochemical parameters of cattle

Nazifi, S.,¹ Rezakhani, A.,¹ Ghanbari Maharloo, F.²

¹Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, University of Shiraz, Shiraz - Iran. ²Graduated from the School of Veterinary Medicine, University of Shiraz, Shiraz - Iran.

Objective: To compare the effects of two non-steroidal anti-inflammatory drugs (flunixin meglumine and ketoprofen) on haematological and some biochemical parameters of cattle.

Design: Self controlled experimental study.

Animals: Five clinically healthy male cattle with average weight of 150 ± 5 kg.

Procedure: Blood samples were taken for 3 consecutive days after administration of equal volume of distilled water as for control. Ketoprofen (30 µg/kg BW) was given intramuscularly for 3 days. Blood samples were obtained from the first treatment day until four days after final dosage. All the cattle were given 2 months rest and then blood samples were collected in a similar way as described above, before the second drug was given. Flunixin meglumine (22 µg/kg BW) was injected intravenously for 5 days and blood samples were collected for 7 days starting from the first day of injection.

Statistical analysis: The data were analysed statistically by analysis of variance (ANOVA). The differences between the means were statistically estimated by the Duncans test.

Results: Results revealed that PCV decreased and the percentage of neutrophils and monocytes increased significantly in flunixin meglumine group ($p < 0.05$) when compared with the ketoprofen group which showed no significant changes. In the ketoprofen group, concentration of creatinine increased significantly ($p < 0.05$). However, in the flunixin meglumine group, concentrations of albumin, glucose, urea nitrogen, calcium and the activity of AST decreased significantly ($p < 0.05$) and concentrations of creatinine and total globulin increased significantly ($p < 0.05$).

Conclusion: On the basis of the results it is concluded that ketoprofen has less side effects on haematological and biochemical parameters of cattle than flunixin meglumine. *J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran.* 57, 2: 95-99, 2002.

Key words: Flunixin meglumine, Ketoprofen, Haematological and serum biochemical parameters, Cattle.

هم از راه تأثیر در بافت‌های آرده و هم از راه اعصاب مرکزی موجب تسکین درد می‌شود. در زمینه آثار ضدالتهابی و فارماکوکینتیک کتوپروفن گزارش‌های وجود دارد (۱۷، ۱۵، ۱۶، ۱۳، ۱۱، ۱۲، ۸، ۶). فارماکوکینتیک فلونیکسین مگلومین را بروی حد آستانه تحریکات مکانیکی در گوسفندان به وسیله Nolan و Welsh و همکاران در سال ۱۹۹۳ بررسی شده است (۱۹). در سال ۱۹۹۵ آثار فلونیکسین مگلومین را بروی حد آستانه تحریکات مکانیکی در گوسفندان سالم مورد بررسی قرار دادند و دوزهای موثر و غیر مؤثر را در این زمینه تعیین کردند (۲۰). در سال ۱۹۹۵ Less Landoni اثرات ضدالتهابی فلونیکسین و کتوپروفن را به صورت مقایسه ای در اسب بررسی کردند (۱۱). تصور می‌شود که گونه‌های مختلف آثار خونی متفاوتی در اثر تزریق داروهای فلونیکسین مگلومین و کتوپروفن از خود نشان دهند.

هدف: مقایسه اثرات دو داروی ضدالتهاب غیراستروئیدی فلونیکسین مگلومین و کتوپروفن بر روی پارامترهای هماتولوژیک و برخی پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاو.

طرح: مطالعه تجربی با استفاده از خود شاهدها.

حيوانات: پنج رأس گاو نر به ظاهر سالم با وزن تقریبی 150 ± 5 کیلوگرم. روش: پس از اطمینان از سلامتی دامها و پیش از تزریق دارو، در سه نوبت از دامها خونگیری به عمل آمد که در مجموع به عنوان نمونه‌های شاهد منظور شدند. ابتدا به گاوهای داروی کتوپروفن به میزان ۳۰ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل عضلانی به مدت ۳ روز تزریق گردید و تا یک هفته پس از شروع تزریق از گاوهای خونگیری به عمل آمد. پس از دو ماه استراحت، مجدداً در سه روز متوالی از گاوهای خونگیری به عمل آمد که در مجموع به عنوان نمونه‌های شاهد منظور شدند. سپس فلونیکسین مگلومین به میزان ۲۲ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل وریدی و به مدت ۵ روز تزریق گردید و تا یک هفته بعد هر روز از دامها خونگیری به عمل آمد. در نمونه‌ها، پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی سرم (بروتئین تام، آلبومین، گلوبولین، گلوکز، ازت اوره، کراتینین، کلسیم، فسفر و AST) به روش‌های معمول آزمایشگاهی اندازه‌گیری شدند.

تجزیه و تحلیل آماری: برای تجزیه آماری نتایج به دست آمده در مورد هر دارو به صورت جداگانه عمل شد. برای تعیین اختلاف معنی دار بین گروه شاهد و روزهای پس از تجویز دارو از آزمون تجزیه واریانس استفاده شد. برای پی بردن به وجود اختلاف آماری معنی دار بین میانگینها از آزمون دانکن در سطح ($P < 0.05$) استفاده شد.

نتایج: پس از تزریق کتوپروفن، هماتولوژیک خون، تغییرات معنی داری نشان ندادند ($P > 0.05$). در حالی که پس از تزریق فلونیکسین مگلومین، میزان هماتوکریت به صورت معنی داری کاهش یافته و درصد نوتروفیل ها و منوسیت ها به صورت معنی داری افزایش یافت ($P < 0.05$). در مورد پارامترهای بیوشیمیایی سرم، پس از تزریق کتوپروفن، تنها میزان کراتینین به صورت معنی داری افزایش یافت ($P < 0.05$). در حالی که پس از تزریق فلونیکسین مگلومین، میزان آلمین، گلوکز، ازت اوره، کلسیم و فعالیت AST سرم به صورت معنی داری کاهش و میزان کراتینین و گلوبولین تام سرم به صورت معنی داری افزایش یافت ($P < 0.05$).

نتیجه گیری: برپایه این پژوهش، کتوپروفن در مقایسه با فلونیکسین مگلومین دارای اثرات جانبی کمتری بر روی پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی خون گاو است. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (۱۳۸۱)، دوره ۵۷، شماره ۲، ۹۵-۹۹.

واژه‌های کلیدی: فلونیکسین مگلومین، کتوپروفن، پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی، سرم، گاو.

داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی داروهایی هستند که از راه متوقف کردن سنتز پروستاگلاندین‌ها، اثرات ضدالتهاب، ضد درد و ضد تب خود را نشان می‌دهند. این داروها، اثرات گوناگونی روی سیستمهای مختلف بدن بجا می‌گذارند و آثار ضدآماسی آنها تنها بخش کوچکی از مجموعه این اثرات را تشکیل می‌دهند. بنابراین داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی دارای پتانسیل بالایی برای ایجاد اثرات ناخواسته در بدن مصرف کننده هستند (۱). از داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی جدید می‌توان از فلونیکسین مگلومین و کتوپروفن نام برد. کتوپروفن قویترین داروی مسکنی است که

(۱) گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز - ایران.

(۲) دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه شیراز، شیراز - ایران.



روش ژافه، کلسیم به روش کروزول فتالئین، فسفر به روش گلدن برگ و فرناندز AST به روش ریتمن فرانکل اصلاح شده انجام شد (۲). برای تجزیه و تحلیل آماری نتایج به دست آمده در موردهر دارو به صورت جداگانه عمل شد. برای تعیین اختلاف معنی دار بین گروه شاهد و روزهای پس از تجویز دارو از آزمون تجزیه واریانس (ANOVA) استفاده شد. برای پی بردن به وجود اختلاف آماری معنی دار بین میانگینها، از آزمون دانکن در سطح ($P < 0.05$) استفاده شد. برای پی بردن به درصد تغیر پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی سرم در اثر هر دارو از فرمول زیر استفاده شد:

$$\frac{m \times 100}{m^2} = \frac{m_1 - m_2}{m^2}$$

m = میانگین پارامتر مورد سنجش در مورد ۵ راس گاو در خلال ۷ روز پس از تزریق دارو، m_2 = میانگین پارامتر مورد سنجش در مورد ۵ راس گاو مربوط به شاهد.

نتایج

نتایج به دست آمده از بررسی اثر داروهای کتوپروفن و فلونیکسین مگلومین در جدولهای ۱ تا ۵ ارایه شده است. پس از تزریق کتوپروفن، هیچ یک از پارامترهای هماتولوژیک خون تغییر معنی داری نشان ندادند (جدول ۱). میزان کراتینین سرم در روزهای قبل و بعد از تزریق کتوپروفن با یکدیگر اختلاف آماری معنی دار نشان داد ($P < 0.05$) (جدول ۲) به طوری که پس از تزریق کتوپروفن میزان آن به صورت معنی داری افزایش یافت (جدول ۵). میزان هماتوکربت، نوتروفیل ها و منوسيت های خون در روزهای قبل و بعد از تزریق فلونیکسین مگلومین با یکدیگر اختلاف آماری معنی داری دارند ($P < 0.05$) (جدول ۳) به طوری که پس از تزریق فلونیکسین مگلومین میزان هماتوکربت به صورت معنی داری کاهش و درصد نوتروفیل ها و منوسيت های خون به صورت معنی داری افزایش یافت (جدول ۵). میزان آلبومین، گلوبولین، گلوکز، ازت اوره، کراتینین، کلسیم و فعالیت AST سرم در روزهای قبل و بعد از تزریق فلونیکسین مگلومین با یکدیگر اختلاف آماری معنی دار دارند ($P < 0.05$) (جدول ۴) به طوری که پس از تزریق فلونیکسین مگلومین میزان آلبومین، گلوکز، ازت اوره، کلسیم و فعالیت AST سرم به صورت معنی داری کاهش و میزان کراتینین و گلوبولین سرم به صورت معنی داری افزایش یافت ($P < 0.05$) (جدول ۵).

بحث

پس از تزریق کتوپروفن، افزایش معنی داری در میزان کراتینین سرم گاودخ داد که علت آن می تواند کاهش پالایش گلومرولی یا پرفیوزن کلیه ها به دلیل تاثیرات سوء دارو بر کلیه ها باشد. در مورد اثرات کتوپروفن بر میزان کراتینین سرم گزارشی به دست نیامد. کتوپروفن، هیچ تغییر معنی داری در پارامترهای هماتولوژیک خون گاو ایجاد نکرد. در این رابطه Fenwick و Daniel در سال ۱۹۹۶ گزارش کردند که استفاده از کتوپروفن در تلیسه های مبتلا به تب شیر هیچ تأثیری بر تعداد گلوبولهای سفید و غلظت فیبرینوژن خون ندارد (۶).

پس از تزریق فلونیکسین مگلومین، کاهش معنی داری در میزان هماتوکربت، آلبومین، گلوکز، ازت اوره، کلسیم و AST و افزایش معنی داری در تعداد نوتروفیل ها و منوسيت ها و میزان گلوبولین و کراتینین سرم رخداد. کاهش هماتوکربت احتمالاً ناشی از تغییرات حاصله در حجم پلاسمای

در زمینه پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی خون گاو پس از تزریق فلونیکسین مگلومین و کتوپروفن گزارش منتشر شده ای به دست نیامد. براین اساس تصمیم گرفته شد تا اثرات مقایسه ای این دو دارو بر روی پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی سرم خون گاو بررسی شود. با این تحقیق مشخص می شود که این داروها چه اثراتی بر روی پارامترهای خونی دارند و اثرات کدام یک بیشتر است. مسلماً تغییرات پارامترهای خونی می توانند ناشی از تغییرات بافتی های گوناگون و نمودی از آثار عمومی دارو باشند. بالجام این پژوهش مشخص خواهد شد که اگر دام بیماری پیش از مراجعه به درمانگاه از این گونه داروها مصرف کرده است، تغییرات پارامترهای خونی ناشی از بیماری دام است یا ناشی از مصرف دارو؟ در واقع این داروها تاچه حد بر پارامترهای خونی مؤثرند.

مواد و روش کار

تعداد ۵ راس گاو نر با وزن تقریبی 55 ± 150 کیلوگرم برای انجام این پژوهش انتخاب شدند. ابتدا تمام گاوهای مورد مطالعه از نظر بالینی مورد معاينه قرار گرفتند تا از سلامت آنها اطمینان حاصل شود. دوهفته پیش از آغاز پژوهش، داروی ضدانگل آلبندازول به میزان ۱۵ میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن خورانده شد. پیش از خونگیری، آزمایش مدفوع به عمل آمد و هیچگونه آلودگی انگلی در گاوهای دیده نشد. پیش از تزریق دارو، در سه روز متوالی از گاوهای خونگیری به عمل آمد و مقادیر به دست آمده در مجموع به عنوان شاهد قبل از تزریق دارو منظور شدند. لازم به ذکر است که به گروه شاهد، هم حجم دارو، سرم فیزیولوژی تزریق گردید. ابتدا به گاوهای داروی کتوپروفن به میزان ۳۰ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل عضلانی به مدت ۳ روز تزریق گردید. تا یک هفته بعد از تزریق، هر روز از گاوهای خونگیری به عمل آمد. سپس به گاوهای مورد آزمایش دو ماه استراحت داده شد تا پارامترهای مورد سنجش به حد طبیعی خود باز گردند. پس از دوماه، مجدداً در سه روز متوالی سه نمونه خون گرفته شد که در مجموع به عنوان نمونه شاهد پیش از تزریق فلونیکسین مگلومین منظور گردید. لازم به ذکر است که به این گروه شاهد نیز، هم حجم دارو، سرم فیزیولوژی تزریق گردید. سپس داروی فلونیکسین مگلومین به میزان ۲۲ میکروگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل وریدی به مدت ۵ روز تزریق گردید. آنگاه تا یک هفته بعد از تزریق، هر روز از گاوهای خونگیری به عمل آمد.

برای اندازه گیری پارامترهای هماتولوژیک، هریار ۵ میلی لیتر خون و برای سنجش پارامترهای بیوشیمیایی، هریار ۱۰ میلی لیتر خون از ورید و داج گاوهای گرفته می شد. نمونه های خون برای آزمایش های هماتولوژی در لوله های حاوی EDTA و برای آزمایش های بیوشیمیایی در لوله های بدون ماده ضدانعقاد ریخته می شدند. پس از لخته شدن خونها و سانتریفوژ آنها در دور ۳۰۰۰ به مدت ۱۵ دقیقه، سرمهای جدا شده و به صورت منجمد نگهداری شدند.

شمارش گلوبولهای سفید و قرمز به روش هماسیتومتری، سنجش هماتوکربت به روش میکروهماتوکربت، سنجش هموگلوبین به روش سیان مت هموگلوبین و شمارش تفریقی گلوبولهای سفید با استفاده از گسترش های رنگ آمیزی شده با رنگ گیمسا انجام شد (۱۰). سنجش پروتئین تام به روش بیوره، آلبومین به روش بروموزرول گرین، گلوکز به روش آنزیمی گلوکز اکسیداز، ازت اوره خون به روش دی استیل منوکسیم، کراتینین به



جدول ۱ - میزان * پارامترهای هماتولوژیک خون گاو پس از تزریق کتوپروفن (n=۵).

| بازوفیل | | انوزینوفیل | | منوسیت | | لنفوسیت | | نوتروفیل | | تعداد گلوبولهای سفید (۱۰ ^۳ μ l) | هموگلوبین (g/dl) | هماتوکریت (%) | تعداد گلوبولهای (۱۰ ^۳ μ l) | پارامتر قرمز (۱۰ ^۳ μ l) | گروههای آزمایشی شاهد |
|----------------------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|----------------------------|-------|----------------------------|------|------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|
| (x10 ^۳ μ l) | (%) | (x10 ^۳ μ l) | (%) | ۸/۹ ± ۰/۴ | ۱۲/۳ ± ۰/۴ | ۳۲/۸ ± ۰/۶ | ۸/۵ ± ۰/۲ | | |
| ۰/۰ | ۰/۰ | ۰/۱ | ۱/۹ | ۰/۲ | ۲/۲ | ۶/۴ | ۷۱/۸ | ۲/۳ | ۲۳/۸ | | | | | | یکروز پس از تزریق دارو |
| ±۰/۰ | ±۰/۰ | ±۰/۰ | ±۰/۵ | ±۰/۰ | ±۰/۳ | ±۰/۱ | ±۲/۸ | ±۰/۱ | ±۱/۸ | | | | | | دو روز پس از تزریق دارو |
| ۰/۰ | ۰/۰ | ۰/۰ | ۱/۰ | ۰/۵ | ۶/۶ | ۵/۹ | ۶۸/۰ | ۲/۱ | ۲۴/۴ | ۸/۷ ± ۱/۱ | ۱۲/۱ ± ۰/۶ | ۳۲/۸ ± ۰/۹ | ۸/۱ ± ۰/۲ | | |
| ±۰/۰ | ±۰/۰ | ±۰/۰ | ±۰/۷ | ±۰/۰ | ±۱/۰ | ±۰/۴ | ±۴/۷ | ±۰/۳ | ±۳/۶ | | | | | | چهار روز پس از تزریق دارو |
| ۰/۰ | ۰/۰ | ۰/۱ | ۱/۶ | ۰/۳ | ۳/۸ | ۶/۷ | ۷۰/۲ | ۲/۳ | ۲۴/۰ | ۹/۶ ± ۱/۱ | ۱۱/۴ ± ۰/۶ | ۳۱/۰ ± ۰/۷ | ۸/۵ ± ۰/۱ | | |
| ±۰/۰ | ±۰/۰ | ±۰/۰ | ±۰/۴ | ±۰/۱ | ±۱/۳ | ±۰/۶ | ±۶/۲ | ±۰/۵ | ±۵/۶ | | | | | | سه روز پس از تزریق دارو |
| ۰/۰ | ۰/۰ | ۰/۰ | ۰/۸ | ۰/۲ | ۲/۶ | ۴/۸ | ۶۲/۸ | ۱/۷ | ۲۲/۸ | ۷/۷ ± ۰/۸ | ۱۰/۱ ± ۰/۵ | ۳۲/۰ ± ۱/۴ | ۸/۰ ± ۰/۷ | | |
| ±۰/۰ | ±۰/۰ | ±۰/۰ | ±۰/۳ | ±۰/۱ | ±۱/۴ | ±۱/۰ | ±۱۴/۲ | ±۰/۱ | ±۱/۸ | | | | | | پنج روز پس از تزریق دارو |
| ۰/۰ | ۰/۴ | ۰/۰ | ۱/۱ | ۰/۳ | ۳/۶ | ۶/۰ | ۷۲/۳ | ۱/۸ | ۲۲/۴ | ۸/۴ ± ۱/۲ | ۱۱/۵ ± ۰/۴ | ۳۲/۱ ± ۰/۵ | ۸/۳ ± ۰/۲ | | |
| ±۰/۰ | ±۰/۳ | ±۰/۰ | ±۰/۲ | ±۰/۰ | ±۱/۱ | ±۰/۲ | ±۳/۰ | ±۰/۲ | ±۲/۹ | | | | | | شش روز پس از تزریق دارو |
| ۰/۰ | ۰/۵ | ۰/۱ | ۱/۲ | ۰/۴ | ۵/۱ | ۶/۱ | ۶۹/۸ | ۲/۰ | ۲۳/۱ | ۸/۸ ± ۱/۰۸ | ۱۱/۳ ± ۰/۶ | ۳۲/۲ ± ۱/۰۲ | ۸/۴ ± ۰/۳ | | |
| ±۰/۰ | ±۰/۳ | ±۰/۰ | ±۰/۴ | ±۰/۱ | ±۱/۳ | ±۰/۳ | ±۴/۱ | ±۰/۴ | ±۴/۸ | | | | | | دو روز پس از تزریق دارو |
| ۰/۰ | ۰/۶ | ۰/۰ | ۱/۰ | ۰/۳ | ۳/۴ | ۶/۴ | ۷۱/۱ | ۲/۱ | ۲۳/۷ | ۹/۰ ± ۱/۳ | ۱۱/۲ ± ۰/۶ | ۳۱/۹ ± ۱/۱ | ۸/۱ ± ۰/۶ | | |
| ±۰/۰ | ±۰/۲ | ±۰/۰ | ±۰/۳ | ±۰/۱ | ±۱/۷ | ±۰/۴ | ±۵/۱ | ±۰/۳ | ±۳/۹ | | | | | | چهار روز پس از تزریق دارو |
| ۰/۰ | ۰/۲ | ۰/۰ | ۱/۰ | ۰/۳ | ۴/۳ | ۵/۶ | ۷۰/۴ | ۱/۹ | ۲۴/۰ | ۷/۹ ± ۱/۱ | ۱۱/۴ ± ۰/۵ | ۳۲/۱ ± ۰/۸ | ۸/۵ ± ۰/۳ | | |
| ±۰/۰ | ±۰/۱ | ±۰/۰ | ±۰/۵ | ±۰/۱ | ±۱/۷ | ±۰/۳ | ±۴/۶ | ±۰/۳ | ±۴/۸ | | | | | | هفت روز پس از تزریق دارو |

*) میانگین ± خطای انحراف معیار ($\bar{X} \pm SEM$) در هر ستون میانگینهایی که با حروف لاتین نامتشابه نشان داده شده اند دارای اختلاف آماری معنی داری هستند (P<0.05).

جدول ۲ - میزان * پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاو پس از تزریق کتوپروفن (n=5).

| AST (U/L) | | فسفر (mg/dl) | کلسیم (mg/dl) | کراتینین (mg/dl) | ازت اوره (mg/dl) | گلوكز (mg/dl) | گلوبولین (g/dl) | آلبومن (g/dl) | پروتئین (g/dl) | پارامتر قرمز (g/dl) | گروههای آزمایشی شاهد |
|---------------|--|--------------|---------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| ۱۸۱/۰ ± ۱۴/۴ | | ۶/۷ ± ۰/۴ | ۱۱/۰ ± ۰/۳ | a ۲/۴ ± ۰/۰ | ۸/۳ ± ۰/۶ | ۷۲/۹ ± ۵/۶ | ۲/۰ ± ۰/۱ | ۳/۸ ± ۰/۱ | ۵/۸ ± ۰/۱ | | |
| ۱۵۷/۸ ± ۵۲/۰ | | ۵/۳ ± ۰/۳ | ۱۰/۶ ± ۰/۳ | c ۱/۹ ± ۰/۱ | ۸/۶ ± ۱/۶ | ۶۹/۱ ± ۴/۶ | ۱/۹ ± ۰/۳ | ۳/۶ ± ۰/۱ | ۵/۴ ± ۰/۴ | | یکروز پس از تزریق دارو |
| ۱۶۴/۸ ± ۳۷/۷ | | ۷/۷ ± ۱/۰ | ۱۰/۶ ± ۱/۱ | b ۳/۶ ± ۰/۲ | ۹/۳ ± ۱/۵ | ۶۹/۱ ± ۳/۷ | ۱/۹ ± ۰/۱ | ۳/۷ ± ۰/۲ | ۵/۷ ± ۰/۲ | | دو روز پس از تزریق دارو |
| ۱۵۴/۰ ± ۳۸/۱ | | ۶/۴ ± ۰/۳ | ۹/۷ ± ۰/۲ | b ۴/۰ ± ۰/۱ | ۵/۹ ± ۰/۶ | ۶۱/۴ ± ۵/۳ | ۲/۵ ± ۰/۲ | ۳/۲ ± ۰/۲ | ۵/۷ ± ۰/۲ | | سه روز پس از تزریق دارو |
| ۱۶۰/۴ ± ۳۱/۴ | | ۵/۳ ± ۰/۴ | ۱۰/۵ ± ۰/۲ | b ۲/۲ ± ۰/۱ | ۷/۴ ± ۱/۲ | ۶۸/۲ ± ۳/۷ | ۲/۰ ± ۰/۲ | ۳/۵ ± ۰/۳ | ۵/۶ ± ۰/۲ | | چهار روز پس از تزریق دارو |
| ۱۵۹/۲۱ ± ۳۸/۲ | | ۶/۵ ± ۰/۶ | ۱۰/۷ ± ۰/۲ | b ۳/۰ ± ۰/۲ | ۸/۵ ± ۱/۴ | ۶۷/۶ ± ۴/۱ | ۲/۱ ± ۰/۱ | ۳/۴ ± ۰/۱ | ۵/۶ ± ۰/۳ | | بنج روز پس از تزریق دارو |
| ۱۷۲/۶ ± ۲۸/۱ | | ۶/۹ ± ۰/۵ | ۱۰/۲ ± ۰/۵ | b ۳/۷ ± ۰/۱ | ۶/۹ ± ۰/۹ | ۶۴/۸ ± ۵/۱ | ۱/۸ ± ۰/۱ | ۳/۶ ± ۰/۳ | ۵/۵ ± ۰/۴ | | شش روز پس از تزریق دارو |
| ۱۶۹/۸ ± ۴۱/۲۶ | | ۵/۹ ± ۰/۶ | ۱۰/۴ ± ۰/۴ | b ۳/۳ ± ۰/۲ | ۸/۸ ± ۰/۷ | ۷۰/۱ ± ۴/۲ | ۲/۲ ± ۰/۲ | ۳/۴ ± ۰/۱ | ۵/۷ ± ۰/۲ | | هفت روز پس از تزریق دارو |

*) میانگین ± خطای انحراف معیار ($\bar{X} \pm SEM$) در هر ستون میانگینهایی که با حروف لاتین نامتشابه نشان داده شده اند دارای اختلاف آماری معنی داری هستند (P<0.05).

جدول ۳ - میزان * پارامترهای هماتولوژیک خون گاو پس از تزریق فلورینیکسین مگلومین (n=5).

| بازوفیل | | انوزینوفیل | | منوسیت | | لنفوسیت | | نوتروفیل | | تعداد گلوبولهای سفید (۱۰ ^۳ μ l) | هموگلوبین (g/dl) | هماتوکریت (%) | تعداد گلوبولهای (۱۰ ^۳ μ l) | پارامتر قرمز (۱۰ ^۳ μ l) | گروههای آزمایشی شاهد |
|----------------------------|------|----------------------------|------|----------------------------|----------|----------------------------|------|----------------------------|------|------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------|
| (x10 ^۳ μ l) | (%) | (x10 ^۳ μ l) | (%) | (x10 ^۳ μ l) | (%) | (x10 ^۳ μ l) | (%) | (x10 ^۳ μ l) | (%) | ۸/۹ ± ۰/۴ | ۱۲/۳ ± ۰/۴ | b ۳۲/۸ ± ۰/۶ | ۸/۵ ± ۰/۲ | | |
| ۰/۰ | ۰/۰ | ۰/۱ | ۱/۹ | ۰/۲ | b ۲/۳ | ۶/۴ | ۷۱/۸ | ۲/۱ | ۲۳/۸ | | | | | | شاهد |
| ±۰/۰ | ±۰/۰ | ±۰/۰ | ±۰/۵ | ±۰/۰ | ±۰/۳ | ±۰/۱ | ±۲/۰ | ±۰/۱ | ±۱/۸ | | | | | | یکروز پس از تزریق دارو |
| ۰/۰ | ۰/۰ | ۰/۱ | ۱/۸ | ۰/۱ | ۲/۰ | ۶/ | | | | | | | | | |

جدول ۴ - میزان* پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون گاو پس از تزریق فلونیکسین مگلومین (n=۵).

| پارامتر | گروههای آزمایشی | پروتئین (g/dl) | آلبومین (g/dl) | گلوبولین (g/dl) | گلوكز (mg/dl) | ازت اوره (mg/dl) | کراتینین (mg/dl) | کلسیم (mg/dl) | فسفر (mg/dl) | A ST (U/L) |
|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------|------------|
| شاهد | | ۵/۸±۰/۱ | ۲/۸±۰/۱ | ۲/۰±۰/۱ | ۷۲/۹±۵/۶ | ۸/۳±۰/۶ | ۲/۴±۰/۰ | ۱۱/۰±۰/۳ | ۶/۷±۰/۴ | ۱۸۱/۰±۱۴/۴ |
| یکروز پس از تزریق دارو | | ۵/۱±۰/۲ | ۳/۲±۰/۲ | ۱/۹±۰/۳ | ۵۶/۲±۳/۵ | ۵/۶±۱/۰ | ۳/۹±۰/۴ | ۹/۵±۰/۴ | ۷/۰±۰/۴ | ۶۹/۲±۱۱/۹ |
| دروز پس از تزریق دارو | | ۵/۹±۰/۲ | ۳/۳±۰/۰ | ۲/۴±۰/۱ | ۵۶/۷±۴/۴ | ۴/۴±۰/۹ | ۲/۴±۰/۳ | ۹/۵±۰/۵ | ۶/۳±۰/۸ | ۵۵/۶±۱۲/۹ |
| سه روز پس از تزریق دارو | | ۵/۵±۰/۲ | ۳/۳±۰/۲ | ۲/۲±۰/۱ | ۶۶/۲±۲/۶ | ۷/۹±۱/۸ | ۲/۳±۰/۳ | ۸/۹±۰/۳ | ۶/۳±۰/۴ | ۷۷/۲±۱۳/۸ |
| چهار روز پس از تزریق دارو | | ۵/۶±۰/۲ | ۳/۲±۰/۱ | ۲/۴±۰/۲ | ۶۶/۷±۱/۴ | ۳/۸±۰/۳ | ۲/۱±۰/۳ | ۸/۸±۰/۳ | ۷/۲±۰/۷ | ۴۷/۲±۱۲/۵ |
| پنج روز پس از تزریق دارو | | ۵/۴±۰/۴ | ۳/۳±۰/۳ | ۲/۰±۰/۲ | ۶۴/۸±۲/۷ | ۷/۸±۱/۷ | ۲/۲±۰/۳ | ۹/۱±۰/۴ | ۶/۶±۰/۶ | ۶۴/۵±۲۲/۴ |
| شش روز پس از تزریق دارو | | ۵/۷±۰/۵ | ۲/۶±۰/۱ | ۲/۹±۰/۴ | ۵۰/۱±۶/۹ | ۱۰/۵±۳/۳ | ۲/۰±۰/۱ | ۱۱/۶±۰/۵ | ۷/۷±۰/۴ | ۱۴/۰/۴±۶/۸ |
| هفت روز پس از تزریق دارو | | ۵/۶±۰/۳ | ۳/۴±۰/۲ | ۲/۲±۰/۲ | ۶۳/۱±۳/۱ | ۷/۲±۱/۲ | ۱۱/۱±۰/۴ | ۶/۹±۰/۷ | ۱۵/۲±۱۰/۱ | |

* میانگین ± خطای انحراف معیار (SEM) در هر ستون میانگینهایی که با حروف لاتین نامتشابه نشان داده شده اند دارای اختلاف آماری معنی داری هستند (P<0.05).

نوتروفیل ها مشاهده کردند و این امر را ناشی از ضایعات و زخمها ایجاد شده در دستگاه گوارش دانستند (۱۸). Oednsvik و Magnusson در سال ۱۹۹۶ پس از تجویز فلونیکسین مگلومین در گاو افزایش معنی داری در منوسیت ها و نوتروفیل های خون مشاهده کردند و علت را افزایش آزادسازی این سلولها از مخزن حاشیه عروق خونی دانستند (۱۴).

در این پژوهش کاهش آلبومین پس از تزریق فلونیکسین مگلومین، احتمالاً بخاطر زخمها گوارشی و دفع آلبومین از راه دستگاه گوارش می باشد (۱۸) و همکاران در سال ۱۹۹۲ پس از تزریق یک میلیگرم در کیلوگرم فلونیکسین مگلومین در سگ افزایش معنی داری در میزان آلبومین سرم مشاهده کردند (۴). نتایج این پژوهشگران با نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر همخوانی ندارد. افزایش گلوبولین های سرم پس از تجویز فلونیکسین مگلومین می تواند ناشی از واکنش بدن گاو در مقابل دارو باشد (۳). در پژوهش حاضر کاهش غلظت گلوكز احتمالاً ناشی از کاهش متابولیسم کلی بدن در اثر فلونیکسین مگلومین می باشد (۲، ۳). برخلاف نتیجه به دست آمده در گاو، Elwood و همکاران در سال ۱۹۹۲ پس از تزریق فلونیکسین مگلومین در سگ، افزایش ملایمی در میزان گلوكز سرم مشاهده کردند (۴).

کاهش میزان ازت اوره خون پس از تزریق فلونیکسین مگلومین در گاو احتمالاً ناشی از اثر دارو بر کبد و کاهش تولید اوره در چرخه اوره است. افزایش کراتینین سرم نیز می تواند ناشی از کاهش پالایش گلومرولی و اثر سوء دارو بر کلیه ها باشد (۳) در این رابطه، Elwood و همکاران در سال ۱۹۹۲ پس از تزریق یک میلیگرم در کیلوگرم فلونیکسین مگلومین در سگ، افزایش معنی داری در میزان کراتینین سرم مشاهده کردند و اظهار داشتند که در مواردی که فشار و حجم خون در سگ پایین است استفاده از این دارو سبب نارسایی حاد کلیوی می شود.

فلونیکسین مگلومین از عمل پروستاگلاندین ها جلوگیری کرده و با نارسایی در خونرسانی کلیه ها و ایسکمی، سبب نارسایی حاد کلیوی می شود. درنتیجه، کراتینین سرم افزایش می یابد (۴). Gunson در سال ۱۹۸۳ در مطالعه ای بر روی ۱۶ رأس اسب، عوارض سمی فلونیکسین مگلومین را نارسایی کلیوی و نکروز پاپیلاری کلیه ها دانستند (۹). در پژوهش حاضر تصور می شود کاهش میزان کلسیم پس از تجویز

جدول ۵ - درصد تغییرات پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی سرم خون گاوها مورد آزمایش بعد از تزریق کتوپروفون (n=۱۱) و فلونیکسین مگلومین (n=۵).

| پارامتر | فلونیکسین مگلومین | کتوپروفون |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------|
| تعداد گلوبولهای قرمز (۱۰ ^۶ /ml) | - | - |
| هماتوکریت (%) | -۶/۷ | - |
| هموگلوبین (g/dl) | - | - |
| تعداد گلوبولهای سفید (۱۰ ^۳ /ml) | - | - |
| نوتروفیل (%) | ۲/۲۲ | - |
| لتفوسيت (%) | - | - |
| منوسیت (%) | ۳۱/۸ | - |
| اوزینوفیل (%) | - | - |
| بازوفیل (%) | - | - |
| بروتئین (g/dl) | - | - |
| آلبومن (g/dl) | -۱۶/۶ | - |
| گلوبولین (g/dl) | ۱۵/۴ | - |
| گلوكز (mg/dl) | -۱۷ | - |
| ازت اوره (mg/dl) | -۱۸/۵ | - |
| کراتینین (mg/dl) | ۲/۹ | ۳۶ |
| کلسیم (mg/dl) | -۱۰/۷ | - |
| فسفر (mg/dl) | - | - |
| (U/L) AST | -۵۲/۱ | - |

خون در اثر دارو می باشد. Ewert و همکاران در سال ۱۹۸۵ پس از تجویز فلونیکسین مگلومین به میزان ۱/۱ میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن در اسبچه هایی که قبلاً ۱۲۵ میکروگرم در کیلوگرم اندوتوكسین اشریشیاکلی (E.coli) دریافت کرده بودند، کاهش معنی داری در میزان هماتوکریت مشاهده کردند. این پژوهشگران دلیل کاهش هماتوکریت را عمل مهاری فلونیکسین مگلومین در کنترل خروج پلاسمما از رگهای خونی بیان کردند (۵). Green و همکاران در سال ۱۹۹۷ پس از تجویز ۱۰۰۰ میلی گرم فلونیکسین مگلومین به گاوها می بینند که مبتلا به ورم پستان سمی بودند، تغییرات مشخص و معنی داری در میزان هماتوکریت مشاهده نکردند (۷).

در پژوهش حاضر، نوتروفیل و منوسیتوز حاصله در اثر تزریق فلونیکسین مگلومین احتمالاً ناشی از مهاجرت گلوبول های حاشیه عروق خونی به داخل گردش خون و کاهش مهاجرت بافتی این گلوبول ها به وسیله دارو است (۳). Vonderharr و Salisbury در سال ۱۹۹۳ پس از تجویز فلونیکسین مگلومین در سگ، کم خونی مشخصی همراه با افزایش گلوبولهای سفید بویژه



References

1. Adams, H.R. (1995): Veterinary Pharmacology and Therapeutics. 7th ed. Iowa State University Press. U.S.A. PP: 279-443.
2. Burtis, C.A. and Ashwood, E.R.(1994): Tietz Textbook of Clinical Chemistry. 2nd ed. W.B. Saunders Co. Philadelphia. PP: 735-888, 1354-1375.
3. Duncan, J.R. Prasse, K. W. and Mahaffey, E.A. (1994): Veterinary Laboratory Medicine. Clinical Pathology. 3rd ed. Iowa State University Press. U.S.A. PP: 30-61, 146-211.
4. Elwood, C., Boswood, A., Simpson, K. and Carmichael, S. (1992): Renal failure after flunixin meglumine administration. Vet. Rec. 130: 582-583.
5. Ewert, K.M., Fessler, J.F., Templeton, C.B., Bottoms, G.D., Latshow, H.S. and Johnson, M.A. (1985): Endotoxin – induced hematologic and blood chemical changes in ponies: Effect of flunixin meglumine, dexamethasone and prednisolone. Am. J. Vet. Res. 46: 24-30.
6. Fenwick, D.C. and Daniel, R.C. W. (1996): Evaluation of the effect of ketoprofen on experimentally induced ephemoral fever in dairy heifers. Am. J. Vet. Rec. 74: 37-41.
7. Green, M. J., Green, J. E. and Crips, P.J. (1997): Comparison of fluid and flunixin meglumine therapy in combinaticon and individually in the treatment of toxic mastitis. Vet. Rec. 140: 149-152.
8. Gregoricka, M.J., Sutherland, S.F., Dedrickson, B.J. and Busch, K. R. (1990): Assessment of the intramuscular administration of ketoprofen. Eq. Pract. 12: 15-22.
9. Gunson, D.E. (1983): Renal papillary necrosis in horses. JAVMA. 182: 263-266.
10. Jain, N.C. (1986): Schalm's Veterinary Hematology. 4th ed. Lea and Febiger. Philadelphia. PP: 20-36.
11. Landoni, M.F. and Less, P. (1995): Compariscon of the anti-inflammatory actions of flunixin meglumine and ketoprofen in horses applying PK/PD modelling. Eq. Vet. J. 27: 256-274.
12. Longo, F., Autefage, A., Bayle, R., Keister, M. and Gool, F. (1992): Efficacy of a nonsteroidal anti inflammatory, ketogen 10% (ketoprofen) in the treatment of colic horses. J. Eq. Vet. Sci. 12: 311-315.
13. Macallister, C.G., Morgan, S.J., Robene, A. T. and Pollet, R.A. (1993): Compariscon of adverse effects of phenylbutazone, flunixin meglumine and ketoprofen in horse. JAVMA. 202: 71-77.
14. Odensvik, K. and Magnusson, U. (1996): Effect of oral administration of flunixin meglumine on the inflammatory response to endotoxin in heifers. Am. J. Vet. Res. 57: 201-204.
15. Oukessou, M., Filali, R., Alvinerie, M. and Gool, F. (1995): Ketoprofen pharmacokinetics in camel (*Camelus dromedarius*). Indian Vet. J. 72: 233-236.

فلونیکسین مگلومین، احتمالاً ناشی از زخم‌های گوارشی و افزایش دفع کلسیم از راه دستگاه گوارش بوده است (۱۸). برخلاف نتایج ما، Macallister و همکاران در سال ۱۹۹۳ پس از تجویز فلونیکسین مگلومین در اسب تغییرات معنی داری در میزان کلسیم و فسفر سرم مشاهده نکردند (۱۳). کاهش فعالیت AST سرم پس از تزریق فلونیکسین مگلومین در گاو احتمالاً به علت کاهش متابولیسم کلی بدن می باشد اگر چه نمی توان در این زمینه توجیه دقیق و خاصی ارایه داد (۳).

در مجموع نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کتوپروفن در مقایسه با فلونیکسین مگلومین دارای اثرات جانبی کمتری بر روی پارامترهای هماتولوژیک و بیوشیمیایی خون گاو است.

- 16.Owens, J.G., Kamerling, S.G., Stanton, S.R. and Keowen, M.L. (1995): Effect of ketoprofen and phenylbutazone on chronic hoof pain and lameness in the horse. Eq. Vet. J. 27: 295-300.
- 17.Semrad, S.D. (1993): Comparative efficacy of flunixin-ketoprofen and ketorolac for treating endotoxemia neonatal calves. Am. J. Vet. Res. 54: 1511-1516.
- 18.Vonderharr, M.A. and Salisbury, S.K. (1993): Gastroduodenal ulceration associated with flunixin meglumine administration in three dogs. JAVMA. 203: 92-95.
- 19.Welsh, E.M., Mckellar, Q.A. and Nolan, A.M. (1993): The pharmacokinetics of flunixin meglumine in the sheep. J. Vet. Pharmacol. Therap. 16: 181-188.
- 20.Welsh, E.M. and Nolan, A.M. (1995): Effect of flunixin meglumine on the thresholds to mechanical stimulation in healthy and lame sheep. Res. Vet. Sci. 58: 61-66.

