

بررسی نقش سردکنهای آبی در چگونگی وضعیت باکتریایی لاشه های مرغ در کشتارگاههای صنعتی استانهای تهران و گیلان

دکتر افشنین آخوندزاده^{*} دکتر علی میثاقی^۱ دکتر سعید بکایی^۱ دکتر تقی زهراei صالحی^۲ دکتر هادی اشپری^۳

دریافت مقاله: ۱۳۸۲ بهمن ماه

پذیرش نهایی: ۱۳۸۲ اسفند ماه

Effects of water chiller on bacterial quality of poultry carcasses in industrial slaughterhouses of Tehran and Gilan provinces

Akhondzadeh, A.,^۱ Misaghi, A.,^۱ Bokaei, S.,^۱ Zahraei-Salehi, T.,^۲ Eshpari, H.^۳

^۱Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran. ^۲Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran.

^۳Graduated from Islamic Azad University of Garmsar, Garmsar-Iran.

Objective: To study the effects of water chiller on microbiological quality of poultry carcasses before and after chilling process in 11 slaughter houses of Tehran and Gilan provinces.

Samples: Seventy five poultry carcasses were collected from 11 industrial slaughterhouses of Tehran and Gilan provinces.

Method: Fifty one poultry carcasses were from 9 industrial slaughter houses of Tehran province and 24 poultry carcasses from 2 industrial slaughterhouses of Gilan province, before and after chilling process, were collected and analysed bacteriologically according to American Public Health Association method. The free chlorine content and temperature of water for every chiller was also measured.

Results: Coliform total count of poultry carcasses which collected after chilling process showed higher load than before chilling in Tehran. Paired-samples T test indicated significant difference ($P<0.05$). One of 51 carcasses which were collected after chilling process in Tehran, and all the carcasses collected in Gilan, before and after chilling process, were *E. coli* positive. The isolated serotypes were O119:B14, O128:K67, O78:K80, O2:K1 and H7. One of 51 poultry carcasses of Tehran province, after chilling, was *Salmonella enteritidis* positive. Free chlorine content of water in 8 slaughter houses, located in Tehran province, was not measurable. Therefore, it was measured in water of one of the slaughterhouses in Tehran and 2 slaughter houses of Gilan which were 0.5, 1 ppm and 0.1 ppm respectively. The mean temperatures \pm standard error of water in chillers of the slaughterhouses of Gilan were 6.1 ± 1.4 and $6.5 \pm 0.7^\circ\text{C}$ respectively.

Concluded: According to the results, water chillers may be consider as a risk of bacterial contamination of pultry carcasses. Therefore hygienic quality control of them is very important. *J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran.* 59, 3: 241-244, 2004.

Key words: Poultry carcasses, Water chiller, Microbial quality, Poultry slaughterhouse.

Corresponding author's email:aakhond@ut.ac.ir

به درجه حرارت پائین مطلوب (عمق عضله سینه ۰/۵ تا ۰/۱۰ درجه سانتیگراد) سریعتر برسرد، تغییرات مورد نظر به کمترین میزان خود خواهد رسید (۱۶). به طور کلی در خط کشتار، میکرارگانیسم های موجود در سطوح کار و پوست سبب آلودگی گوشت مرغ می شود (۵، ۱۶). مهمترین فاکتورهای مرتبط با پردازش میکروبی و آلودگی لашه هادر روش سرد کردن به روش غوطه وری در آب سرد (سردکن آبی) قبل از سرد کردن، میزان جریان آب جاری و

هدف: بررسی نقش سردکنهای آبی در وضعیت میکروبی لاشه های مرغ قبل از ورود و بعد از خروج از سردکن در ۱۱ کشتارگاه صنعتی در استانهای تهران و گیلان.

نمونه ها: هفتاد و پنج لاشه مرغ از ۱۱ کشتارگاه صنعتی در استانهای تهران و گیلان.

روش: تعداد ۵۱ لاشه مرغ از ۹ کشتارگاه صنعتی در استان تهران و ۲۴ لاشه مرغ از ۲ کشتارگاه صنعتی در استان گیلان قبل از ورود و بعد از خروج از سردکنهای آبی از نظر برخی از آزمایشات باکتریایی، طبق روش استاندارد ارائه شده توسط انجمن بهداشت عمومی آمریکا مورد آزمایش قرار گرفتند. در ضمن میزان کل آزاد و درجه حرارت آب هریک از سردکنهای نیز در همان محل اندازه گیری شد.

نتایج: در استان تهران شمارش کلی فرم ها در لاشه های مرغ بعد از خروج از سردکنهای بیشتر از قبل ورود لاشه ها به سردکن بود. با انجام آزمون $\text{P}<0.05$ در سطح اطمینان ۹۵ درصد در نتایج فوق مشاهده شد. یک لاشه از ۵۱ لاشه مرغ بعد از خروج از سردکن آبی در استان تهران و گیلان از نظر اشریشیاکلی مثبت بودند. سروتیپ های شناسایی شده ۹۷% بودند. همچنین یک لاشه از ۵۱ لاشه طیور بعد از خروج از سردکن از نظر سالمونا انسرتیدیس مثبت بود. کل آزاد آب فقط در یک کشتارگاه از ۹ کشتارگاه طیور در استان تهران قابل اندازه گیری و آنهم به میزان 0.5 ppm بود. میزان کل آزاد آب سرد کن در دو کشتارگاه استان گیلان به ترتیب 1 ppm و 0.1 ppm بود. میانگین \pm انحراف معیار درجه حرارت آب سرد کنها در ۹ کشتارگاه طیور صنعتی مورد مطالعه در استان تهران و ۲ کشتارگاه طیور صنعتی در استان گیلان به ترتیب 6.1 ± 1.4 و $6.5 \pm 0.7^\circ\text{C}$ درجه سانتیگراد بود.

نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده چنین بیان می شود که در صورت عدم توجه به وضعیت بهداشتی آب سردکنهای آبی، امکان افزایش بار و آلودگی میکروبی لاشه های مرغ بعد از خروج از سردکن وجود دارد. مجده دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، (۱۳۸۳)، دوره ۵۹ شمله ۲۴۴-۲۴۱.

واژه های کلیدی: لاشه های مرغ، سردکن آبی، وضعیت میکروبی، کشتارگاه طیور.

سرد کردن لاشه های مرغ در مراحل آخر زنجیر کشتار، یکی از فاکتورهای مهم حفظ و نگهداری کیفیت گوشت مرغ به حساب می آید (۱۶). بعد از کشتار تغییرات بیوشیمیایی، فیزیکی، شیمیایی و هیستولوژیکی حاصل از فعالیتهای آتو لیتیکی و باکتریایی اتفاق می افتد. درجه حرارت یکی از فاکتورهای مهم و مؤثر در تسریع این تغییرات می باشد. هرچه گوشت طیور

(۱) گروه آموزشی بهداشت و کنترل مواد غذایی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران.

(۲) گروه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران.

(۳) دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار، گرمسار - ایران.

* نویسنده مسئول aakhond@ut.ac.ir



تهران انجام شد.

جهت اندازه گیری کل آزاد آب از کیت های تجاری در همان محل کشتارگاه (در هنگام نمونه برداری) استفاده شد. در ضمن درجه حرارت آب سرد کنها هم با استفاده از دماسنجدیجیتالی در همان زمان اندازه گیری شد.

نتایج

نتایج شمارش کلی باکتریایی و شمارش کلی فرم ها در نمونه های مورد مطالعه در دو استان تهران و گیلان به ترتیب در جداول ۱ و ۲ نشان داده شده است.

با انجام آزمون t دو طرفه، تفاوت معنی داری ($P < 0.05$) در سطح اطمینان ۹۵ درصد در شمارش کلی فرم ها در لاشه های مرغ بعد از خروج از سرد کنها نسبت به لاشه های مرغ قبل از ورود به سرد کنها آبی در استان تهران مشاهده شد.

یک نمونه از ۵۱ لашه مرغ بعد از خروج از سرد کن آبی در استان تهران از نظر اشرشیا کلی مثبت بود. در حالی که تمام ۲۴ لاشه مرغ قبل از ورود به سرد کن آبی و بعد از خروج از سرد کن در استان گیلان از نظر اشرشیا کلی مثبت بودند. سروتیپ های شناسایی شده O119:B14, O2:K1, O128:K80, O78:K67 و H7 بودند. همچنین یک نمونه از ۵۱ لاشه مرغ بعد از خروج از سرد کن آبی در استان تهران از نظر سالمونولا انتریتیدیس مثبت بود.

کل آزاد آب فقط در یک کشتارگاه از ۹ کشتارگاه طیور در استان تهران قابل اندازه گیری و آن هم به میزان 0.5 ppm بود. میزان کل آزاد آب سرد کن در دو کشتارگاه استان گیلان به ترتیب 1 ppm و 0.1 ppm بود. میانگین \pm انحراف معیار درجه حرارت آب سرد کنها در ۹ کشتارگاه طیور صنعتی مورد مطالعه در استان تهران و ۲ کشتارگاه طیور صنعتی در استان گیلان به ترتیب 14.1 ± 6.1 و 10.7 ± 5.6 درجه سانتیگراد بود.

بحث

بررسیهای متعددی در مورد آلودگی لاشه های مرغ در طی مراحل مختلف زنجیر کشتار و نقش انواع مختلف سرد کنها مورد استفاده در کشتارگاه های طیور در وضعیت بار میکروبی و آلودگی باکتریایی لاشه های مرغ انجام شده است (۱۳، ۱۴، ۲۱، ۲۰). در مطالعه ای توسط Abu-Ruwaida و همکاران در کویت در سال ۱۹۹۴، شمارش کلی باکتریایی، آتریو باکتریاسه و کلی فرم ها، جستجوی اشرشیا کلی، سالمونولا، کمپیلو باکتریو استافیلیو کوک طلایی در لاشه های مرغ در مراحل مختلف کشتار بررسی شد. بیشترین میزان آلودگی بعد از اسکالدینگ و پر کنی بود. سطوح باکتریایی بعد از سرد کنها های هوایی، آبی و بسته بندی تغییر نکرد (۱). این نتایج با نتایج به دست آمده توسط محققین دیگر همخوانی داشت (۱۱، ۱۲، ۱۸). در حالی که Mead و همکاران در سال ۲۰۰۰ نشان دادند سرد کنها نقش بسیار مهمی در آلودگی ثانویه لاشه های مرغ در خط کشتار دارد (۱۴). محققین دیگر بیان نمودند که میزان بار میکروبی لاشه مرغ در روش سرد کردن لاشه به

جاگزین به ازای هر لاشه، نسب تعداد لاشه به میزان آب سرد کن و مقدار آلودگی حتی تعداد کمی از لاشه ها به برخی از باکتری های بیماریزای غذایی، احتمال پخش این آلودگی در سرد کن آبی و در نتیجه آلودگی متقاطع سایر لاشه ها در سرد کن وجود دارد (۱۶) با توجه به مطالب گفته شده از آنجائی که در کشور ما، اصلیترین و متدائلترین روش جهت سرد کردن اولیه لاشه های مرغ در کشتارگاه های صنعتی، غوطه ور کردن لاشه ها در سرد کنها آبی می باشد و با عنایت به احتمال بار میکروبی بالای لاشه های مرغ قبل از ورود به سرد کن، نسبت بالای لاشه به حجم آب و نبود یا کمبود سطح کل آزاد آب سرد کنها، احتمال بار میکروبی بالاتر و آلودگی به برخی از باکتری های بیماریزای غذایی مهم، لاشه های مرغ بعد از خروج از سرد کن آبی وجود دارد. بنابراین در این مطالعه، شمارش کلی باکتری ها، شمارش کلی فرم ها، جستجوی اشرشیا کلی و سالمونولا در تعدادی از لاشه های مرغ، قبل از ورود به سرد کن و بلا فاصله بعد از خروج از سرد کن آبی در کشتارگاه های صنعتی در استان تهران و گیلان مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش کار

پنجاه و یک لاشه مرغ از ۹ کشتارگاه صنعتی طیور در استان تهران و ۲۴ لاشه مرغ از ۲ کشتارگاه صنعتی طیور در استان گیلان بلا فاصله قبل از ورود به سرد کن آبی و بلا فاصله بعد از خروج از سرد کن نمونه برداری شدند و از نظر شمارش کلی باکتریایی، شمارش کلی فرم ها، جستجوی اشرشیا کلی و سالمونولا بر طبق روش های ارائه شده توسط انجمن بهداشت عمومی آمریکا ("APHA") مورد آزمایش قرار گرفتند (۳). برای مشخص نمودن لاشه ها از نوارهای رنگی استریل شده استفاده شد.

جهت شمارش باکتریایی برای تهیه رقت های سریال ۱۰ تایی از نمونه ها، از آب مقطر استریل به عنوان رقیق کننده استفاده شد. از کشت Pour plate و دو لایه به ترتیب با استفاده از محیط های کشت Brain Heart Agar و Violet Red Bile Agar (VRBA) ساخت شرکت مرک برای شمارش کلی باکتریایی و شمارش کلی فرم ها استفاده شد. بر روی $10 \text{ g} / 5 \text{ ml}$ VRBA میلیمتری با رسوب صفراء در اطراف، از محیط جهت تشخیص قطبی کلی فرم ها و جستجوی اشرشیا کلی با استفاده از محیط های آب بیپتونه و آبگوشت سبز در خشان انجام شد.

جهت جستجوی سالمونولا در ۲۵ گرم از هر یک از نمونه ها، به ترتیب از پیش غنی کردن در آبگوشت لاکتوز (مرک)، غنی کردن انتخابی در دو محیط Selenite cystine و Tethrationate (مرک)، کشت بر روی آگار انتخابی Brilliant-green phenol-red lactose sucrose agar (مرک) و آزمایشات بیوشیمیایی و تفریقی Salmonella Shigalla agar استفاده شد. تایپینگ اشرشیا کلی و سالمونولا شناسایی شده با استفاده از آنتی سرم های تجاری دیفکو در گروه میکروبیولوژی دانشکده دامپزشکی



جدول ۲- نتایج شمارش کلی باکتریایی و شمارش کلی فرم هادر ۲۴ لاشه مرغ در ۲ کشتارگاه صنعتی مورد مطالعه در استان تهران.

شمارش کلی فرم ها میانگین ± انحراف معیار	شمارش کلی باکتریایی میانگین ± انحراف معیار	نمونه ها
$۳/۵ \times 10^4 \pm 7/6 \times 10^4$	$۸/۶ \times 10^5 \pm ۲ \times 10^6$	لاشه های مرغ قبل از ورود به سردکن آبی
$۴/۳ \times 10^4 \pm ۷/۱ \times 10^4$	$۳/۳ \times 10^6 \pm ۹/۱ \times 10^6$	لاشه های مرغ بعد از خروج از سردکن آبی

میکروبی، آسودگی باکتریایی ثانویه و کوتاه شدن مدت زمان نگهداری لашه مؤثر می باشدند. بنابراین کنترل سردکنها از نظر میزان کلر مناسب (کلر آزاد آب ppm ۲۰) و درجه برودت مناسب آب (۵ درجه سانتیگراد) و تعویض به موقع آب سردکنها امری ضروری می باشد (۲).

References

1. Abu-Ruwaida, A.S., Sawaya, W.N., Daashti, B.H., Murad, M. and Al-Othman, H.A. (1994): Microbiological quality of broilers during processing in a modern commercial slaughterhouse in Kuwait. *J. Food Protec.* 57 (10): 887-892.
2. Allen, V.M., Corry, J.E.L., Burton, C.H., Whyte, R.T. and Mead, G.C. (2000): Hygiene aspects of modern poultry chilling. *Inter. J. Microbiol.* 58: 39-48.
3. APHA. (1997): Compendium of methods for the Microbiological Examination, 3rd ed. M. L. Speak. American Public Health Association, Washington.
4. Carraminana, J.J., Yanguela, J., Blaanco, D., Rota, C. Agustin, A.I., Ariona, A. and Herrera, A. (1997): *Salmonella* incidence and distribution of serotypes through processing in a Spanish poultry slaughterhouse. *J. Food Protec.* 60: 1312-1317.
5. Cason, J.A., Bailey, J.S., Stern, N.J., Whittemre, A.D., and Cox, N.A. (1997): Relationship between aerobic bacteria, *Salmonella* and *Campylobacter* on broiler carcasses. *Poultry .Sci.* 76: 1037-1041.
6. Geornaras, G. and Holly, A.V. (1994): Bacterial contamination in poultry processing. *Food industries.* 47: 31-34.
7. Geornaras, I. and Gesus, A.E. (1996): Bacterial populations associated with poultry processing in a South African abattoir. *Food Microbiol.* 13: 457-465.
8. James, W.O., Williams, J.W.O., Prucha, J.C., Johnston, R. and Christensen, W. (1992): Profile of selected bacterial counts and *Salmonella* prevalence on raw poultry in poultry slaughter establishment. *J. Am. Vet. Med. Assoc.* 200: 57.
9. Jones, F.T., Axtell, R.C., Rives, D.V., Scheideler, S.E., Tarver Jr., F.R., Walker, R.L. and Wineland, M.J. (1991): A survey of *Campylobacter jejuni* contamination in modern broiler production and processing system. *J. Food Protec.* 54: 259-262.

جدول ۱- نتایج شمارش کلی باکتریایی و شمارش کلی فرم هادر ۵۱ لاشه مرغ در ۹ کشتارگاه صنعتی مورد مطالعه در استان تهران.

شمارش کلی فرم ها میانگین ± انحراف معیار	شمارش کلی باکتریایی میانگین ± انحراف معیار	نمونه ها
$۵ \times 10^3 \pm ۵/۹ \times 10^3$	$۱ \times 10^5 \pm ۱/۶ \times 10^5$	لاشه های مرغ قبل از ورود به سردکن آبی
$۸/۱ \times 10^3 \pm ۱/۱ \times 10^3$	$۱/۲ \times 10^6 \pm ۱/۳ \times 10^6$	لاشه های مرغ بعد از خروج از سردکن آبی

و سیله سردکنهاهای هوایی کمتر از سردکنهاهای آبی که در آن لاشه در آب سردکن غوطه ور می شود، می باشد (۱). مطالعات دیگر نشان داد، در صورتی که روش کلرزنی در سردکنهاهای آبی به طور مناسب اجرا شود در کاهش بار میکروبی لاشه کاراوتر و مؤثتر از سردکنهاهای هوایی می باشد (۱.۱۱). James و همکاران در سال ۱۹۹۲، هیچ گونه کاهشی را در میزان آسودگی سالمونلایی لاشه های مرغ بعد از غوطه ور شدن در سردکنهاهای آبی پیدا نکردند (۸). علیرغم اینکه Jones و همکاران در سال ۱۹۹۱ آسودگی بالای کمپیلو باکتریایی را بعد از خروج لاشه های مرغ از سردکن آبی پیدا کردند (۹)، در بررسی دیگری، Geornaras و همکاران در سال ۱۹۹۶ در کشتارگاههای طیور جنوب آفریقا، نشان دادند که سردکنهاهای آبی از نظر انتقال آسودگی اشرشیا کلی به لاشه های مرغ وارد شده در سردکن نقش داشت (۷) که با نتایج به دست آمده در تحقیق ما همخوانی داشت. Mulder و همکاران در سال ۱۹۹۶ نشان دادند که آب سردکنهاهای آبی نقش مهمی در انتقال آسودگی سالمونلایی کمپیلو باکتری و لیستریا به لاشه های مرغ داشت (۱۵) که با آسودگی سالمونلایی لاشه مرغ، (بل افاضله بعد از خروج از سردکن)، در مطالعه ما در استان تهران همخوانی داشت. Geornaras و همکاران در سال ۱۹۹۴ گزارش نمودند که کلرزنی مناسب آب سردکن نقش بسیار مهمی در جلوگیری از آسودگی لیستریایی و سالمونلایی لاشه مرغ در سردکن آبی دارد (۷). همچنین مطالعات انجام شده توسط Allen و همکاران در سال ۲۰۰۰ نشان داد که کنترل سردکنهاهای آبی (از نظر درجه برودت و میزان کلر آزاد آب) سبب کاهش بار میکروبی کلی و کاهش کلی فرم ها بر روی پوست و محوطه داخلی لاشه و کاهش و یا زیین رفتن کامل باکتری های عامل فساد مهم از قبیل پیزودوموناس می گردد (۲). این نتایج با یافته های Mead و همکاران در سال ۱۹۸۹ همخوانی داشت (۱۱).

با توجه به آسودگی لاشه های مرغ در طی مراحل اولیه کشتار از قبیل اسکالدینگ، پرکنی و تخلیه نامناسب امما و احشا، لاشه های مرغی که وارد سردکن آبی می شوند دارای بار میکروبی بالایی می باشند (۱۱.۱۰.۱۱.۱۲). آز طرفی نتایج کار ما و دیگران نشان داد که در سردکنهاهای آبی غیربهداشتی و نامناسب، لاشه های مرغ بعد از خروج از سردکن دارای بار میکروبی و آسودگی باکتریایی بالاتری می باشند. بنابراین در صورتی که عمل کلرزنی آب سردکن به خوبی انجام نپذیرد و کنترل بهداشتی بر روی آب سردکنها و یخهای مورد استفاده به عمل نیاید، این سردکنها نه تنها در کاهش بار آسودگی و بالا بردن کیفیت و عمر نگهداری نقش ندارند بلکه در افزایش بار



10. Kotula, K.L. and Pandya, Y. (1995): Bacterial contamination of broiler chickens before scalding. *J. Food Protec.* 58: 1326-1329.
11. Mead, G.C. (1989): Hygiene problems and control of process contamination. PP: 183-220. In G. C. Mead (Ed). *Processing of poultry*. Elsevier Applied Science, London.
12. Mead, G.C. (1990). Food poisoning *Salmonella* in the poultry-meat industry. *British Food J.* 92: 32-36.
13. Mead, G.C. and Scott, M.J. (1994): Coagulase-negative *Staphylococci* and *Coliform* bacteria associated with mechanical defeathering of poultry carcasses. *Letters in Applied Microbiol.* 18: 62-64.
14. Mead, G.C., Allen, V.M., Burton, C.H. and Corry, J.E.L. (2000): Microbial cross contamination during air chilling of poultry. *British poultry science*. 41: 158-162.
15. Mulder, R.W.A.W. (1996): The impact of slaughter technologies on microbial contamination of poultry meat. *Misset Wourl Poultry*. 12: 44-46.
16. Petrak, T., Kalodera, Z., Novakoviæ, P. and Karolyoi, L.G. (1999): Bacteriological comparison of parallel and counter flow water chilling of poultry meat. *Meat. Sci.* 53: 269-271.
17. Ristic, M. (1997): Application of chilling methods on slaughtered poultry. *Die Fleischwirtschaft*. 77: 810-811.
18. Scmitt, R.E., Gallo, L. and Schmidt-Lorenz, W. (1988): Microbial spoilage of refrigerated fresh broilers. IV. Effect of slaughtering procedure on the microbial association of poultry carcasses. *Lebensm-Wiss. u.-Technol.* 21: 234-238.



منابع و راههای انتقال اسیست آیمیریا به سالنهای پرورش طیور صنعتی شهرستان ارومیه

دکتر موسی توسلی^{۱*} دکتر منصور پاشایی^۲

دریافت مقاله: ۱۸ دی ماه ۱۳۸۱
پذیرش نهایی: ۲۱ دی ماه ۱۳۸۲

Sources and transfer routes of *Eimeria* oocyst to poultry farms in Urmia

Tavassoli, M.,¹ Pashaii, M.²

¹Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine University of Urmia, Urmia-Iran. ²Veterinary Practitioner (Private Sector).

Objective: Determination of sources and transfer routes of *Eimeria* oocyst in poultry farms.

Design: Cross sectional study.

Samples: Samples were taken from 47 houses belong to 30 poultry farms. Samples were obtained from litter, worker hands, boots, wheelbarrows, stacked lime and dust around the houses.

Procedure: The samples were floated in sugar solution.

Results: The results indicated that oocysts found in litter, worker hands, boots, wheelbarrows and dust around the house were 27, 10, 17, 12 and 14, respectively. No oocyst were found in stalked lime.

Implications: It is suggested that synchronized usage of lime in front of the doors and litter, worker hands must be disinfected with detergents, boots and wheelbarrow should be washed with detergents and stalked lime. *J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran.* 59, 3: 245-247, 2004.

Key words: Lime, Poultry farm, *Eimeria*, Transfer routes.

Corresponding author's email: mtavassoli2000@yahoo.com

مواد و روش کار

در شهرستان ارومیه سه شرکت تعاونی فعال مرغداران وجود دارد که مرغداریها عمدها عمدتاً عضو یکی از این تعاونیها می باشند. این سه تعاونی ۱۲۳ واحد مرغداری صنعتی را تحت پوشش دارند که ظرفیت کلی آنها حدود ۲۲۱۴۰۰۰ قطعه می باشد. با این وجود معدودی از مرغداریها در زمان انجام بررسی (۱۳۷۸/۱۱/۲۵ تا ۱۳۷۹/۱۱/۲۵) از تمام ظرفیت خود برای تولید بهره می برند. با توجه به پراکنده شدن مرغداریها در اطراف ارومیه، نمونه گیری از ۴۷ سالن متعلق به ۳۰ واحد مرغداری گوشته و تخمگذار انجام شد. سن طیور در سالنهای نمونه گیری شده بین ۴-۶ هفته بود. از هر سالن نمونه بستر سالن مرغداری، دست کارگر، چکمه کارگر، چرخ دستی انتقال دان به داخل سالن، آب آهک جلو در ورودی سالن و خاک اطراف در ورودی سالن مرغداری نمونه به طور جداگانه جمع آوری و بعد از ثبت مشخصات نام برداری از بستر شامل برداشت نمونه از ۱۰ نقطه مختلف سالن از اطراف داخوری و آبخوری بوده. نمونه برداری از دست کارگران به صورت شستشوی دست و مسواک کشیدن زیر ناخن آنها انجام می گرفت. برای نمونه برداری

هدف: مشخص نمودن منابع و راههای انتقال اسیست آیمیریا به سالنهای پرورش طیور صنعتی.

طرح: مطالعه مقطعی.

نمونه ها: نمونه گیری از ۴۷ سالن مربوط به ۳۰ واحد مرغداری اطراف شهرستان ارومیه انجام شد.

روش: نمونه گیری از بستر سالن مرغداری، دست کارگران، چکمه کارگران، چرخ دستی، آب آهک جلو در ورودی سالن و خاک اطراف مرغداری و شناورسازی نمونه ها با آب شکر اشبع.

نتایج: نتایج حاکی از آن است که آلوودگی به اسیست آیمیریا در نمونه بستر ۲۷ سالن، چکمه کارگران ۱۷ سالن، خاک اطراف ۱۴ سالن، چرخ دستی ۱۲ مورد و دست کارگران ۱۰ سالن وجود داشته است. در بررسی حاضر از آب آهک جلوی در ورودی سالن نمونه اسیستی جدا نگردید.

نتیجه گیری: توصیه می گردد همزممان با استفاده از آب آهک در جلوی سالن و مخلوط کردن بستر با آهک در زمان ورود یا خروج، چکمه کارگران به خوبی شسته شده و در استفاده از چرخ دستی به دلیل نقش آن در جایه جایی اسیست در داخل یا خارج سالن اقدامات لازم جهت ضد عفونی آن انجام شود. مجله داشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، ۱۳۸۳(۲)، دوره ۵۹ شماره ۳، ۲۴۵-۲۴۷.

واژه های کلیدی: آب آهک، آیمیریا، راههای انتقال، سالنهای پرورش طیور.

بدون شک پیشگیری و مبارزه با بیماری کوکسیدیوز از درمان آن مهمتر است، زیرا علاوه بر خسارات حاصل از تلفات و هزینه های درمانی، طیور بهبود یافته از بیماری تا مدت مديدة در دوره نقاشه بسر برده و نمی توانند به حالت طبیعی خود باز گردند. این دسته از طیور تا مدت های طولانی اسیست عامل بیماری را دفع می کنند. بهترین راه پیشگیری از بیماری کوکسیدیوز در طیور ممکن است از بلع اسیست عامل بیماری (تنها راه انتقال طبیعی انگل) است که باعث قطع چرخه زندگی گونه های آیمیریا می شود. در ارتباط با کنترل کوکسیدیوز باید توجه داشت که تنها قطع چرخه زندگی گونه های آیمیریا می تواند از ایجاد بیماری جلوگیری کند. این امر با تماس کمتر پرنده با مدفوع، تمیز و ضد عفونی کردن سالنهای قبل از جوجه ریزی و استفاده از مواد ضد کوکسیدیایی در غذا میسر می باشد. با توجه به اینکه انتقال اسیست از یک واحد مرغداری به واحد دیگر به شکل مکانیکی انجام می شود، بدین منظور جهت مشخص نمودن منابع و راههای انتقال اسیست آیمیریا به سالنهای پرورش طیور صنعتی بررسی حاضر با نمونه گیری از بستر سالن مرغداری، دست کارگران، چکمه کارگران، چرخ دستی، آب آهک جلوی در ورودی سالن و خاک اطراف مرغداری انجام گرفت.

(۱) گروه آموزشی پاتوبیولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه، ارومیه - ایران.

(۲) دامپزشک بخش خصوصی.

* نویسنده مسئول mtavassoli2000@yahoo.com



جدول ۱- تعداد نمونه و محل نمونه برداری از نظر آلودگی به اسیست آیریا.

درصد آلودگی	تعداد نمونه آلوده	تعداد نمونه	تعداد نمونه برداری	محل نمونه برداری
۵۷/۴۴	۲۷	۴۷	بستر	
۴۲/۵۰	۱۷	۴۰	چکمه	
۲۵	۱۰	۴۰	دست کارگر	
۲۵/۵۳	۱۲	۴۷	چرخ دستی	
-	-	۴۷	آب آهک	
۲۹/۷۸	۱۴	۴۷	خاک اطراف	

برد. عوامل محیطی و مدیریتی از عوامل مهم در کاهش یا افزایش آلودگی‌های کوکسیدیایی به شمار می‌آیند. وضعیت مناسب و مطلوب بستر، خشک بودن آن بخصوص زیر آبخوریها، تعویض و اصلاح به موقع آن بخصوص در مراحل اولیه بیماری یا موقعی که خطر شیوع در میان است، نگهداری طیور روی نرده‌های چوبی در مناطق مطبوعی که کوکسیدیوز شیوع فراوانی دارد و استفاده از ترکیب پودر آهک و سولفات آمونیوم با غلظت مناسب روی کف آشیانه‌ها جهت ضد عفنونی و ایجاد قشر نازک آهکی روی کف آشیانه قبل از پخش پوشال در کاهش وقوع کوکسیدیوز اهمیت زیادی دارند(۱). اگر بستر خشک نگاه داشته شود می‌تواند مواجه شدن با عامل بیماری را کاهش دهد. زیرا خشک نگاه داشتن بستر شرایط مناسب برای اسپوردار شدن اسیست‌هارا در محیط از بین می‌برد(۲). باید از مرتبط شدن بستر بویژه در اطراف آبخوری‌ها اجتناب شود(۸).

آهک زنده یکی از مواد ضد عفنونی محسوب می‌شود که از سالیان دراز در مرغداریها مورد استفاده قرار داشته است. عمل آب آهک بستگی به آزاد شدن حرارت و اکسیژن در زمانی دارد که با آب مخلوط می‌شود. در مرغداریها از آهک برای ضد عفنونی فاضلاب، محل جمع آوری کود، چاه تلفات و آغشته نمودن قسمتهای مختلف با آن و ریختن در اطراف سالنه استفاده می‌شود و نظر به اینکه آب آهک سوزاننده است لذا باید مرغها از تماس با آن دور بمانند(۵).

برای ضد عفنونی جایگاه طیور از آب آهک با غلظت (۵ در هزار) و برای ضد عفنونی بستر برای هر متر مربع از سطح ۱۰-۵ کیلوگرم آهک به ازای هر متر مربع از سطح استفاده می‌شود(۶).

استفاده هفتگی از پودر آهک آب دیده و خشک به منظور مخلوط نمودن با بستر در کاهش رطوبت بستر مؤثر می‌باشد(۴). در بررسی حاضر از آب آهک جلوی در ورودی سالن نمونه اسیستی جدا نگردید بدین دلیل توصیه می‌گردد همزمان با استفاده از آب آهک در جلوی سالن و مخلوط کردن بستر با آهک، چکمه‌های کارگران در زمان ورود یا خروج با آب آهک بخوبی شسته شده و در صورت استفاده از چرخ دستی، به دلیل نقش آن در جایه جایی اسیست در داخل یا خارج سالن اقدامات لازم جهت ضد عفنونی آن حداقل با آب آهک انجام شود.

از آنجا که برای اسپوردار شدن اسیست‌های آیریا به رطوبت نیاز می‌باشد. خشک نگه داشتن بستر از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است

از چرخ دستی، از مواد جمع شده در چرخ‌ها نمونه برداشت می‌شد. از آب آهک جلوی در سالن به میزان ۵۰ سی سی برداشت می‌شد. نمونه گیری از اطراف در ورودی با جارو کردن گرد و خاک و مواد جمع شده انجام می‌گرفت. نمونه گیری از چکمه شامل جدا کردن مواد چسبیده به کف چکمه و شستشوی آن بود. نمونه‌ها با استفاده از روش شناور سازی با سانتریفوژ، شناور شده و از محلول شکر اشباع به عنوان ماده شناورساز استفاده می‌گردید(۷،۹).

نتایج

در این بررسی از بستر سالن، چرخ دستی، خاک اطراف و آب آهک سالن و دست و چکمه کارگران ۴۰ سالن نمونه گیری به عمل آمد. نتایج حاکی از آن بود که آلودگی به اسیست آیریا به ترتیب در نمونه بستر ۲۷ سالن (۵۷/۴۴ درصد)، چکمه کارگران ۱۷ سالن (۴۲/۵ درصد)، خاک اطراف ۱۴ سالن (۲۹/۷۸ درصد)، چرخ دستی ۱۲ مورد (۲۵/۵۳ درصد) و دست کارگران ۱۰ سالن (۲۵ درصد) وجود داشت. از آب آهک جلوی در سالن اسیست جدا نشد (جدول ۱). در ۱۰ مورد آلودگی دست کارگران همزمان آلودگی به اسیست در سالنهای وجود داشت و ۱۲ مورد آلودگی توأم در بستر و خاک اطراف، ۱۷ مورد چکمه و بستر و ۱۱ مورد چرخ دستی و بستر وجود داشت.

بحث

طیور غیرآلوده با بلع اسیست به طور طبیعی به بیماری کوکسیدیوز مبتلا می‌شوند و جوجه‌های مبتلا یا شفا یافته در این حالت اسیست‌ها را در محیط پخش می‌نمایند. اسیست آیریا قادر است به مدت طولانی حتی تا ۸۶ هفته در خاک زنده بماند. انسان می‌تواند ناقل این بیماری از آشیانه‌ای به آشیانه‌های دیگر یا از یک قسمت آشیانه به قسمت دیگر باشد. حشرات، جوندگان و طیور وحشی از دیگر ناقلین مکانیکی این بیماری به شمار می‌روند. اسیست‌ها در بسترها بیانی که قبل از مورد استفاده قرار گرفته و به مدفع مکانیکی آلوده شده‌اند، وجود دارند. همچنین اسیست‌ها براحتی با گرد و غبار یا به وسیله چکمه، کفش، لباس، سبدهای حمل مرغ و چرخهای وسائل نقلیه به شکل مکانیکی انتشار می‌یابند. اسیست‌ها ممکن است برای چند هفته در خاک زنده باقی بمانند و لیکن باقی آنها در بستر به چند روز محدود می‌شود و این نیز به دلیل آزاد شدن آمونیاک از بستر و یا اعمال باکتری‌ها و فارچه‌ها باشد. انتقال اسیست‌ها از مزرعه‌ای به مزرعه دیگر به شکل مکانیکی توسط رفت و آمد پرسنل و انتقال وسایل و یا ورود پرنده‌گان وحشی انجام می‌شود(۳،۸).

عوامل متعدد داخلی و خارجی در بروز و شدت آلودگی کوکسیدیایی مؤثرند که از مهمترین آنها می‌توان ترکیب جیره غذایی، عوامل محیطی نظیر رطوبت، درجه حرارت آشیانه، رطوبت بستر، استرس‌ها، مدیریت، میزان آلودگی، زننده و حساسیت طیور، سن و دخالت سایر بیماریها را نام



آنها در انتقال اسیست ها پیشنهاد می گردد ضمن کوتاه نگهداشتن ناخنها، شستشوی دست با دترجنت ها در برنامه کاری کارگران گنجانده شود.

References

۱. اخیانی، م. (۱۳۷۲): کوکسیدیوز طیور، عوامل مؤثر در بروز و کنترل مؤثر آن، چکاوک دوره دوم، شماره ۶، صفحه: ۳۰-۳۹.
۲. جوردن، اف، تی، دبلیو و پاتیسون، ام. (۱۳۷۷): بیماریهای طیور، ترجمه محمد حسن بزرگمهری فرد و همکاران، معاونت کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر، صفحه: ۴۲۸.
۳. رحیم زاده، ا. غفوری، ن و میرسلیمی، م (۱۳۷۳): مروری تازه بر بیماری کوکسیدیوز طیور، چکاوک، دوره سوم، شماره ۱، صفحه: ۴۷-۷۳.
۴. شمسایی، ام. و شهیدی، م. (۱۳۶۳): اهم بیماریهای پنجمانه اقتصادی در طیور ایران چاپ اول دفتر نشر خودکفایی، صفحه: ۷۱-۷۹.
۵. شیمی، ا. و اکبری، ع. (۱۳۷۸): بیماریهای طیور، موسسه فرهنگی و هنری بشیر علم و ادب، صفحه: ۱۱۰.
۶. صیونیت، م. (۱۳۶۸): دانستنیهای دامداری و مرغداری، صفحه: ۱۲.
۷. کولویل، ذ. (۱۳۷۸): انگل شناسی تشخیصی برای کادر دامپزشکی ترجمه موسی توسلی، انتشارات جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی، صفحه: ۲۲-۲۳.
۸. وايتمن، سی. ای. و بیکفورد، ای. ای. (۱۳۷۵): راهنمای بیماریهای طیور، ترجمه محمد حسن بزرگمهری فرد و همکاران، واحد آموزش و پژوهش معاونت کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر، صفحه: ۲۴۱-۲۴۲.
۹. هندریکس چارلز، م. ک. (۱۳۸۱): انگل شناسی تشخیصی دامپزشکی ترجمه موسی توسلی، انتشارات دانشگاه ارومیه، صفحه: ۴۰-۹-۴۱۰.
10. Kenneth, W. Bafundo. (1991): Managing coccidiosis especially in broiler breeders pullets. Misset -World Poultry 7: 9.
11. Levine, N.D. (1985): Veterinary Protozoology, Iowa University Press. PP: 225-227.
12. Opitz, H. Michael. (1996): Disinfection poultry houses requires attention to details, Poultry Digest. 8: 26-31.
13. Ruff, M.D. (1993a): External and internal factors affecting the severity of avian coccidiosis. 6th international coccidiosis conference, Canada. PP: 21-25.
14. Ruff, M.D. (1993 b): The value of severity testing with avian coccidiosis. Poultry Digest. 52: 32.

در بسیاری از نقاط وضعیت بستر و رطوبت آن دقیقاً با تهويه سالن ارتباط دارد. در چنین نقاطی سیستم جا به جایی هوا باید طوری تنظیم شود که مقدار رطوبت بستر کاهش یابد البته نه در حدی که به تولید گرد و غبار منجر شود (رطوبت مناسب بستر ۲۲-۲۲ درصد بیمی باشد). از آنجا که شرایط محیطی سریعاً تغییر می کنند برای اطمینان از عدم ایجاد شرایط محیطی مناسب برای اسپوردار شدن اسیست ها، نظارت و کنترل دائمی ضروری به نظر می رسد. به حداقل رساندن شرایط مناسب برای اسپوردار شدن اسیست ها، میزان برخورد و مواجه شدن با عامل بیماری را کاهش می دهد (۱۰).

همان طور که در مورد بیماریهای دیگر نیز مطرح است باید در مورد کوکسیدیوز نیز یک برنامه ضد عفونی دقیق را به کار برد. البته این امر موجب محافظت صد درصد گله در مقابل کوکسیدیوز نمی شود اما ضرر های اقتصادی ناشی از آن را کاهش می دهد. در طی سالهای متمادی نتایج حاصله از مطالعات انجام شده بر روی استفاده از مواد شیمیایی ضد عفونی کننده جهت کنترل کوکسیدیوز نامید کننده بوده است. نشان داده شده است که اسیست ها نسبت به مواد ضد عفونی کننده متداول شناخته شده مانند فرمالین، ترکیبات چهارتانه آمونیوم، سولفات مس، اسید سولفوریک، هیدروکسید پتاسیم و پرمونگنات پتاسیم مقاوم می باشند. تعداد کمی از اسیست ها با وجود رعایت بهداشت و شستشوی دقیق همیشه زنده می مانند (۳،۱۱). تقلیل دادن عوامل بیماریزا به مقدار بی خطر برای پیشگیری از وقوع بیماری و کاهش تولید از معمول ترین اهداف ضد عفونی سالنهای مرغداری به شمار می آید. از بین بردن عوامل بیماریزا ممکن است با هدف ریشه کنی برخی از این عوامل باشد. ضد عفونی کننده ها باید به دقت و با در نظر گرفتن شرایط مزرعه انتخاب شوند. هیچیک از ترکیبات ضد عفونی کننده موجود بهترین نیستند. ضد عفونی به طور معمول پس از تخلیه گله قبلی و قبل از جوجه ریزی سالنهای مرغداری انجام می شود. ضد عفونی به طور کلی خطر بروز بیماری را کم می کند و تولید را در گله های جایگزین بالا می برد. ضد عفونی آشیانه در برگیرنده تمام قسمتهای داخلی ساختمان (تجهیزات، محل انبار و خطوط آب) می باشد. پاکسازی و ضد عفونی قسمتهای خارجی ساختمان باید تا آنجا که ممکن است بویژه در نواحی اطراف دریچه ها، هواکش و درها انجام شود (۱۲). به منظور کاهش تعداد اسیست ها استفاده از مواد ضد عفونی کننده مؤثر بر اسیست آیمیریا مانند سولفات آمونیوم در داخل و خارج سالن توصیه می شود.

به حداقل رساندن ضایعات ناشی از بیماری با آموزش های بهداشتی و مدیریتی به مرغداران، کارگران و دست اندکاران این صنعت در ارتباط با چگونگی انتقال، روش های ضد عفونی، اصلاح وضعیت نامناسب و مرطوب بستر و تهیه دان مناسب با داشتن مواد مغذی و ویتامین های ضروری، در قرنطینه نگهداشتن طیور مبتلا و انجام مراقبتهاي بهداشتی و درمانی مورد نیاز می تواند از ضایعات و هزینه های مربوط به تلفات، کاهش وزن و مصرف داروها بکاهد (۱۴). نظر به آنودگی دست کارگران به اسیست آیمیریا و دخالت



