

# بررسی قابلیتهای رادیوگرافی در تشخیص عوارض و بیماریهای گاو

دکتر سارنگ سروری<sup>۱\*</sup> دکتر افشین رئوفی<sup>۱</sup> دکتر محمد مهدی دهقان<sup>۱</sup> دکتر علی اشرفی<sup>۲</sup>

دریافت مقاله: ۱۳۸۱ دی ماه

پذیرش نهایی: ۱۳۸۲ اسفند ماه

## Potential of radiography in diagnosis of diseases and disorders in cattle

Soroori, S.,<sup>1</sup> Raoofi, A.,<sup>2</sup> Dehghan, M.M.,<sup>1</sup> Ashrafi, A.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran-Iran. <sup>2</sup>Graduated from Islamic Azad University of ShahreKord, ShahreKord-Iran.

**Objective:** The aim of this study was to determine the frequency of diagnosed disorders or anomalies in different organs and systems and also effects of breed, age and sex on disorders incidence rate.

**Design:** Retrospective study on cattle radiographs.

**Animals:** A total of 74 cattle referred to the radiology division.

**Procedure:** Data were collected of 171 cattle radiographs, which had been taken in the division of radiology during a 4-year period between 1998-2002. Radiographs were evaluated for site of injuries and relation of breed, sex and age with disorders incidence rate. The information was finally gathered in charts specified for frequency of disorders, sex, age and breed.

**Results:** The disorders were fractures, osteomyritis, arthritis, actinomycosis, pneumonia, colon atresia, OCD and etc. The most frequent disorder was fractures (16.7%) and sites of the fractures were at lower jaw (7.1%), midshaft of radius and ulna, and digits (each 4.8%). All the colon atresia cases were detected in male calves. Frequency of disorders in immature cattle (89.4%) had a very obvious difference with matures (10.6%). Actinomycosis was more in female.

**Clinical implication:** This study showed the potency of radiography in diagnosis of cattle diseases and disorders and also percentage of incidence probability of them in connection with factors such as sex, breed, age and site in different organs and systems of cattle.

J. Fac. Vet. Med. Univ. Tehran. 59, 2: 153-156, 2004.

**Key words:** Radiography, Cattle, Disease, Disorder.

**Corresponding author email:**soroori@ut.ac.ir

وقت بتوان سابقه و تاریخچه بیمار و بیماری را پیگیری کرد. ۲- استفاده از اطلاعات فوق در برنامه های آموزشی و تحقیقاتی. ۳- استفاده از این اطلاعات در مطالعات اپیدمیولوژیک. ۴- مقایسه آماری اطلاعات به دست آمده با مطالعات سایر محققین.

## مواد و روش کار

مطالعه حاضر بر اساس کلیشه های رادیوگرافی و پرونده های درمانگاهی موارد ارجاعی به بیمارستان دامهای بزرگ دانشکده دامپزشکی از آغاز ارائه خدمات بخش رادیولوژی صورت گرفته است. در این راستا اطلاعات موجود از نظر محل عرضه، حالت گماری، نژاد، سن و جنس دام و تأثیر این فاکتورها بر میزان فراوانی عوارض و بیماریهای متفاوت جمع آوری و ثبت گردید.

هدف: تعیین فراوانی عوارض و بیماریهای مختلف گاوان ارجاعی به بخش رادیولوژی بیمارستان تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد واقع در شهرکیان و تأثیر فاکتورهای نژاد، سن و جنس دام بر میزان وقوع این عوارض و بیماریها.

طرح: مطالعه گذشته نگر کلیشه های رادیوگرافی موجود در بایگانی بخش رادیولوژی بیمارستان تخصصی دانشگاه آزاد شهرکرد.

حيوانات: هفتاد و چهار رأس گاو ارجاعی به بخش رادیولوژی.

روش: صد و هفتاد و یک رادیوگراف مربوط به گاوان ارجاعی به بخش رادیولوژی بیمارستان مربوط به یک دوره ۴ ساله (از خرداد ماه ۱۳۷۷ تا مرداد ماه ۱۳۸۱) مورد مطالعه و ارزیابی گذشته نگر قرار گرفت. رادیوگراف ها از نظر عرضه موجود و اثر فاکتورهای نژاد، سن، جنس و محل عرضه مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات در جداول خاصی به تفکیک فراوانی بیماری، سن، جنس، نژاد و محل عرضه درج گردید.

نتایج: بیماریها و عوارض مشاهده شده شامل شکستگیها، عفونت استخوانی (استئومیلیت)، آرتیت، اکتینومایکوز، پنومونی، آترزی کولون، استوکندرایتیس دیسیکتس (OCD) و... بودند. شایعترین عرضه مشاهده شده در بیماران انواع شکستگیها (۷/۱ درصد) بود. شکستگیها بیشتر در قدم فک پایین (۷/۱ درصد).

ناحیه میانی زند زبرین و زند زبرین و بند انگشتان (۴/۸ درصد) مشاهده شد.

همچنین تمامی موارد آترزی کولون در گوساله های نر مشاهده شد. فراوانی عوارض در گاوان نایانگر با ۸۹/۴ درصد اختلاف بسیار زیادی با بالغین که ۱۰/۶ درصد موارد را دارا بودند، نشان داد. اکتینومایکوز نیز در جنس ماده شایعتر بود.

نتیجه گیری: این مطالعه قابلیتهای رادیوگرافی را در تشخیص عوارض و بیماریهای مختلف و همچنین فراوانی آنها را بر حسب جنس، نژاد، سن و محل عرضه درونواحی مختلف بدن گاوشنان می دهد. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. (۱۳۸۲).

دوره ۵۹ شماره ۲، ۱۵۳-۱۵۶.

واژه های کلیدی: رادیوگرافی، گاو، بیماریها.

با توجه به اینکه اطلاعات ثبت شده رادیوگرافی همیشه به عنوان سابقه ای با ارزش در مطالعات اپیدمیولوژیک مورد استفاده قرار می گیرند، می توان با استفاده از این یافته ها درباره پیش آگهی یک عرضه بیماری و همچنین بیماران ارجاعی بعدی اظهار نظر نمود و به نتیجه گیری آماری رسید.

با توجه به ارائه خدمات رادیولوژی در بیمارستان تخصصی دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد شهرکرد درخصوص دامهای بزرگ در طی سالهای گذشته، یافته های به دست آمده از بایگانی بخش رادیولوژی می تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار علاقمندان و سایر همکاران و محققین قرار دهد. این بررسی با هدف دستیابی به اطلاعات زیر دنبال شد:

۱- به دست آوردن اطلاعات لازم از موارد ارجاعی و همچنین بیماریهای تشخیص داده شده در بخش رادیولوژی به صورت کامپیوتري تا در اسرع

(۱) گروه آموزشی علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران.

(۲) دانش آموخته دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد شهرکرد، شهرکرد - ایران.

\* نویسنده مسئول soroori@ut.ac.ir



گوارش هر کدام با ۲ مورد (۲/۲ درصد) در رتبه های بعدی قرار داشتند. علاوه بر موارد فوق تشکیل استخوان جدید ("New Bone Formation "NBF") استئوکندراتیس دیسیکنس (OCD). پاسخ پریوست، ریکتر و بزرگ شدنی قلب هر کدام در یک مورد (۱/۱ درصد) مشاهده شدند.

درخصوص ارتباط بین محل عارضه و فراوانی موارد تشخیصی، اطلاعات به دست آمده نشان داد که عوارض مفاصل کارپ جمعاً با ۱۱ مورد (۲۶/۲ درصد)، شامل استئوآرتیت (۸ مورد) و تورم بافتی نرم (۳ مورد) بیشترین فراوانی را دارا بودند. عوارض انگشتان اندامهای قدامی در ۷ مورد (۱۶/۷ درصد) شامل شکستگیهای کامل و تورم بافتی نرم ناحیه هر کدام ۲ مورد. استئومیلیت، تشکیل بافت استخوانی جدید و پاسخ پریوست (هر کدام ۱ مورد) تشخیص داده شدند. عوارض استخوانهای قلم دست (متاکارپ) در

۳ مورد (۷/۲ درصد) شامل شکستگی کامل و شکستگی سالترهای نوچ IV (هر کدام ۱ مورد) و استئومیلیت (۱ مورد) تشخیص داده شد. همچنین شکستگیهای استخوان فک پایین با ۳ مورد (۷/۱ درصد)، شکستگیهای کامل استخوانهای زند زبرین و زند زبرین و ران هر کدام با ۲ مورد (۴/۸ درصد) و استئوآرتیت مفاصل رانی، کشکنی، درشت نئی و خرگوشی هر کدام با ۲ مورد (۴/۸ درصد) از حیث فراوانی در رتبه های بعدی قرار داشتند و نیز در ۲ مورد (۴/۸ درصد) وجود اجسام خارجی در داخل شکمبه تشخیص داده شد.

شکستگیهای غالب از نوع کامل، ساده و عرضی بوده (۱۹ درصد) و شکستگی از نوع خردشگی (Comminuted) (۱۱/۹ درصد) در مرتبه بعد قرار داشتند. یک مورد شکستگی سالترهای نوچ IV نیز در قسمت دیستال متاکارپ مشاهده شد. از نظر محل عوارض اسکلتی (اعم از استخوان و مفصل)، مفصل کارپ با فراوانی ۲۶/۲ درصد بیندهای انگشتان اندام حرکتی قدامی با فراوانی ۱۶/۷ درصد، بیشترین درگیری را داشته اند.

فراوانی عوارض تشخیص داده شده به تفکیک سن، جنس و نژاد در جداول ۱، ۲ و ۳ آورده شده است.

## بحث

نتایج حاصل از بررسی موارد تشخیصی بر حسب سن (جدول ۱) حاکی از آن است که تمامی عوارض به جز اکتینومایکوز در نابالغین شایعتر است و در مورد آنرزی کولون به علت مادرزادی بودن بیماری همین نتیجه مورد انتظار است (۴۶). همچنین اکثر موارد استئوآرتیت که غالباً به علت عفونت ناف وقوع می یابد، در گوساله ها شایعتر است (۵).

فراوانی بالای عوارض استخوانی از قبیل شکستگیهای و تشکیل استخوانهای جدید در نابالغین، احتمالاً ناشی از تحرک و جست و خیز بیشتر گوساله ها می باشد. عارضه استئوکندراتیس دیسیکنس نیز مختص نابالغین می باشد و در سنین رشد و در گوساله های با رشد سریع دیده می شود (۳، ۱۲). استئومیلیت نیز به دلیل نقصان انتقال ایمنی پاسیو در نابالغین محتملتر است (۵). با توجه به این که تهیه رادیوگراف از اندامهای داخلی

کلیه رادیوگرافها از خرداد سال ۱۳۷۷ تا مرداد سال ۱۳۸۱، توسط دستگاه رادیولوژی SHIMADZU که ماکزیمم ولتاژ ایجاد شده در دو سروله مولد آن ۱۲۵ کیلوولت و ماکزیمم شدت جریان ایجاد شده در لوله مولد ۶۰ میلی آمپری باشد، تهیه و مورد ارزیابی قرار گرفتند.

دربررسی انجام شده شاخصهای زیر مورد مطالعه قرار گرفتند:  
۱ - محل عارضه (مرکزیت تابش اشعه)، محل عارضه با بررسی مستقیم رادیوگراف ها و مطابقت آن با تشخیص بخش رادیولوژی تعیین گردید و در موارد نرمال و غیرقابل تشخیص با عنوان مرکزیت تابش اشعه گزارش گردید.

۲ - حالت گماری: در اغلب موارد حالت گماری رادیوگرافی در فرم درخواست، ثبت شده بود ولی در موارد لزوم حالت گماری از روی رادیوگراف ها تعیین شد.

۳ - نژاد: در این خصوص نژادهای دورگ (هلشتاین × بومی)، هلشتاین، بومی و در چند مورد نامشخص ثبت گردید.

۴ - سن: به علت عدم اطلاع صاحب دام در اغلب پرونده ها سن دقیق ثبت نشده بود. در چنین مواردی از روی نشانه های رادیوگرافی تعیین بالغ و نابالغ انجام گردید. معیار بلوغ جسمی در گاو ۳/۵ سالگی در نظر گرفته شد (۲).

۵ - جنس: ضمن ثبت جنس دام از روی پرونده در مواردی که جنس دام ذکر نشده بود، جنس نامشخص گزارش شد.

۶ - تشخیص رادیوگرافی: اغلب پرونده ها واحد فرم درخواست رادیوگرافی بودند که در این فرمها تشخیص رادیوگرافی نیز ثبت شده بود ولی در صورت لزوم با بررسی مجدد و دقیق تک تک رادیوگرافیها، تشخیص لازم داده شد.

در نهایت جداول فراوانی بیماریها و عوارض مختلف در رابطه با نژاد، سن و جنس طراحی و تکمیل گردید.

## نتایج

جمعاً تعداد ۷۴ رأس گاو در سالهای فوق الذکر دارای پرونده رادیوگرافی بودند که ۱۷۱ عدد رادیوگراف مربوطه موربد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. از مجموع ۱۷۱ رادیوگراف بررسی شده، در ۲۳ مورد تشخیص رادیوگرافی عدم وجود نشانه غیرطبیعی رادیوگرافی ("NSAD") (No Significant Abnormality Detected "NSAD") بود که این بدان معناست که نشانه رادیوگرافی غیر طبیعی مشاهده نشده است و در یک مورد رادیوگراف های تهیه شده قادر معیارهای تشخیصی کافی از لحاظ شرایط اشعه به کار گرفته شده بود.

باتوجه به اطلاعات جمع آوری شده شکستگیها با تعداد ۱۵ مورد (۱۶/۷ درصد) و آنرزی کولون با تعداد ۱۲ مورد (۱۳/۳ درصد) فراوانترین عوارض تشخیص داده شده بودند و به دنبال آنها استئوآرتیت و تورم بافتی های نرم مفصلی هر کدام با تعداد ۹ مورد (۱۰ درصد) قرار داشتند. استئومیلیت با ۵ مورد (۵/۵ درصد)، اکتینومایکوز با ۴ مورد (۴/۴ درصد)، الگوی آلوئولی دال بر پنومونی، الگوی هیپروواسکولاریزاپسیون ریوی و اجسام خارجی داخل دستگاه



جدول ۱ - فراوانی عوارض تشخیصی بر حسب سن.

ردیف	تعداد	آنژری کولون	بزرگ شدگی قلب	الگوی آلوئولی	الگوی هیپر	واسکولا ریز اسیون	بزرگ	سله فاز	اکتینومایکوز	توم بافت نرم	استئوآرتیت	استئومیلت	NBF	پستخ پر پیوست	OCD	شکستگی قدم و	عوارض تشنیجی
۸۹/۴	۵۹	۱۲	۱	۲	۲		۱	۲	۲	۶	۸	۴	۱	۱	۱	۱	۱۵
-	-	۲۰/۳	۱/۷	۳/۴	۳/۴	۱/۷	۳/۴	۳/۴	۱۰/۲	۱۳/۵	۶/۸	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۱/۷	۲۵/۴	
۱۰/۶	۷	-	-	-	-		-	-	۲	۳	۱	۱	-	-	-	-	
۱۰۰	-	-	-	-	-		-	-	۲۸/۶	۴۲/۹	۱۴/۳	۱۴/۳	-	-	-	-	

OCD = Osteo Chondritis Dissecans, NBF = New Bone Formation

جدول ۲ - فراوانی عوارض تشخیصی بر حسب جنس.

ردیف	تعداد	آنژری کولون	بزرگ شدگی قلب	الگوی آلوئولی	الگوی هیپر	واسکولا ریز اسیون	بزرگ	سله فاز	اکتینومایکوز	توم بافت نرم	استئوآرتیت	استئومیلت	NBF	پستخ پر پیوست	OCD	شکستگی قدم و	عوارض تشنیجی
۴۸/۵	۳۲	۱	۱	۱	۱		-	۲	-	۳	۳	۳	-	-	۱	۱	۴
-	-	۳۷/۵	۲/۱	۳/۱	۳/۱	۳/۱	-	۶/۲	-	۹/۴	۹/۴	۹/۴	-	-	۲/۱	۲/۱	۱۲/۵
۲۲/۳	۲۲	-	-	۱	۱	-	-	۲	۳	۵	۲	۱	۱	-	-	۵	
-	-	-	-	۴/۵	۴/۵	۴/۵	-	-	۱۳/۶	۱۳/۶	۲۲/۷	۹/۱	۴/۵	۴/۵	-	-	۲۲/۷
۱۸/۲	۱۲	-	-	-	-		۱	-	۱	۳	۱	-	-	-	-	-	۶
۱۰۰	-	-	-	-	-		۸/۳	-	۸/۳	۲۵	۸/۳	-	-	-	-	-	۵۰

OCD = Osteo Chondritis Dissecans, NBF = New Bone Formation

جدول ۳ - فراوانی عوارض تشخیصی بر حسب نژاد.

ردیف	تعداد	آنژری کولون	بزرگ شدگی قلب	الگوی آلوئولی	الگوی هیپر	واسکولا ریز اسیون	بزرگ	سله فاز	اکتینومایکوز	توم بافت نرم	استئوآرتیت	استئومیلت	NBF	پستخ پر پیوست	OCD	شکستگی قدم و	عوارض تشنیجی
۷۵/۸	۵۰	۱۲	-	۲	۲		-	۲	۳	۵	۷	۴	۱	۱	۱	۱	۹
۶۱	۴	-	۱	-	-	-	-	-	-	۱	۱	۱	-	-	-	-	هلشتاین
۱۸/۱	۱۲	-	-	-	-	-	۱	-	۱	۳	۱	-	-	-	-	-	نامشخص

OCD = Osteo Chondritis Dissecans, NBF = New Bone Formation

\*) دورگ = بومی × هلشتاین.

عارض تشخیص داده شده در جنس نر بیشتر از جنس ماده بوده (۴۸/۵ درصد در مقابل ۳۳/۳ درصد) ولی با توجه به اینکه در تعدادی از موارد ارجاعی جنس ماده نامشخص می‌باشد (۱۸/۲ درصد)، نمی‌توان تفاوتی بین فراوانی عارض تشخیص داده شده در دو جنس نر و ماده قائل شد. در مورد ارتباط نژاد با عارض تشخیص داده شده، تمام موارد آترزی کولون فقط در نژاد دورگ دیده شده است.

در مطالعه حاضر شکستگی استخوانهای قلم انداههای قدامی و انداههای خلفی بیشترین فراوانی را در بین شکستگیهای استخوانهای بلند دارا بودند که با گزارش Tulleners در سال ۱۹۸۶ همخوانی دارد (۱۱). استخوان ران حدود ۳۰ درصد از تمام شکستگیهای استخوانهای بلند در گاو را تشکیل می‌دهند که با یافته‌های مطالعه حاضر تقریباً مشابه می‌باشد.

گاو تنها در سن پایین که جثه دام کوچک است امکانپذیر می‌باشد، لذا عوارضی چون جسم خارجی در دستگاه گوارش، الگوی هیپر و کولا ریز اسیون ریوی، الگوی آلوئولی دال بر پنومونی و بزرگ شدگی قلب صرفاً در نابالغین مشاهده شده است. به همین دلیل فراوانی عارض و بیماریهای تشخیص داده شده در گاکلون نیالن (۸۹/۴ درصد) اختلاف بسیار زیادی با بالغین (۱۰/۶ درصد) دارد.

در خصوص ارتباط جنس دامها با موارد تشخیص داده شده، نکته قابل توجه آن است که تمامی ۱۲ مورد آترزی کولون در جنس نر مشاهده شده است ولی از طرف دیگر استئوآرتیت در جنس ماده شایعتر بوده که به نظر می‌رسد ناشی از تعداد بیشتر موارد ارجاعی از جنس ماده به بیمارستان باشد. فراوانی موارد تشخیصی اکتینومایکوز نیز در جنس ماده بیشتر بوده که احتمالاً به دلیل بالا بودن عمر مفید گاوهای ماده است. اگرچه فراوانی



## References

1. Adams, S.B. and Fessler, J.F.(1996): Treatment of fractures of the tibia and radius-ulna by external coaptation. *Vet. Clin North Am. Food Anim. Prac.* 12: 181-198.
2. Farrow, C.S. (1985): The radiographic investigation of bovin lamenesses with infection. *Vet. Clin. North Am. Food Anim. Prac.* 1: 67-81.
3. Kealy, J.K. and McAllister, H.(2000): Diagnostic Radiology and Ultrasonography of the Dog and Cat, 3<sup>rd</sup> ed. W.B. Saunders Company, Philadelphia, USA. PP: 253-262.
4. Leipold, H.W., Saperstein, G. and Huston, K.(1996): Congenital defects and hereditary disorders in cattle.In Large Animal Internal Medicine, 2<sup>nd</sup> ed. by B. P. Smith. Mosby.St. Louis. USA. PP: 1719-1770.
5. Madigan, J.E. and House, J.K. (1996): Lameness and Reluctance to Walk.In Large Animal Internal Medicine, 2<sup>nd</sup> ed. by B. P. Smith. Mosby. St. Louis. USA. PP: 417-421.
6. Radostits, O.M., Gay, C.C., Blood, D.C. and Hinchcliff, K.W. (2000): Veterinary Medicine. 9<sup>th</sup> ed. W. B. Saunders Company, London. UK. PP: 394-395,552,564,935.
7. Rakestraw, P.C. (1996): Fractures of the humerus. *Vet. Clin. North Am. Food Anim. Prac.* 12: 153-168.
8. Singh A.P. (1994): Veterinary Radiology. Satish Kumar Jain. Delhi. India. PP:136.
9. Thrall, D.E. (1998):Text Book of Veterinary Diagnostic Radiology. 3<sup>rd</sup> ed. W. B. Saunders Company, Philadelphia. USA. PP: 37-44.
10. Trostle, S.S. and Markel M.D.(1996): Fractures of the femur. *Vet. Clin. North Am. Food Anim. Prac.* 12: 169-180.
11. Tulleners, E.P. (1986): Management of bovine orthopedic problems, Part I: Fractures. *Compend. Contin. Educ. Pract. Vet.* 8: S69.
12. Tulleners, E.P. (1986): Metatarsal and Metacarpal fractures in dairy cattle: 33 cases (1979-1985). *J. Am. Vet. Med. Assoc.* 189: 463-468.
13. Uri Bargai, A.B., Pharr, J.W. and Morgan J.P. (1989): Bovin Radiology. Iowa State University Press, Ames, USA. PP: 51-182.

(۱۰). در این مطالعه تنها یک مورد شکستگی استخوان بازو مشاهده شد که با گزارش Rakestraw در سال ۱۹۹۶ که شکستگیهای استخوان بازو در نشخوارکنندگان را غیرشایع می داند. مطابقت دارد (۷).

همچنین در این مطالعه موردي از شکستگی استخوان درشت نئی دیده نشد که با یافته های Adams و Fessler در سال ۱۹۹۶ که شکستگی استخوان درشت نئی را به فراوانی سایر شکستگیهای استخوانهای بلند نمی داند، همخوانی دارد (۱). در همین رابطه Tulleners در سال ۱۹۸۶ گزارش نموده است که شکستگیهای استخوانهای زند زبرین و زند زبرین ۸/۳ درصد و شکستگیهای استخوان درشت نئی ۱۳/۳ درصد تمام شکستگی ها را در گاو تشکیل می دهند (۱۲).

نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که در تشخیص بسیاری از عوارض و بیماریها در گاو، در صورت وجود دستگاه رادیولوژی با قابلیت های مناسب، می توان از رادیوگرافی به عنوان یک روش کمک تشخیصی و در بعضی موارد تأیید کننده تشخیص استفاده نمود. به طوری که می توان عنوان نمود در بررسی عوارض مختلف استخوانی و بیماریهای مختلف مفصلی و همچنین ارزیابی ساختاری ارگانها و نواحی مختلف قفسه سینه، اطلاعات با ارزش رادیوگرافی به مراتب از سایر روشهای تشخیصی پاراکلینیکی ارزش تشخیصی بیشتری دارد.

