

## آثار محیط‌های کشت حاصل از پوست درخت، ضایعات چای، پوست برج و آزولا به عنوان جایگزین پیت در رشد و نمو گل جعفری پاکوتاه (*Tagetes patula "Golden Boy"*)

احمد خلیقی و محمد نقی پاداشت دهکائی

به ترتیب دانشیار گروه باگبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و دانشجوی سابق کارشناس ارشد دانشکده کشاورزی  
گروج و عضو هیئت علمی ایستگاه تحقیقات گل و گیاهان زینتی لاهیجان

تاریخ پذیرش مقاله ۷۹/۱/۳۱

### خلاصه

تحقیق کاربرد ضایعات آلی (پوست درخت، ضایعات چای و پوست برج) و سرخس آبزی آزولا می‌باشد در استان گیلان به عنوان جایگزینی مناسب پیت برای پرورش گل و گیاهان زینتی و محصولات گلخانه‌ای از پاییز سال ۱۳۷۵ در گروه باگبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران به اجرا درآمد. ابتدا پوست درخت، ضایعات چای و پوست برج به نسبتی انجام شد و پس از پنج ماه خصوصیات فیزیکی شامل وزن مخصوص ظاهری، وزن مخصوص حقیقی، درصد خال و فرج، درصد حجمی آب و هوا، درصد ذرات جامد، طرفیت نگهداری آب و درصد مواد آلی و خصوصیات شیمیایی شامل pH، EC درصد کربن، درصد نیتروژن، فسفر، پتاسیم، طرفیت تبادل کاتیونی و نسبت C/N اندازه گیری شدند. کشت گل جعفری پاکوتاه در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی با چهار تکرار و دوازده تیمار به ازای هر تکرار نشش گیاه اجرا گردید. (بعضی از ترکیبات حذف شدن) تیمار شاهد حاوی ۵۰٪ پیت و ۵۰٪ پرلیت بود. شاخص‌های رشد شامل وزن تر و خشک ریشه، وزن تر و خشک اندام هوایی، ارتفاع گیاه، تعداد شاخه‌های جانبی و تعداد گلهای باز شده مورد ارزیابی قرار گرفتند. بیشترین میزان رشد در محیط کشت ۱۰۰٪ آزولا و محیط کشت ۲۵٪ پوست درخت و ۷۵٪ آزولا مشاهده گردید با توجه به نتایج بدست آمده و با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی می‌توان گفت که کمپوست پوست درخت و کمپوست ضایعات چای محیط‌های کشت خوبی برای گیاهان زینتی هستند و جایگزینی مناسب برای پیت می‌باشد. در پوست درخت کمپوست شده با ۵۰٪ آزولا کاهش قابل توجهی در نسبت C/N مشاهده گردید و کمپوست حاصله از نظر C/N در حد استاندارد با ۷۵٪ آزولا کاهش قابل توجهی در نسبت C/N مشاهده گردید و کمپوست حاصله از نظر C/N در حد استاندارد کاهش دهد در قرار داشت در حالیکه ۲۵٪ آزولا نتوانست میزان C/N پوست درخت را به میزان استاندارد کاهش دهد در شرایط فعلی بعلت هزینه کارگری جهت جمع آوری آزولا، کمپوست این گیاه نمی‌تواند بعنوان یک بستر کشت تجاری توصیه شود.

واژه‌های کلیدی: آزولا، گل جعفری، کمپوست، پوست درخت، ضایعات چای

### مقدمه

صورت کمپوست شده به کاربرده می‌شوند و حاوی مواد مضر برای گیاهان نیستند و خصوصیات فیزیکی و اغلب خصوصیات شیمیایی مطلوبی دارند. این کمپوست‌ها محیط‌های کشت بدون خاک هستند مدتی است که از ضایعات آلی حاصل از بخش کشاورزی و جنگل در پرورش گل و گیاهان زینتی استفاده می‌شود این مواد به

## مواد و روشها

### الف - تهیه محیط های کشت :

پوست برنج ، ضایعات چای و پوست درخت به تنها بی و یا با آزو لا ترکیب شدن دو سپس بمدت پنج ماه عملیات کمپوست کردن انجام شد.

نسبت های مختلف به قرار ذیل تعین گردیدند:

۱- پوست برنج ۱۰۰٪	- ضایعات چای ۲۵٪ + آزو لا ۷۵٪
۲- پوست برنج ۷۵٪ + آزو لا ۲۵٪	- پوست درخت ۱۰۰٪
۳- پوست برنج ۵۰٪ + آزو لا ۵۰٪	- پوست درخت ۷۵٪ + آزو لا ۲۵٪
۴- پوست برنج ۲۵٪ + آزو لا ۷۵٪	- پوست درخت ۵۰٪ + آزو لا ۵۰٪
۵- ضایعات چای ۱۰۰٪	- پوست درخت ۲۵٪ + آزو لا ۷۵٪
۶- ضایعات چای ۷۵٪ + آزو لا ۲۵٪	- پوست درخت ۱۰۰٪ - آزو لا ۱۳٪
۷- ضایعات چای ۵۰٪ + آزو لا ۵۰٪	

پوست درخت بکار رفته در این تحقیق حاوی ۳۰٪ پوست صنوبر، ۳۰٪ پوست توسکا، ۲۰٪ پوست مرز، ۱۰٪ پوست راش، ۵٪ پوست بلوط ، ۲٪ پوست انگلی و ۳٪ پوست سایر درختان بوده است. پس از کمپوست شدن علاوه بر ۱۳ ترکیب فوق خصوصیات فیزیکی و شیمیائی ترکیب شاهد (۰٪ پیت + ۵۰٪ پرلیت) نیز اندازه گیری شد. در مرحله کشت گل جعفری ترکیب شماره ۱ (۱۰۰٪ پوست برنج) و ترکیب شماره ۲ (پوست برنج ۷۵٪ + آزو لا ۲۵٪) به علت خصوصیات فیزیکی نامطلوب حذف شدند و کلاً ۱۲ ترکیب تحت کشت گل جعفری پاکوتاه قرار گرفت.

### ب- اندازه گیری خصوصیات فیزیکی و شیمیائی

خصوصیات فیزیکی بر اساس روش ارائه داده شده توسط وردونک و گابریل (۱۲) و چن و همکاران (۳) اندازه گیری شدند که شامل وزن مخصوص ظاهری، وزن مخصوص حقیقی، درصد خلل و فرج کل، درصد حجمی آب، درصد حجمی هوا، درصد ذرات جامد، ظرفیت نگهداری آب و درصد مواد آلی بوده و از هر ترکیب چهار نمونه برداشت گردید و میانگین حاصل از این اندازه گیری ها در جدول ۱ آمده است.

pH و EC از عصاره آبی به نسبت ۱:۱۰ (یک قسمت محیط کشت با ۱۰ قسمت آب مقطر به صورت وزن به وزن) اندازه گیری گردید. درصد نیتروژن کل به روش کجلدا و درصد کربن آلی به روش والکلی - بلاک و ظرفیت تبادل کاتیونی به روش هارادا و اینوکو و درصد فسفر و پتاسیم به روش سوراندن خشک که فسفر با

و صرفاً از مواد آلی تشکیل شده اند.

رشد و نمو مطلوب گیاهان و قابلیت دسترسی مدام از نظر اقتصادی نخستین معیار برای یک محیط کشت تجاری می باشد به علاوه نگهداری آب بازه کشی خوب و تدارک مکانی مناسب برای استقرار ریشه ها و عاری بودن از مواد سمی و آفات و بیماری ها نیز باید مطلوب باشد (۵).

پیت یکی از معمولی ترین محیط های کشت برای پرورش گل و گیاهان زینتی است که ظرفیت نگهداری آب بالا و ظرفیت تبادل کاتیونی (CEC) خوبی دارد (۷) ولی افزایش تقاضا، کمیابی و گرانی پیت، محققین را بر آن داشته است که جایگزین هایی با کیفیت بالا و قیمت پائین برای این محیط کشت پیدا کنند (۶ و ۴ و ۳).

در شرایط عادی و متعارف در کارخانه چوکاتالش سالانه ۲۱۲۸۰۰ متر مکعب<sup>۱</sup> پوست درخت و ۶۸-۸۲ هزار متر مکعب<sup>۲</sup> ضایعات چای در کارخانه های تولید چای شمال کشور و حجم زیادی پوست برنج در کارخانه های برنج کوبی تولید می شود و به مقدار زیادی آزو لا که یک سرخس آبزی است در آبگیر های استان گیلان به ویژه تالاب انزلی وجود دارد و اکنون بصورت یک مشکل بروز کرده است. این ضایعات به صورت کمپوست شده می تواند محیط های کشت مناسبی برای گیاهان زینتی باشد و این تحقیق نیز برای ارزیابی ترکیبات مختلف حاصل از این مواد به اجرا در آمده است.

چن و همکاران (۳) کود حیوانی تفکیک شده (کود حیوانی خالص) و تفاله انگور کمپوست شده را جایگزینی با کیفیت بالا برای پیت و گیاهان زینتی معرفی کردند.

بورگر (۲) نشان داد که ضایعات سبز کمپوست شده حاصل از مواد گیاهی را می توان به عنوان محیط های کشت بدون خاک و یا برای اصلاح و بالا بردن ظرفیت نگهداری آب خاک در باگها به کار برد. وردونک و همکاران (۱۲) کمپوست های حاصل از ضایعات تباکو (منبع ازت دار) و پوست درخت را برای کشت دو گیاه فیکوس برگ پهن و برگ انجیری مورد استفاده قرار دادند، کمپوست حاصل از ۱۰٪ ضایعات تباکو و ۹۰٪ پوست درخت روی ارتفاع این گیاهان و تعداد برگ آنها اثر بسیار مطلوبی داشت و این ترکیب را به عنوان ترکیب مناسب برای گیاهان زینتی معرفی کردند (۱۲).

۱. این مقدار بر اساس وزن مخصوص ظاهری  $168\text{Kg/m}^3$  به صورت خشک محاسبه شده است و در حال حاضر به علت کاهش مصرف چوب در کارخانه این میزان کاهش یافته است.

۲. این مقدار بر اساس وزن مخصوص ظاهری  $73\text{Kg/m}^3$  به صورت خشک محاسبه شده است و این میزان در سالهای مختلف بر اساس مقدار تولید برگ سبز چای و کیفیت تولید چای سیاه نوسان دارد.

جدول ۱ - خصوصيات فزيكی محيطهای کشت

شماره درب	محيطهای کشت	وزن مخصوص	وزن مخصوص	درصد خل	درصد حجمی	درصد حجمی	درصد ذات	ظرف تکهداری	درصدمواد
آلتی		مولا	آب(درصد وزنی)	آب	جامد	مولا	آب(درصد وزنی)	آب(درصد وزنی)	آلتی
۱	پوست برج ۱۰۰٪	۷۷/۰	۹۵/۲۳	۹۵/۲۸	۱۶/۰۷	۷۹/۶۴	۴/۰۲	۲۰۲/۴	۷۷/۱۵
۲	پوست برج ۷۵٪ + آزولا ۵٪	۷۶/۰	۹۵/۱۳	۹۵/۲۹	۱۸/۰۴	۷۶/۸۶	۴/۰۲	۲۲۶/۱	۷۷/۵۰
۳	پوست برج ۵۰٪ + آزولا ۵٪	۷۵/۰	۹۵/۲۲	۹۵/۴۷	۱۹/۰۷	۷۵/۷۸	۴/۰۰	۲۳۸/۷	۷۷/۰۰
۴	پوست برج ۲۵٪ + آزولا ۵٪	۹۳/۰	۹۳/۰۳	۹۳/۷۹	۲۴/۰۱	۹۰/۱۰	۵/۰۰	۲۵۸/۸	۶۲/۰۰
۵	فیمات چای ۱۰۰٪	۹۳/۰	۹۳/۰۷	۹۳/۰۶	۴۷/۰۱	۹۴/۹۴	۶/۰۰	۴۲۲/۴	۹۳/۰۰
۶	فیمات چای ۲۵٪ + آزولا ۵٪	۹۳/۰	۹۳/۰۴	۹۳/۰۷	۴۸/۰۹	۹۳/۰۹	۱/۰۰	۴۱۹/۲	۹۳/۰۰
۷	فیمات چای ۵۰٪ + آزولا ۵٪	۹۳/۰	۹۳/۰۵	۹۳/۰۷	۴۸/۰۸	۹۳/۰۸	۱/۰۰	۴۱۹/۸	۸۶/۷۵
۸	فیمات چای ۵٪ + آزولا ۵٪	۹۳/۰	۹۳/۰۶	۹۳/۰۷	۴۸/۰۷	۹۳/۰۷	۱/۰۰	۴۱۹/۸	۶۷/۰۰
۹	فیمات چای ۱۰٪ + آزولا ۵٪	۹۳/۰	۹۳/۰۰	۹۳/۰۷	۵۰/۱۷	۹۱/۸۳	۷/۰۰	۳۵۷/۸	۶۷/۰۰
۱۰	فیمات چای ۲۵٪ + آزولا ۵٪	۹۳/۰	۹۳/۰۰	۹۳/۰۷	۵۲/۱۹	۹۰/۸۹	۱/۰۰	۳۷۹/۰	۸۹/۷۵
۱۱	فیمات درخت ۵۰٪ + آزولا ۵٪	۹۳/۰	۹۳/۰۰	۹۳/۰۷	۴۷/۰۵	۹۱/۹۰	۱/۰۰	۳۷۵/۰	۸۰/۲۵
۱۲	فیمات درخت ۲۵٪ + آزولا ۵٪	۹۳/۰	۹۳/۰۰	۹۳/۰۷	۴۷/۰۵	۸۹/۱۶	۱/۰۰	۳۷۵/۰	۷۷/۲۵
۱۳	آزولا ۱۰۰٪	۹۳/۰	۹۳/۰۰	۹۳/۰۷	۴۷/۰۱	۹۱/۶۵	۰/۰۰	۲۹۰/۵	۵۰/۷۵
۱۴	پیت ۵۰٪ + پریت ۵۰٪	۹۳/۰	۹۳/۰۰	۹۳/۰۷	۴۶/۲۱	۹۳/۰۰	۱/۰۰	۳۴۱/۹	۴۰/۵۰

\* میانگین حاصل از چهار اندازه گیری

شماره ۳) در یک گروه قرار داشت. بیشترین میزان وزن خشک ریشه به میزان ۷۴٪ گرم در هر گیاه در محیط کشت حاوی ۲۵٪ پوست درخت و ۷۵٪ آزولا (تیمار ۱۰) مشاهده شد که با محیط کشت حاوی ۱۰۰٪ آزولا (تیمار ۱۱) در یک گروه قرار گرفت. کمترین میزان وزن خشک ریشه با ۰٪ ۰ گرم در هر گیاه در محیط کشت حاوی ۷۵٪ پوست درخت و ۲۵٪ آزولا (تیمار ۸) مشاهده شد. بیشترین میزان وزن تر اندام هوایی با ۴۵٪ ۲۱ گرم در هر گیاه در محیط کشت حاوی ۱۰۰٪ آزولا مشاهده گردید که با محیط کشت حاوی ۲۵٪ پوست درخت و ۷۵٪ آزولا در یک گروه قرار داشت. کمترین میزان وزن تر اندام هوایی با ۵۸٪ ۰ گرم در هر گیاه در محیط کشت حاوی ۷۵٪ پوست درخت و ۲۵٪ آزولا مشاهده شد. بالاترین میزان وزن خشک اندام هوایی با ۲۴٪ ۳ گرم در محیط کشت حاوی ۱۰۰٪ آزولا مشاهده گردید که با محیط کشت حاوی ۲۵٪ پوست درخت و ۷۵٪ آزولا در یک گروه قرار داشت. بالاترین ارتفاع گیاه به میزان ۰٪ ۱۷ سانتی متر در هر گیاه مربوط به محیط کشت حاوی ۱۰۰٪ آزولا بود که با تیمار های ۹ و ۱۰ در یک گروه قرار داشت. بیشترین تعداد شاخه جانبی با ۱۱٪ ۶ عدد در هر گیاه مربوط به محیط کشت حاوی ۱۰۰٪ آزولا بود و بیشترین تعداد گل باز شده با ۵٪ ۲ عدد در هر گیاه نیز مربوط به محیط کشت حاوی ۱۰۰٪ آزولا بود که با محیط کشت ۲۵٪ پوست درخت و ۷۵٪ آزولا در یک گروه قرار داشت.

آنچه که در نتایج حائز اهمیت می باشد اینست که کمپوست ۱۰۰٪ پوست درخت و کمپوست ۱۰۰٪ ضایعات چای و ترکیب آن با ۵۰٪ ۷۵٪ آزولا محیط های کشت خوبی بودند و در موارد زیادی از نظر مقایسه میانگین با تیمار شاهد یعنی ۵٪ پیت + ۵٪ پرلیت در یک گروه قرار داشتند (جدول ۳).

### بحث

با مشاهده شاخص های رشد مشاهده می شود که بیشترین میزان رشد را محیط کشت ۱۰۰٪ آزولا و محیط کشت حاوی ۲۵٪ پوست درخت و ۷۵٪ آزولا باعث شده اند اگر چه این دو محیط کشت برتر از شاهد (۵٪ پیت + ۵٪ پرلیت) بودند و بر اساس داده ها و استاندارد های موجود محیط کشت مطلوبی هستند ولی در حال حاضر نمی توان از آنها به عنوان محیط های کشت

معرف نیترو وانادو مولیبدو فسفویریک و توسط دستگاه اسپکترو فوتومتری و پناسیم توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شدند. هر کدام از این خصوصیات در چهار نمونه اندازه گیری شد و میانگین حاصل از این چهار اندازه گیری در جدول ۲ آمده است.

### ج-کشت گل جعفری

در این آزمایش از گل جعفری پاکوتاه با نام علمی *Tagetes patula* رقم Golden Boy استفاده گردید. این آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۱۲ تیمار و ۴ تکرار اجرا گردید. هر تیمار در هر تکرار شامل ۶ گلدان ۱۰ سانتیمتری بود که در هر گلدان یک گیاه گل جعفری پرورش داده شد و بنابراین ۲۸۸ گیاه تحت بررسی قرار گرفت. ۱۱ تیمار از محیط های کشت حاصل از مواد آلی داخل کشور بودند و تیمار ۱۲ حاوی پیت و پرلیت به نسبت ۱:۱ بود که به عنوان تیمار شاهد در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت.

ابتدا همه محیط های کشت از الک ۹ میلی متری عبور داده شدند و سپس پاستوریزه شده و تمام گلدان ها نیز توسط هیپو کلرید سدیم ۲٪ ضد عفونی شدند.

عملیات کشت گل جعفری در تاریخ ۱۳۷۶/۵/۵ انجام شد و در هر گلدان ۳ عدد بلند کشت گردید که پس از مرحله دو برگی فقط یک گیاه در هر گلدان نگهداری و بقیه حذف گردید. آیاری گلدانها به طور یکنواخت انجام شد و هفته ای یک بار (به ازای هر گلدان ۲۰۰CC) توسط محلول غذائی هوگلن تغذیه شدند. در تاریخ ۱۳۷۶/۷/۲۰ شاخص های رشد شامل ارتفاع گیاه، تعداد شاخه های فرعی، تعداد گلهای باز شده، وزن تر و خشک ریشه و وزن تروخشک اندام هوایی اندازه گیری شدند. میانگین های حاصل از محاسبات آماری توسط آزمون چند دامنه ای دانکن مقایسه گردید (جدول ۳).

### نتایج

نتایج تجزیه واریانس نشان میدهد که تمامی تیمار ها (محیط های کشت) روی شاخص های رشد در سطح ۱٪ اختلاف معنی داری داشته اند. بیشترین میزان وزن تر ریشه به میزان ۰٪ ۸ گرم در هر گیاه در محیط کشت حاوی ۱۰۰٪ کمپوست آزولا (تیمار ۱۱) مشاهده گردید که با تیمار های ۳، ۵، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ (جدول

جدول ۲ - نحوه صیانت پیشنهادی مسکن‌های کشت

جدول ۳ - مقایسه میانگین شاخص‌های رشد در گل جعفری پاکوته (Tagetes patula)

	تعداد گل بازشده	تعداد شاخه جانبی	ارتفاع گیاه	وزن خشک اندام هوایی	وزن ترازدام هوایی	وزن خشک ریشه	وزن گیاه / گرم	گیاه / گرم	وزن خشک ریشه	وزن گیاه / گرم	میزان تبادار محیط‌های کشت
۰/۱۲۵ de	۱۱/۲۵ e	۱۱/۲۸ ef	۰/۷۹ d	۴/۲۸ e	۴/۲۵ e	۱/۸۰*	cd	۱/۸۰*	efg	۱/۸۰*	پوست برج ۵۵٪+ آزولا ۵٪
۰/۴۰ e	۱/۸۰ e	۱۰/۷۴ f	۰/۴۷ d	۱/۷۴ f	۰/۸۸	d	۱/۶۱	d	fg	۱/۸۰*	پوست برج ۵٪+ آزولا ۵٪
۰/۹۴ cde	۱/۱۱ d	۱۱/۴۰ ef	۱/۲۸ c	۱/۲۰ cd	۰/۲۰	def	۱/۱۸	abc	۱/۱۸	خایات چای ۱۰٪	
۰/۸۴ cde	۱/۲۰ e	۱۱/۰۷ ef	۰/۸۰ d	۱/۸۷ e	۰/۲۳	cdef	۱/۲۰	bcd	۱/۲۵	خایات چای ۷۵٪+ آزولا ۲۵٪	
۱/۱۰ bcd	۱/۰۵ cd	۱۲/۴۸ de	۱/۹۶ b	۱۳/۲۲ b	۰/۴۵	cd	۰/۱۵	ab	۱/۰۵	خایات چای ۵٪+ آزولا ۵٪	
۱/۸۰ b	۱/۰۷ c	۱۲/۸۰ bcd	۱/۷۸ bc	۱۲/۱۲ bc	۰/۲۹	cde	۱/۶۴	abc	۱/۷۵	خایات چای ۲۵٪+ آزولا ۷۵٪	
۱/۱۷ bc	۱/۸۰ cd	۱۳/۴۵ cd	۱/۲۹ c	۱/۱۲ d	۰/۵۱	bc	۰/۰۰	ab	۱/۱۰	پوست درخت ۲۵٪	
۰/۰۵ f	۰/۱۵ f	۱/۲۰ g	۰/۱۰ e	۰/۰۸ g	۰/۰۱	g	۰/۰۰	e	۰/۰۰	پوست درخت ۷۵٪+ آزولا ۲۵٪	
۱/۸۲ b	۱/۰۰ c	۱۵/۰۵ ab	۱/۷۸ bc	۱۰/۸۱ bcd	۰/۵۱	bc	۰/۰۵	ab	۰/۰۵	پوست درخت ۵٪+ آزولا ۵٪	
۳/۰۰ a	۱۰/۰۰ b	۱۵/۲۸ abc	۱/۷۸ a	۱/۰۱ a	۰/۷۴	a	۰/۰۴	a	۰/۰۴	پوست درخت ۲۵٪+ آزولا ۷۵٪	
۱/۰۱ a	۱۱/۴۰ a	۱۷/۰۱ a	۲/۲۴ a	۲/۱۴ a	۰/۷۰	ab	۰/۰۸	a	۰/۰۸	آزولا ۱۰٪	
۱/۸۰ b	۱/۰۰ c	۱۴/۰۲ bcd	۱/۶۵ bc	۱/۱۲ cd	۰/۷۷	cd	۰/۸۴	abc	۰/۸۴	پیت ۵٪+ پرلت ۵٪	

\* میانگین حاصل از چهار اندازه گیری

به ویژه پرلیت استفاده گردد و همچنانکه در مقدمه آمده است پوست درخت و ضایعات چای به میزان زیادی در کارخانه چوکا و کارخانه‌های تولید چای به عنوان ضایعات تولید می‌شوند. این نتایج و توصیه‌ها با گزارش و توصیه‌های بسیاری از محققان جهان همچون وانگ (۱۱)، اسمیت و تریستر (۱۰)، اونلی و همکاران (۱۱)، هیگاکی و ایسامورا (۵)، وردونک و همکاران (۱۲) وردونک و پنینک (۱۴) که بویژه روی کمپوست پوست درخت و کمپوست‌های دیگر روی رشد گیاهان زیستی مختلف آزمایش کردن مطابقت دارد و اکنون پوست درختان سوزنی برگ و تا حدی پهن برگ بصورت تجاری تولید و مورد استفاده قرار می‌گیرد و در کشور ما نیز با توجه به حجم عظیم پوست درخت پهن برگان می‌توان محیط‌های کشت مناسبی با استانداردهای بین‌المللی تولید و به تولید کنندگان گل و گیاهان زیستی و سبزی‌های گلخانه‌ای عرضه نمود. پوست برنج نیز برای بهبود ویژگی‌های فیزیکی محیط‌های کشت بسیار مناسب می‌باشد.

### سپاسگزاری

این مقاله حاصل از یکی از زیر طرح‌های طرح به زراعی و به نژادی مهمترین گیاهان باغی ایران (طرح مستمر گروه باغبانی) است که با کمک مالی و مساعدت حوزه معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تهران به انجام رسیده است که بدین طریق تشکر و قدردانی می‌گردد.

### REFERENCES

- 1.Bilderback, T.E.,W.C.Fontno, and D.R.Johnson. 1982. Physical properties of media composted of peanut hulls, pine bark, and peatmoss and their effects on Azalea growth. *J. Amer. soc. Hort. sci.* 107(3):522-525.
- 2.Burger, D. W. 1997. Composted green waste as a container medium amendment for the production of ornamental plants. *HortScience*, 32(1):57-60
- 3.Chen, Y.,Y.Inbar, and Y. Hadar. 1988. Composted agricultural wastes as potting media for ornamental plants. *Soil science* 145 (4):298-303.
- 4.Cull, D.C.1981.Alternatives to peat as container:organic resources in UK.*Acta Horticulturae* 126:69-81.
- 5.Higaki, T., and J.S.Imamura.1985.Performance of wood products as media for culture of Anthuriums. College of Hawaii.*Research series* o40.
- 6.Lohr,V.I.,R.G.O Brien, and D.L.Coffey.1984. Spent mushroom compost in soilless media and its effects

تجارتی یاد کرد. زیرا جمع آوری و تأمین آزو لا از سطح آبگیرها مشکل و هزینه کارگری بالا را می‌طلبد و همچنین میزان ماده خشک آزو لا پایین و درحدود ۵٪ است.

در پوست درخت کمپوست شده با ۵۰٪ و ۷۵٪ آزو لا کاهش قابل توجهی در نسبت C/N مشاهده گردید و کمپوست حاصله از نظر C/N در حد استاندارد ( $35 < C/N < 40$ ) قرار گرفت در حالیکه ۲۵٪ آزو لا نتوانست میزان C/N پوست درخت را به میزان استاندارد کاهش دهد و این عامل اثر بسیار نامطلوبی در رشد گل جعفری داشت (تیمار ۸)، این نتایج با گزارش وردونک و همکاران (۱۲) و وردونک و پنینک (۱۴) و مانینگ و تری پی (۸) که به ترتیب اثر ضایعات تباکو روی پوست درخت و باقیمانده سویا روی پوست درخت و باقیمانده حاصل از بذور شبدر الک شده را روی باقیمانده چمن بذر گیری شده جهت کمپوست کردن و سپس بر روی شاخص رشد گیاه کشت شده ارزیابی کردند مطابقت دارد.

با توجه به نتایج به دست آمده و با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی می‌توان گفت که کمپوست پوست درخت و کمپوست ضایعات چای محیط‌های کشت خوبی برای گیاهان زیستی هستند به ویژه کمپوست پوست درخت که می‌توان آن را به صورت خالص برای پرورش و ازدیاد گیاهان زیستی استفاده نمود ولی کمپوست ضایعات چای به علت EC تقریباً بالا (محیط‌های کشت با EC بالاتر از  $2 \text{ dS/m}$  استاندارد نیستند) و به علت خاصیت لجنی شدن پس از جذب آب، بهتر است به صورت ترکیب با محیط‌های کشت دیگر

- on the yield and quality of transplants. *J.Amer.soc.Hort.sci.* 109(5):639-697.
7. Macdonald, B. 1990. Practical woody plant propagation for nursery growers. B.T.Batsford Ltd. London.
8. Manning, L.K., and R.R. Tripepi. 1995. Suitability of composted bluegrass residues as an amendment in container media. *HortScience* 30(2):277-280
9. Ownley, B. H., D. M. Benson, and T. E. Bilderback. 1990. Physical properties of container media and relation to severity of phytophthora root rot of Rhododendron. *J.Amer. soc. Hort. Sci.* 115(4):564-570.
10. Smith, E. M., and S. A. Treaster. 1992. Composted municipal sludge from two Ohio cities for container - grown woody ornamentals. *Horticultural Abs.* 62(2):173.
11. Wang, Y. T. 1992. Evaluation of media consisting of a cotton waste for the production of tropical foliage species. *Horticultural Abs.* 62(2):277.
12. Verdonck, M. De Boodt, P. Stradiot, and R. penninck. 1985. The use of tree bark and tobacco waste in agriculture and horticulture. *Composting of Agricultural and other wastes.* 203-215.
13. Verdonck, O., and R. Gabriels. 1992. I. Reference method for the determination of physical properties of plant substrates. II Reference method for the determination of chemical properties of plant substrates. *Acta Horticulturae.* 302:169-179.
14. Verdonck, O., and R. penninck. 1985. The composting of bark with soy scrap sludge. *Acta Horticulturae* . 172:183-189.

**Effect of Media Produced by Tree Bark, Tea Waste, Rice Hull  
and Azolla as a Substitute for Peat, on Growth and  
Flowering of Marigold (*Tagetes patula* "Golden Boy")**

**A. KHALIGHI, AND M. N. PADASHT-DEHKAE**

**Associate Professor and Former Graduate Student of Horticulture Faculty of  
Agriculture University of Tehran and Member of Scientific  
Board in Ornamental Plant Research Station of Lahijan, Iran.**

**Accepted April, 19, 2000**

**SUMMARY**

In order to study the organic wastes (tree bark, tea waste and rice hull) and a water fern "azolla" naturally grown in Gilan province, experiments were conducted in a randomized block with 4 replications and 12 treatments of different mixture for media using 6 plants of dwarf marigold cultivar " Golden Boy" as the experimenal unites. The mixture were planted to be used as a substitute for peat in ornamental planting and for other greenhouse culturing purposes. In the Department of Horticulture, College of Agriculture Tehran university and in autumn 1996. Tree bark , tea waste and rice hull were mixed with 0,25,75 and 100% azolla(by volum) and then were composted in 1 cubic meter woody containers. After five month of composting, physical Properties as bulk and particle density, water and air volume percentage, water holding capacity, porosity, soilds and organic matter percentage, pH, carbon, nitrogen, phosphorus, potassium, and chemical properties such as EC, cation exchange capacity and C/N ratio were measured. Control was a mixture of 50% peat and 50% perlite. Fresh and dry root and top weight of plants, plant height, number of lateral shoots and number of opened flowers were all evaluated as the growth indices. The highest rate of growth was noted in plants grown in medium of 100% azolla and medium of 25% tree bark+ 75% azolla . Results indicated that under the present economical conditions tree bark and tea wastes composts were good substitute for peat in culturing of ornamental plants. Composted tree bark with %50 and %75 of azolla showed a notable reduction of C/N ratio and the compost produced was ranged "Standard" from the standpoint of C/N (C/N<35), while C/N ratio of tree bark could not be decreased down to standard level by 25% azolla.

**Key Words:**Tree bark, Tea wastes, Azolla, Marigold, Compost