

نشریه دانشکده علوم جلد چهارم شماره دوم - تیر ماه ۱۳۵۱

## مطالعه مخروطیان ایران

دکتر احمد قهرمان

گروه زیست‌شناسی

دانشکده علوم - دانشگاه تهران

### خلاصه<sup>۱</sup>:

در تاکزینومی جدید، بازدانگان از نظر پیدایش، فیلوزنی، تکامل و اختصارات مرفولژیکی بسه گروه مستقل تقسیم می‌شوند:

گروه اول بازدانگان ابتدائی هستند، که در حقیقت فسیل زنده بوده، در فلور کنونی جهان نمایندگان معده‌داری، با انتشار اندمیک داشته و در طول وعرض جغرافیائی خاصی محصور مانده‌اند. از این بازدانگان پایه‌های مختلف جهان منجمله با ایران نیز آورده شده که امروز بعنوان زینت در برخی از یارکهای ایران دیده می‌شود مانند ژنکیوبی لوبیا و سیکاسها.

گروه دوم بازدانگان حقیقی بنام مخروطیان یا سوزنی برگان هستند که در پهنه رویشی فعلی جهان مقام خاص داشته، در صنعت، اقتصاد و پوشش جنگلها و ارتفاعات مناطق سرد اهمیت مخصوصی دارند. در این مقاله این گروه از بازدانگان در ایران مورد بحث قرار گرفته است.

گروه سوم بازدانگانی حد واسطه نهان‌دانگان و مخروطیان می‌باشد که با داشتن، برچه بازدانه در آنها در پوشش از قطعات گل محصور می‌ماند و در حقیقت بجای دانه نوعی دیاسپوردارند. بازدانگان اخیر شامل سه راسته هستند که دو راسته آن اندمیک بوده و یک راسته آن با ۴ گونه انتشاری پراکنده در بیشتر نقاط خشک دنیا دارد منجمله ده گونه آن در فلور ایران شناخته شده است.

در جنگل‌های ایران نسبت سوزنی برگان بدروختان و درختچه‌های که برگهای پهن دارند بسیار ناچیز است. مجموعاً ۱۵ گونه از هجنس مخروطیان در ایران می‌رویند که در مقام مقایسه با ۰/۰ جنسی که در تمام دنیا انتشار دارد، رقمی بسیار محدود بشمار میرود. بطوریکه از تعداد گونه‌های مخروطیان ایران

۱- اصل این مقاله بزبان فرانسه است که در آن کلید مخروطیان، کلید گونه‌ها، انتشار جغرافیائی آنها تنظیم گردیده است.

برمی‌آید پنج جنس مزبور نیز هریک دارای گونه‌های محدود هستند که در مقایسه زیر بآن اشاره می‌شود .  
۰ گونه کاج در ایران نامبرده شده است که در برابر ۷۶ گونه شناخته شده در دنیا بسیار ناچیز است.  
۱ گونه تاکزوس بومی ایران است و در جنگلهای شمالی می‌روید با ۹ گونه‌ای که در دنیا انتشار دارد اگر مقایسه کنیم بسیار قلیل است.

۷ گونه سروکوهی یا ژنیپروس از عناصر درختی یا درختچه‌ای ارتفاعات ۲۵۰۰ متر به بالا در ایران هستند که اهمیت خاص دارند و اگر با ۶ گونه‌ای که در نقاط مختلف دنیا انتشار دارد مقایسه کنیم به نسبت سایر مخروطیان ایران قابل توجه است.

۱ گونه سرو با دو واریته بنام زربین و سروناز در ایران می‌روید که در بعضی نقاط تشکیل جنگل را داده‌اند ، گرچه سروها از نظر رویش از گذشته در ایران اهمیت خاص دارند ولی از نظر تنوع در برابر ۱۳ گونه‌ای که در جهان می‌رویند منحصر می‌باشند.

۱ گونه سرو خمره‌ای یا تویا از ۶ گونه‌ای که در دنیا می‌روید در ایران انتشار دارد .

در گونه‌های نامبرده فوق ، کاجها در رویش فعل ایران اهمیت ندارند و اگر در گذشته نیز در اواخر دوران سوم وابتدای دوران چهارم در ایران انتشار داشته‌اند ، متأسفانه بعلت فقدان مطالعه و بررسی کامل از آن اطلاع نداریم و آنچه مسلم است ، و میتوان از حافظه تاریخ یاری گرفت ، کاجها از گذشته دور در ایران همیشه کاشته شده‌اند و گونه‌هایی که در فلور ایران از آن نامبرده شده و نگارنده هنوز بآن دسترسی نیافتنی است ، احتمالاً در لشکرکشی‌های پادشاهان هخامنشی و ساسانی نظر با اهمیتی که چوب آنها در ساختن پلها و کشتی‌ها داشته است از خارج با ایران آورده شده و بکشت آن مباردت گردیده است ولی بعدها بعلت آنکه بومی ایران نبوده‌اند و باصطلاح در اپتیموم اکولژیکی خود قرار نداشته‌اند پندریج ازین رفته و امروز ہایه‌هایی بسیار نادر از آنها بجای مانده است .

سرکوهی یا ژنیپروس در رویش ایران اهمیت خاصی دارند که در جای خود از آن بحث خواهد شد .

مروها از گذشته بسیار دور در ایران اهمیت خاصی داشتند و این اهمیت گذشته از جنبه‌های اقتصادی ، ریشه عمیقی در معتقدات مذهبی و دینی ایرانیان قدیم داشته است . زربین یا سرو در ایران قدیم همیشه درختی مقدس بشمار میرفت . در این خلاصه چند عکس از سروهای تاریخی ایران در ناحیه رودبار تقدیم می‌شود که از نظر قدمت بسیار جالب هستند و بدون شک در سایر نقاط ایران نیز نمونه‌های دیگری از این تاریخهای زنده وجود دارد که از دیرباز برپا ایستاده‌اند .