

# مطالعه اثرات هوشبری اسانس و عصاره گل میخک در ماهی قزل آلای رنگین کمان

## تحت برخی شرایط کیفی آب

دکتر مهدی سلطانی<sup>۱</sup> دکتر رضا امید بیگی<sup>۲</sup> دکتر شهراب رضوانی<sup>۳</sup> دکتر محمدرضا مهرابی<sup>۴</sup> حسین چیت ساز<sup>۵</sup>

هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات آرمابخشی و بیهوشی عصاره‌های آبی، آبی-الکلی و اسانس گل میخک در ماهی قزل آلای رنگین کمان و تأثیر متقابل برخی فاکتورهای کیفی آب شامل درجه حرارت و pH بر روی قدرت بیهوش کنندگی آنها و نیز تأثیر وزن ماهی بر اثر هوشبری اسانس میخک می‌باشد.

### مواد و روش کار

۱- مواد: اسانس و عصاره: اسانس مورد نیاز به روش تقطیر آب و بخار و با استفاده از دستگاه کلونجر و با استفاده از ترکیبات هگزان و پتان و عصاره‌های آبی و آبی-الکلی با استفاده از آب و مخلوط آب - الکل به عنوان حلال و به نسبتهای توصیه شده توسط فارماکوپههای معتبر در آزمایشگاه گروه باگبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهیه گردید. ماهی: ماهی قزل آلای رنگین کمان مورد نیاز برای انجام این مطالعه در اوزان زیر یک گرم و ۱-۱۰ گرمی محصول تکثیر و پرورش شهید باهنر کلاردشت محل انجام مطالعه بوده است. سایر مواد و تجهیزات مورد نیاز: سایر مواد مصرفی و وسائل مورد نیاز استفاده شده در این مطالعه شامل کیتهاي اندازه‌گیری CO<sub>2</sub>, نیتریت، آمونیاک، کربنات کلسیم، اسید کلریدریک، هیدروکسید سدیم، ترومتر، pH متر، اکسیژن متر، بشر و پی پت مدرج، زمان سنج و آکواریوم.

۲- روش کار: مقایسه اثر هوشبری اسانس و عصاره‌ها: ابتدا به منظور مقایسه و تعیین تأثیر بیهوشی اسانس و عصاره‌ها و در نتیجه شناسایی مؤثرترین نوع ماده بیهوشی از ماهیان ۱-۱۰ گرمی و در شرایط کیفی آب کارگاه شامل درجه حرارت ۱۵ درجه سانتیگراد، pH برابر ۷ و اکسیژن با میزان ۸ mg/lit استفاده گردید. برای انجام این عمل گروههای ۱۰ تایی ماهیان به صورت انفرادی در معرض غلظتهاي ۵۰، ۲۵، ۱۰۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۲۵۰ و ۳۰۰ میلی گرم در لیتر (ppm) از اسانس و غلظتهاي ۵۰، ۲۵، ۱۰۰، ۵۰، ۲۰۰، ۱۰۰، ۴۰۰، ۲۰۰، ۱۶۰۰، ۸۰۰، ۴۰۰ و ۲۰۰۰ میلی گرم در لیتر (ppm) از هر یک از عصاره‌های آبی و آبی-الکلی قرار داده و زمانهای ایجاد بیهوشی و بازگشت از بیهوشی توسط زمان سنج اندازه‌گیری گردید. مطالعه اثرات جداگانه و مقابل درجه حرارت و pH برقدرت بیهوشی اسانس دردو گروه وزنی زیر گرم و ۱-۱۰ گرمی با توجه به نتایج به دست آمده ناشی از مقایسه تأثیر بیهوشی هر یک از اسانس و عصاره‌ها، از اسانس گل میخک با غلظت ۲۵۰ ppm بررسی اثرات جداگانه و مقابل درجه حرارت ۱۵، ۱۰ و ۲۰ درجه سانتیگراد و pH های ۶، ۷، ۸، ۹ برقدرت بیهوشی اسانس در دو گروه وزنی زیر گرم و ۱-۱۰ گرمی استفاده گردید. برای تنظیم درجه حرارت‌های مورد نیاز از آب گرم و خردی یخ و برای تنظیم pH های مورد نیاز از اسید کلریدریک و هیدروکسید سدیم یک مولار استفاده گردید. ضمناً در زمان انجام آزمایش در درجه حرارت‌های مورد اشاره، ابتدا نسبت به سازگاری ماهیان به دمای مورد نظر اقدام تا از بروز استرس حاصله جلوگیری به عمل آید. ماهیان مورد آزمایش تا ۲ هفته پس از انجام مطالعه تحت نظر بوده تا میزان تلفات احتمالی (در صورت وجود) تعیین شود. در این مطالعه از دست دادن نسبی تعادل، شناختی نامنظم، افزایش حرکات سرپوش آبشش و واکنش به محرك خارجی به عنوان مرحله ۳ بیهوشی و از دست دادن تعادل، کاهش حرکات

(۱) گروه آموزشی بهداشت و پیماریهای آبزیان دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، تهران - ایران.

(۲) گروه آموزشی باگبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران.

(۳) مؤسسه تحقیقات شیلات ایران، تهران - ایران.

(۴) دانش آموخته، دانشگاه تربیت مدرس، تهران - ایران.

مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، دوره ۵۶، شماره ۴، ۸۵-۸۹، (۱۳۸۰)

اثرات بیهوشی اسانس و عصاره‌های آبی و آبی-الکلی گل میخک در ماهی قزل آلای رنگین کمان در تحت برخی شرایط کیفی آب شامل درجه حرارت‌های ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درجه سانتیگراد و pH های ۶، ۷، ۸ و ۹ مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که هیچ یک از عصاره‌ها واحد اثرات بیهوش کنندگی (تا غلظت ۲۰۰۰ ppm) نبوده در حالی که اسانس در غلظتهاي ۵۰ ppm و بالاتر از اثرات بیهوش کنندگی مناسبی برخوردار بوده است. مناسبترین غلظت بیهوش کنندگی اسانس با توجه به زمانهای ایجاد بیهوشی و بازگشت از آن برابر ۲۵۰ ppm و در درجه حرارت ۵ درجه سانتیگراد برای دو گروه وزنی زیر گرم و ۱-۱۰ گرمی به شرح زیر بوده است: واژه‌های کلیدی: گل میخک، قزل آلای رنگین کمان، بیهوشی، کیفیت آب.

غلظت (ppm)	زمان ایجاد	زمان بازگشت از بیهوشی (ثانیه)*	زمان ایجاد	زمان بازگشت از بیهوشی (ثانیه)**
۱۰۰	۹۱	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۱
۱۵۰	۷۱	۱۱۱	۹۸	۹۸
۲۰۰	۵۷	۱۲۰	۸۴	۱۲۸
۲۵۰	۲۸	۱۸۶	۳۸	۱۹۲

۰۰) ماهیان زیر گرم، ۰۰) ماهیان ۱-۱۰ گرمی.

مطالعات متعددی پیرامون اثرات بیهوش کنندگی گل گیاه میخک در برخی گونه‌های ماهیان انجام شده است. Hikasa و همکاران در سال ۱۹۸۶ طی مطالعه‌ای غلظتهاي ۵ ppm و ۵۰-۱۰۰ ppm از اوژنول (ماده مؤثره گل میخک) را به ترتیب برای ایجاد بیهوشی و بیحسی در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد در کپور معمولی پیشنهاد دادند.

Burhandoddin و Soto در سال ۱۹۹۵ در مطالعه خود، غلظت ۱۰۰ ppm از اسانس گل میخک را برای ایجاد بیهوشی در خرگوش ماهی (*Sigamus lineatus*) در دمای ۲۷-۲۹ درجه سانتیگراد پیشنهاد دادند. در مطالعه بعدی توسط Tamari در سال ۱۹۹۶ غلظت ۲۵ ppm از اسانس گل میخک برای از دست دادن تعادل (ایجاد بیحسی) در ماهی مذکور پیشنهاد گردید.

در مطالعه بعدی در سال ۱۹۹۷ که توسط Anderson و همکاران انجام شد، غلظت ۱۲۰ ppm اسانس گل میخک برای ایجاد بیهوشی در ماهی قزل آلای رنگین کمان در ۱۱ درجه سانتیگراد پیشنهاد گردید. همچنین Munday و Wilson در سال ۱۹۹۷ متوجه تأثیر مثبت بیهوش کنندگی گل میخک در نوعی ماهی تپه های مرجانی (*Pomacentrus amboinensis*) شدند.

در سال ۱۹۹۸ و در سال ۱۹۹۹ Waterstrat نیز طی مطالعاتی به بررسی اثرات بیهوش کنندگی گل میخک در برخی گونه‌ها مانند ماهی (*Stizostedion vitreum* Walleyes) ماهی خاویاری دریاچه‌ای (*I.puntatus*) و گربه ماهی (*Acipenser fluvescens*) در سال ۱۳۷۶ پودر گل میخک را در غلظت ۱۵۰ ppm برای ایجاد بیهوشی در قزل آلای رنگین کمان مناسب دانستند و اخلاقی و بروجردی در سال ۱۳۷۸ غلظت مورد نیاز برای ایجاد تلفات در ۵۰ درصد جمعیت (LC50) ناشی از پودر گل میخک را در این ماهی مطالعه نمودند.

معنی داری با یکدیگر دارند ( $P<0.05$ ). در مورد ماهیان گروه وزنی ۱۰-۱۱ گرمی، نیز اثر هوشی انسان در درجه حرارتی ۱۰ و ۱۵ سانتیگراد فاقد اختلاف معنی دار بوده ( $P>0.05$ ) ولی این دو دما با درجه حرارتی ۵ و ۲۰ درجه سانتیگراد دارای اختلاف معنی دار می باشد ( $P<0.05$ ). به علاوه زمان بازگشت از بیهوشی در درجه حرارتی ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درجه سانتیگراد فاقد اختلاف معنی دار بوده ( $P>0.05$ ) در حالی که این سه دما با درجه حرارت ۵ درجه سانتیگراد اختلاف معنی داری دارد ( $P<0.05$ ).<sup>۴</sup> اثر pH بر قدرت بیهوشی انسان: نتایج تأثیر pH به تنهایی بر قدرت بیهوشی و بازگشت از بیهوشی ماهی قزل الادر دو گروه وزنی زیر یک گرم و ۱۰-۱۱ گرمی در حضور غلظت ۲۵۰ ppm انسان گل میخک در جدول ۳ نشان داده است. در خصوص ماهیان زیر گرم، اثر بیهوشی انسان در pH های ۷ و ۹ با هم اختلاف معنی دار نداشته ( $P>0.05$ ) اما این دو با pH های ۶ و ۸ دارای اختلاف معنی دار می باشد ( $P<0.05$ ). به علاوه زمان بازگشت از بیهوشی برای همه pH های مورد مطالعه دارای اختلاف معنی داری با یکدیگر می باشد ( $P<0.05$ ).

در خصوص ماهیان ۱۰-۱۱ گرمی، اثر بیهوشی انسان (زمان ایجاد بیهوشی) و زمان بازگشت از بیهوشی در همه pH های مورد مطالعه دارای اختلاف معنی دار با یکدیگر می باشد ( $P<0.05$ ).<sup>۵</sup> اثرات متقابل درجه حرارت و pH بر قدرت بیهوشی انسان: نتایج میانگین های دو متغیر زمان ایجاد بیهوشی (مرحله ۴) و بازگشت از بیهوشی قزل الای رنگین کمان در دو گروه وزنی زیر گرم و ۱۰-۱۱ گرمی در حضور غلظت ۲۵۰ ppm انسان گل میخک در جدول ۴ نشان داده است. همچنان که نشان داده است انسان گل میخک با غلظت ۲۵۰ ppm و در درجه حرارتها و pH های مورد استفاده در هر دو گروه وزنی ماهیان در تمامی ۱۶ ترکیب آزمایشی قادر به ایجاد بیهوشی مرحله ۴ در فاصله زمانی کمتر از یک دقیقه گردید. به علاوه در اکثر موارد میانگین بازگشت از بیهوشی کمتر از ۵ دقیقه بوده است به طوری که میانگین بالاترین زمان بازگشت از بیهوشی و ترکیب آزمایش شامل pH برابر ۶ درجه حرارت ۵ درجه سانتیگراد (تیمار ۱<sub>a,b</sub>) برابر ۴۸۴/۹۲ - ۴۳۰/۲۶ ثانیه بوده است در حالی که میانگین کوتاهترین زمان بازگشت از بیهوشی مربوط به ترکیب آزمایش شامل درجه حرارت ۵ درجه سانتیگراد و pH برابر ۷ (تیمار ۲<sub>a,b</sub>) بوده است که برابر ۱۹۹/۰۸ - ۱۸۷/۸ ثانیه می باشد.

سرپوش آبشش و عدم واکنش به محرك خارجي به عنوان مرحله ۴ بیهوشی تعریف گردیده است (<sup>۶</sup>). آزمونهای آماری: با توجه به استفاده بیش از یک فاکتور در انجام برخی آزمایشها، طرح آماری به صورت طرح فاکتوریل با ۱۰ تکرار برای هر تیمار استفاده گردید.

## نتایج

مقایسه اثرات بیهوشی انسان و عصاره ها: ۱) عصاره ها: هیچ یک از عصاره های آبی و آبی - الکلی در غلظتها مورد استفاده موجب ایجاد بیهوشی در دو گروه وزنی ماهیان نگردید. به هر حال عصاره آبی - الکلی در غلظتها ۱۶۰۰ و ۲۰۰۰ میلی گرم در لیتر به ترتیب پس از گذشت میانگین زمانهای ۸، ۵ و ۳ دقیقه موجب ایجاد مرحله ۳ بیهوشی در ماهیان زیر گرم و در میانگین زمانهای ۱۰-۱۱ ۸/۳۴ و ۴/۰۷ دقیقه موجب ایجاد مرحله ۳ در ماهیان ۱۰-۱۱ گرمی گردید. ۲) انسان: نتایج تأثیر بیهوشی انسان بر ماهی قزل الای رنگین کمان در دو وزن زیر گرم و ۱۰-۱۱ گرمی در جدول ۱ نشان داده شده است. همچنان که در جدول ۱ آمده است اولاً همه غلظتها مورد استفاده بجز غلظت ۲۵ ppm در فاصله زمانی کمتر از ۴ دقیقه موجب بیهوشی کامل (مرحله ۴) در دو گروه وزنی ماهیان گردید. ثانیاً با افزایش غلظت انسان زمانهای رسیدن به مراحل ۳ و ۴ در هر دو گروه وزنی کوتاهتر گردیده است. ثالثاً با افزایش وزن ماهی زمانهای رسیدن به مراحل ۳ و ۴ طولانیتر شده است. همچنین استفاده از غلظت ۲۵ ppm تنها ایجاد بیهوشی تا مرحله ۳ را در ماهیان نمود.<sup>۳</sup> اثر درجه حرارت بر قدرت بیهوشی انسان: نتایج تأثیر درجه حرارت به تنهایی بر قدرت بیهوشی و بازگشت از بیهوشی ماهی قزل الای در دو گروه وزنی زیر یک گرم و ۱۰-۱۱ گرمی در حضور غلظت ۲۵۰ ppm از انسان گل میخک در جدول ۲ آمده است. در ارتباط با ماهیان زیر یک گرم اثر بیهوشی انسان در درجه حرارتی ۵ و ۱۰ درجه سانتیگراد اختلاف معنی داری نداشته ( $P>0.05$ ) ولی این دو با درجه حرارتی ۱۵ و ۲۰ درجه سانتیگراد اختلاف معنی داری دارند ( $P<0.05$ ). علاوه بر این زمان بیهوشی در درجه حرارتی ۱۵ و ۲۰ درجه سانتیگراد نیز با یکدیگر از اختلاف معنی داری برخوردار است ( $P<0.05$ ). به علاوه زمان بازگشت از بیهوشی در درجه حرارتی ۱۵ و ۲۰ درجه سانتیگراد فاقد اختلاف معنی دار بوده ( $P>0.05$ ) در حالی که این دو دما با درجه حرارتی ۱۵ و ۲۰ درجه سانتیگراد معنی داری نشان می دهد ( $P<0.05$ ). همچنین زمان بازگشت از بیهوشی در درجه حرارتی ۵ و ۱۰ درجه سانتیگراد اختلاف

جدول ۱- نتایج اثرات بیهوشی انسان گل میخک در قزل الای رنگین کمان زیر یک گرم و ۱۰-۱۱ گرمی در درجه حرارت ۱۵ درجه سانتیگراد و pH برابر ۷ (هر تیمار شامل تعداد ۱۰ قطعه ماهی است).

تیمار	غلظت انسان (ppm)	میانگین زمان رسیدن ماهی به مرحله ۳ بیهوشی (ثانیه)	میانگین زمان رسیدن ماهی به مرحله ۴ بیهوشی (ثانیه)	میانگین زمان رسیدن ماهی به مرحله ۴ بیهوشی (ثانیه)
ماهیان ۱۰-۱۱ گرمی	ماهیان زیر گرم	ماهیان ۱۰-۱۱ گرمی	ماهیان زیر گرم	ماهیان زیر یک گرم
۱	۲۵	۴۵۰	۳۰۵	-
۲	۵۰	۱۶۶	۲۱۰	۱۸۴
۳	۱۰۰	۷۶	۸۳	۸۳
۴	۱۵۰	۵۸	۷۹	۶۷
۵	۲۰۰	۴۵	۶۷	۵۳
۶	۲۵۰	۱۵	۲۱	۱۹
۷	۳۵۰	۱۰	۱۵	۱۲

جدول ۲- نتایج اثر هوشی انسان گل میخک با غلظت ۲۵۰ ppm در قزل الای رنگین کمان در دو گروه وزنی زیر یک گرم و ۱۰-۱۱ گرمی در درجه حرارت ۵، ۱۰، ۱۵، ۲۰ درجه سانتیگراد و pH برابر ۷ (هر تیمار شامل تعداد ۱۰ قطعه ماهی است).

درجه حرارت °C	ماهیان زیر یک گرم	ماهیان ۱۰-۱۱ گرمی	ماهیان زیر یک گرم	ماهیان ۱۰-۱۱ گرمی	میانگین زمان رسیدن ماهی به مرحله ۴ بیهوشی (ثانیه)
ماهیان ۱۰-۱۱ گرمی	ماهیان زیر یک گرم	ماهیان ۱۰-۱۱ گرمی	ماهیان زیر یک گرم	ماهیان ۱۰-۱۱ گرمی	میانگین زمان رسیدن ماهی به مرحله ۴ بیهوشی (ثانیه)
۵	۳۴/۵۱	۴۲/۱۵	۳۰۵	۴۵۰	۲۷۵/۸۲
۱۰	۳۵/۸	۳۷/۲۰	۱۶۶	۲۱۰	۲۴۹/۷۸
۱۵	۳۰/۶۳	۳۷/۱۷	۷۶	۹۹	۲۴۸/۱
۲۰	۲۵/۶	۳۱/۰۸	۱۰	۴۵۰	۲۳۵/۷۴



ترتیب ۱۸۴-۲۱۶ ثانیه و ۸۳-۱۰۸ ثانیه برآورد گردید. بنابراین از نظر آبزی پروری کاربردی استفاده از هریک از غلظتها فوچ قابل توصیه است. Anderson و همکاران در سال ۱۹۹۷ در مطالعه خود به ترتیب غلظتها ۱۰۰-۱۲۰ ppm و ۲۰-۴۰ ppm را برای ایجاد بیهوشی کامل و بیهوشی سبک در قزل آلای زنگین کمان و در دمای  $11 \pm 0.5$  درجه سانتیگراد توصیه کرده است ولی اشاره ای به زمانهای ایجاد بیهوشی و بازگشت از بیهوشی و سایر فاکتورهای کیفی آب نشده است.

نتایج اثرات متقابل درجه حرارت و pH با استفاده از غلظت ۲۵۰ ppm (جدول ۴) نشان می دهد که با توجه به سرعت زمان ایجاد بیهوشی و بازگشت از بیهوشی و نیز با عنایت به شرایط فیزیولوژیک و محیطی مناسب برای ماهی قزل آلا، می توان از اسانس گل میخک در غلظت ۵۰-۲۵۰ ppm و در درجه حرارت ۱۵-۱۵ درجه سانتیگراد و pH های ۶-۸ برای بیهوشی این گونه از ماهی استفاده نمود. زیرا در تمامی موارد بررسی اثرات متقابل pH و درجه حرارت، ماهیان در فاصله زمانی کمتر از یک دقیقه به مرحله بیهوشی کامل رسیده و در آنتر موارد میانگین بازگشت از بیهوشی کمتر از ۵ دقیقه بوده است (جدول ۴). اگرچه استفاده از پودر گل میخک برای ایجاد بیهوشی نیز عملی است همچنان که در مطالعه مهرابی در سال ۱۳۷۶ نشان داده شد اما از آنجایی که افروزن پودر به آب موجب کاهش کیفیت آب شده و مشکل تنفس ناشی از تجمع پودر در رشته های آبشیشی را فراهم می کند، استفاده از پودر آن را تقریباً غیر عملی می سازد.

بنابراین با توجه به ارزان قیمت بودن گل گیاه میخک، سهولت در تهیه

## بحث

استفاده از عوامل شیمیایی بیهوش کننده در آبزی پروری بیوژه در ماهی دارای کاربردهای متعددی است که از آن جمله می توان به حمل و نقل، تکثیر صنوعی، خونگیری، درمان موضعی و یا تزریقی، واکسیناسیون و بیوپسی از پوست، باله ها و آششها اشاره نمود. در همه موارد مذکور عامل بیهوش کننده منجر به کاهش فعالیتهای فیزیولوژیک و نهایتاً کاهش استرس وارد و جلوگیری از بروز بیماریها و تلفات بعدی بیوژه با عوامل ثانویه می شود.

اگرچه عوامل شیمیایی متعددی مانند MS 222 و بنزوکائین برای ایجاد بیهوشی در ماهیان قبل دسترس است، اما هر یک از عوامل مذکور واحد عوارض جانبی متعددی است که از آن جمله می توان به ایجاد مشکلات زیست محیطی ناشی از استفاده آنها در آب، عدم امکان مصرف ماهیان بیهوش شده تا مدتی پس از بیهوشی، گران قیمت بودن و خطرات بهداشت فردی برای افراد استفاده کننده در مزارع تکثیر و پرورش ماهی اشاره کرد. لذا یافتن عوامل بیهوش کننده جایگزینی با ویژگیهایی برتر مانند ایجاد بیهوشی سریع، سهولت و سرعت در بازگشت از بیهوشی، سرعت دفع آنها از بافتها، عدم خاصیت سمومیت زایی در غلظتها درمانی و ارزان بودن آنها امری ضروری است.

در این مطالعه هیچ یک از عصاره های آبی و آبی - الکلی در غلظتها تا ۲۰۰۰ ppm قادر به ایجاد بیهوشی در ماهی نگردیده در حالی که استفاده از غلظتها ۵۰ و ۱۰۰ ppm اسانس گل میخک به ترتیب پس از ۱۶۶-۲۱۰ ثانیه و ۷۶-۹۹ ثانیه موجب بیهوشی کامل ماهی قزل آادر دمای ۱۵ درجه سانتیگراد و pH برابر ۷ گردید. زمانهای بازگشت از بیهوشی نیز به

**جدول ۳**- نتایج اثرات هوشبری اسانس گل میخک با غلظت ۲۵۰ ppm در قزل آلای زنگین کمان و در pH های ۶، ۷، ۸ و ۹ درجه حرارت ۱۵ درجه سانتیگراد (هر تیمار شامل تعداد ۱۰ قطعه ماهی است).

میانگین زمان رسیدن ماهی به مرحله ۴ بیهوشی (ثانیه)	میانگین زمان زمان بازگشت از بیهوشی (ثانیه)	pH
ماهیان ۱-۱۰ گرمی	ماهیان زیریک گرم	ماهیان زیریک گرم
۳۴۲/۹۶	۲۱۸/۴۸	۲۳/۱۸
۲۵۴/۲۲	۲۲۹/۷۴	۲۰/۳۳
۲۰۵/۰۸	۲۱۷/۷۴	۵۲/۵۸
۲۳۷/۱۸	۳۰۵/۷	۴۱/۲۲
		۳۲/۴۵
		۶
		۷
		۸
		۹

**جدول ۴**- نتایج میانگینهای دو متغیر زمان ایجاد بیهوشی (مرحله ۴) و بازگشت از بیهوشی قزل آلای زنگین کمان زیر یک گرم و ۱۰-۱۰ گرمی تحت تأثیر اسانس گل میخک با غلظت ۲۵۰ ppm در ۱۶ ترکیب آزمایش (اثرات متقابل درجه حرارت و pH) (تعداد ماهی در هر آزمایش برابر ۱۰ قطعه است).

ماهیان ۱-۱۰ گرمی	ماهیان زیر یک گرم	شماره ترکیب آزمایش
میانگین زمان بازگشت از بیهوشی (ثانیه)	میانگین زمان بازگشت از بیهوشی (ثانیه)	میانگین زمان ایجاد بیهوشی (ثانیه)
۴۸۴/۹۲(a)	۴۲(b)	۴۳۰/۲۶(a)
۱۸۷/۸(fg)	۲۴(cfg)	۱۹۹/۰۸(h)
۲۱۴/۰۸(e)	۴۹/۹۰(b)	۲۵۰/۱۴(cf)
۲۱۶/۵۴(e)	۵۶/۱۰(a)	۳۸۵/۰۲(b)
۲۹۹/۱۶(bc)	۲۸/۷۰(de)	۳۰۹/۳(c)
۲۷۳/۵۴(cd)	۱۸/۵۰(gh)	۲۶۲/۰۸(cf)
۲۲۳/۱۴(e)	۵۵/۶۰(a)	۱۹۱/۹۴(h)
۲۰۲/۴(cf)	۴۴/۸۰(b)	۳۷۱/۵۴(b)
۲۵۹/۱۴(d)	۳۱/۴۰(d)	۲۵۰/۱۴(cf)
۲۶۸/۹۲(d)	۲۲/۵۰(fg)	۲۶۰/۸(de)
۲۱۴/۴۴(cf)	۵۶/۹۰(a)	۱۸۶(h)
۲۴۹/۷۴(d)	۳۷/۴۰(c)	۲۴۲/۰۴(fg)
۲۵۶/۶۸(d)	۲۷/۵۰(def)	۲۸۴/۱۶(d)
۳۱۰/۶۲(b)	۲۶/۳۰(h)	۲۹۱/۹۴(h)
۲۶۸/۶۶(g)	۵۳/۹۰(a)	۲۴۲/۸۲(fg)
۲۷۹(cd)	۲۶/۶۰(def)	۲۲۴/۵۲(g)
		۱۶/۲(jk)
		۴۰/۸(c)
		۴۲/۷(c)
		۱۸(ijk)
		a <sub>4</sub> b <sub>1</sub>
		a <sub>4</sub> b <sub>2</sub>
		a <sub>3</sub> b <sub>1</sub>
		a <sub>3</sub> b <sub>2</sub>
		a <sub>3</sub> b <sub>3</sub>
		a <sub>4</sub> b <sub>1</sub>
		a <sub>4</sub> b <sub>2</sub>
		a <sub>4</sub> b <sub>3</sub>
		a <sub>4</sub> b <sub>4</sub>

a<sub>1</sub>,a<sub>2</sub>,a<sub>3</sub>,a<sub>4</sub>,b<sub>1</sub>,b<sub>2</sub>,b<sub>3</sub>,b<sub>4</sub> به ترتیب برابر درجه حرارت ۱۰، ۱۵، ۲۰ و ۲۵ درجه سانتیگراد و pH های ۶، ۷، ۸ و ۹ می باشند. حروف انگلیسی داخل پرانتز نشانه اختلاف معنی دار بین اعداد است. حروف مشابه نشانه عدم اختلاف معنی دار بین اعداد می باشد.



### References

۱. اخلاقی، م. میراب بروجردی، م. (۱۳۷۸): بررسی اثر بیهوش کنندگی گل میخک در ماهی و تعیین LC50 آن. مجله دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران. شماره ۲، دوره ۵۴، صفحه: ۴۹-۵۲.
۲. مهرابی، ی. (۱۳۷۶): مطالعه مقدماتی اثر بیهوشی پودر میخک بر روی قزل آلای رنگین کمان، مجله پژوهش و سازندگی، شماره ۴۱، صفحه: ۱۶۰-۱۶۲.
۳. Anderson W.G., McKinley R.S. & Colvecchia M. (1997): The use of clove oil as anesthetic for rainbow trout and its effects on swimming performance. National American Journal Fishery Management, 17: 301-307.
۴. Brown, L.A. (1992): Anesthesia and restraint. In: M.K Stoskopf (ed). Fish Medicine. W. B. Saunders Company PP. 79-91.
۵. Hikasa Y., Takase, K., Ogasawara T., Ogasawara S. (1986): Anesthesia and recovery with tricaine methansulfonate, eugenol and thiopental sodium in carp (*Cyprinus Carpio*). Japanese Journal of Veterinary Science, 48: 340-351.
۶. Munday P.L. and Wilson S.K. (1997): Comparative efficacy of clove oil and other chemicals in anaesthetization of *Pomacentrus amboinensis*, a coral reef fish. Journal of Fish Biology, 51: 931-938.
۷. Peake S. (1998): Sodium bicarbonate and clove oil as potential anesthetics for nonsalmonid fishes. North American Journal of Fishers Management, 18: 919-924
۸. Soto C.G. and Burhanuddin. (1995): Clove oil as a fish anaesthetic for measuring length and weight of rabbit fish (*Signus lineatus*). Aqua Culture, 135: 149-152.
۹. Tamari C.S. Carlstrom-Trick C. & Fitzgerald W.J. Jr. (1996): Clove oil, minyak cengkeh, a natural fish anesthetic. Proceeding of the Pacon Conference on Sustainable Aqua Culture – 95, PP. 265-371.
۱۰. Waterstrat P.R. (1999): Induction and recovery from anesthesia in channel catfish (*Ictalurus punctatus*) fingerlings exposed to clove oil. Journal of World Aqua Culture Society. 30: 250-255.

### Study of anaesthetic effects induced by clove flower (*Eugina caryophyllata*) on rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) under various water quality conditions

Soltani, M.<sup>1</sup>, Omidbeigi, R.<sup>2</sup>, Rezvani, S.<sup>3</sup>, Mehrabi, M.R.<sup>3</sup>, Chitsaz, H.<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Department of Aquatic Animal Health, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran – Iran. <sup>2</sup>Faculty of Agriculture, University of Tarbiat Modares, Tehran - Iran.

<sup>3</sup>Iranian Fisheries Research Institute, Tehran - Iran. <sup>4</sup>Faculty of Agriculture, University of Tarbiat Modares, Tehran - Iran. J. Fac. Vet. Med. Tehran. Univ. 56, 4: 85-89, 2001.

Anaesthetic effects of essence, water and water-alcohol extractions of clove flower (*Eugina caryophyllata*) were studied on rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*) at water temperatures of 5°C, 15°C and 20°C and pH of 6,7,8 and 9. Results showed both water and water-alcohol extractions had

اسانس و عدم ایجاد مشکلات زیست محیطی و بویژه اثرات سریع ایجاد و بازگشت از بیهوشی توصیه می شود برای ایجاد بیهوشی کامل از غلظتها ۲۵۰ ppm استفاده شود. به هر حال با توجه به اینکه بسته به تجربه آزمایشگاهی احتمال اختلاف در غلظت اسانسها تهیه شده وجود دارد توصیه می شود که اسانس مصرفی برای ایجاد بیهوشی در آبزیان پرورشی به صورت قرص و یا پودر تهیه و قبل از استفاده و نسبت به استاندارد کردن غلظت آن اقدام شود. به علاوه مطالعه اثرات بیهوشی اسانس گل میخک در سایر آبزیان پرورشی به منظور استاندارد کردن غلظتها مورد نیاز و نیز مطالعه اثرات احتمالی جانبی آن بویژه در ماهیان مولد امری ضروری است. این گونه مطالعات در حال انجام می باشد.

### تشکر و قدردانی

مؤلفین لازم می دانند از همکاری رئیس و کارشناسان مرکز تکثیر و پرورش ماهی کلاردشت تشکر و قدردانی نمایند. این مطالعه با حمایت مالی مؤسسه تحقیقات شیلات ایران و معاونت تکثیر و پرورش شیلات ایران انجام گرفته است که بدین وسیله تشکر و قدردانی می نماید.



similar effects with a very low anaesthetic effect even at concentration of 2000 ppm. However, clove oil essence anaesthetized fish at a concentration below 100 ppm. The best anaesthetic effect and recovery time was found at concentration of 250 ppm at water temperature of 5°C and pH7. Considering the required times to anaesthetize and recovery the most suitable anaesthetic concentrations for fish at water temperature of 5°C were as follows:

Dosage (ppm)	Anaesthetic time(second)*	Recovery time(second)*	Anaesthetic time(second)**	Recovery time(second)**
100	91	108	101	113
150	72	111	98	122
200	57	120	84	128
250	28	186	38	192

\* Fish less than 1 g body weight    \*\* Fish of 1-10 g body weight

**Key words:** clove flower, rainbow trout, anesthesia, water quality.




---