

بررسی و ارایه یک روش جدید برای تهیه کلید شناسایی ارقام خرما

محمد هاشم‌پور^۱، محمد صانعی شریعت‌پناهی^۲، محمد حسین دانشور^۳

۱، ۳، دانشور و استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

۲، استاد سابق دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران

تاریخ پذیرش مقاله ۸۲/۲/۲۴

خلاصه

ایران یکی از مهمترین کشورهای تولید کننده و صادرکننده خرما در جهان می‌باشد. حدود ۴۰۰ رقم و در بعضی از منابع تا ۶۰۰ رقم خرما در ایران گزارش شده است. تاکنون برای شناسایی و معرفی ارقام خرما در ایران، مطالعات علمی صورت نگرفته است. یکی از مهمترین روش‌های شناسایی ارقام خرما، وجود یک کلید شناسایی^۱ استاندارد و بین‌المللی می‌باشد، تا براساس آن شناسایی علمی و عملی صورت گیرد. بررسی‌های انجام شده نشان دادند که در حال حاضر هیچ‌گونه کلیدی برای شناسایی ارقام خرما وجود ندارد. با بررسی منابع مختلف و مشورت با متخصصین خرما و با استفاده از روش‌های شناسایی سایر درختان میوه (۴ و ۱۸) حدود هفتاد صفت برای اندازه گیری مشخص شد. بنابراین با استفاده از صفات مهم اندام‌های مختلف نخل خرما از قبیل: برگ، گل، خوش، میوه، هسته و کلاهک، کلید شناسایی برای ارقام خرمای منطقه شادگان (خوزستان) تهیه و با نمونه برداری، توزین میوه خرما، آمارگیری، ثبت مشخصات عمومی نخل خرما، تهیه عکس و اسالید و تنظیم جدول‌ها، بیست رقم خرما به اسمی ذیل شناسایی گردیدند: ۱- سعمران ۲- گنطار ۳- حلاوی ۴- خضراوی ۵- بریم ۶- دیری ۷- شکر ۸- برحی ۹- حمراوی ۱۰- زاهدی ۱۱- چیچاب ۱۲- مشتم ۱۳- لیلوی ۱۴- بوزی (جوزی) ۱۵- فرسی ۱۶- خصاب ۱۷- هدل ۱۸- عویدی ۱۹- اشگر ۲۰- سویدانی در نتیجه با استفاده از جدولهای تعیین شده، می‌توان از کلید شناسایی بدست آمده بعنوان یک الگو، برای شناسایی ارقام خرما در هر منطقه از ایران یا کشورهای تولید کننده خرما در جهان از آن استفاده نمود. در این تحقیق به علت فراوانی صفات، فقط ارقام خرمای منطقه شادگان که یکی از مناطق مهم خرما خیز خوزستان می‌باشد، بررسی و کلید شناسایی تهیه شده است.

واژه‌های کلیدی: خرما، کلید شناسائی، ایران

هر کدام از ارقام خرما، ما را در رسیدن به اهداف فوق کمک می‌کند.

بعضی از ارقام خرما، با توجه به کیفیت بافت خشک و نیمه خشک آنها، فقط برای صادرات مناسب هستند. در صورتی که تعدادی از ارقام به دلیل نرم و طعم آنها برای تازه خوری مورد استفاده قرارمی‌گیرند. برخی از ارقام نیز به دلیل کمیت و کیفیت متوسط تا پایین و داشتن شیره فراوان و عناصر غذایی

مقدمه

رونده رو به افزایش رشد جمعیت کره زمین و نیاز شدید به مواد غذایی (۷) از یک طرف و ارزش غذایی، صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خرما از طرف دیگر، ایجاد می‌نماید تا توجه بیشتری به شناسایی و معرفی مهمترین ارقام اقتصادی و پرمحصول خرما به عمل آید. همچنین به منظور افزایش تولید خرما و بهبود وضع فعلی نخلستان‌های کشور، شناسایی و معرفی

آنناس (۱۶، ۱۸) اقدام به شناسایی اولیه در دو منطقه گردید. یکی در قسمت شمال و دیگری در قسمت جنوبی شهرستان شادگان. روی نخلهای مورد نظر علامت‌گذاری و پلاک‌کوبی گردید. این کار برای هرنخل در مرحله قبل از گل‌دهی در ماههای دی و بهمن و با تخصیص شماره‌های عددی انجام گرفت.

در این تحقیق ۲۰ رقم از ارقامی که در دو منطقه ذکر شده موجود بودند، انتخاب و علامت‌گذاری گردیدند. حدود ۷۰ صفت، روی اندامهای مختلف هر نخل که نقش اساسی در شناسایی مرفولوژی ارقام داشتند، در مراحل مختلف زمانی به شرح ذیل اندازه‌گیری و یا مقایسه مشاهدهای و در جدول‌های مختلف ثبت گردیدند:

۱- بررسی مشخصات عمومی هرنخل از ارقام خرما (۱۰) که مورد ارزیابی قرار گرفتند، عبارتند بودند از: اسم فارسی، اسم مترادف، سن نخل، فاصله کشت دو نخل از یکدیگر، محیط تنۀ نخل، ارتفاع نخل خرما (از سطح زمین تا زیر تاج).

۲- بررسی مشخصات گل در ارقام خرما (۵) در هر تارونه و خوش، فاکتورهایی که مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند، عبارتند بودند از:

طول برگ، عرض برگ، طول دمیرگ، طول رگبرگ اصلی واحد برگچه، تعداد برگچه، طول برگچه (بزرگترین و کوچکترین)، میانگین طول برگچه، فواصل بین برگچه، تعداد خار در هر برگ، طول خار (کوتاه، متوسط و بلند)، فاصله بین خارها، وزن برگ (کیلو گرم)، حالت نوک برگ (پرمانند، کاملاباز و باز پنجهای) و تراکم خار (کم، متوسط و زیاد).

۳- بررسی مشخصات گل در ارقام خرما (۵). در هر تارونه و خوش، فاکتورهایی که مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند، عبارتند بودند از:

تاریخ ظهرورتارونه، تاریخ گرده افسانی، وزن تارونه حاوی گل (به گرم)، اندازه تارونه (طول X عرض) تعداد خوش چه، تعداد گل در هر خوش چه و تعداد گل در هر تارونه.

۴- بررسی صفات مرفولوژیکی خوش در مرحله خارک و رطب (۱۰، ۱۱، ۱۲) برای ارزیابی و اندازه‌گیری خصوصیات خوشۀ خرما صفات زیرمورد بررسی قرار گرفت:

مختلف آن ، برای مصارف صنعتی و صنایع تبدیلی از قبیل: تیهۀ شیره ، قند مایع، سس خرما، آرد و خمیرخرما، الکل و سرکه مورد استفاده قرار می گیرند. شناسایی ارقامی که دارای هستۀ درشت، کلاهک بزرگ، پوست ضخیم و بافت کم گوشت هستند، بعنوان خرمای نامرغوب درجه ۳ و ۴ معرفی می شوند و برای کارخانه های تهیۀ خوراک دام و طیور مناسب خواهند بود.

اهمیت شناسایی ارقام خرما

۱. خرما تنها محصول کشاورزی می باشد که با حداقل سرمایه‌گذاری نسبت به سایر درختان میوه در مناطق محروم جنوبی کشور می تواند، منبع پردرآمدی برای نخلکاران باشد.

۲. با توجه به اهمیت محصولات کشاورزی در صادرات غیرنفتی کشور، صادرات خرما می تواند بعنوان یکی از مهمترین منابع ارزی جایگزین نفت گردد.

۳. وجود تنوع فراوان در میان ارقام خرما (بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ رقم) در کشور و عدم آگاهی نخلکاران از کمیت و کیفیت آنها، باعث گردیده که علمکرد محصول خرما بطور چشمگیری کاهش یابد.

۴. شناسایی و معرفی مهمترین ارقام خرما که از نظر صادرات، صنایع تبدیلی، صنایع دارویی، صنایع دستی و خوراک دام و مرغوبیت در هر منطقه مقوون به صرفه باشد و به تکثیر آنها از طریق ایجاد خزانه پاجوش خرما، اقدام گردد.

۵. شناسایی و معرفی ارقام کم محصول ولی با ارزش از نظر اطلاعات ژنتیکی، به منظور استفاده در دستکاریهای ژنتیکی^۱ نخل خرما، این ارقام احتمالاً دارای خصوصیاتی از قبیل: مقاوم به آفات و امراض، مقاوم به سرما، مقاوم به رطوبت بالا، مقاوم به کم آبی و مقاوم به شوری می باشند.

۶. ارقام خرما پس از شناسایی، جمع‌آوری می شوند و در کلکسیون‌های مراکز تحقیقات خرما در کشور، کشت می گردد و بصورت زرم پلاست^۲ نگهداری می شوند.

مواد و روش‌ها

با استفاده از اطلاعات نخلداران محلی و با همکاری کارشناسان اداره کشاورزی هر منطقه و با بکارگیری روش‌های شناسایی بعضی از درختان میوه از قبیل به، نخل روغنی و

1. Genetic manipulation
2. Germplasm

جدول ۱- کلید شناسایی ارقام خرمای شادگان بر مبنای خصوصیات میوه

ردیف	خصوصیات میوه	شماره راهنمای نام ارقام شناسایی شده
۱a	میوه خرما زرد رنگ.....	۲
۱b	میوه خرما معمولاً قهقهه ای رنگ.....	۱۲
۲a	حبه های کوچک و هسته تقریباً کروی.....	۳
۲b	حبه های درشت و هسته غیر کروی	۴
۳a	پوست میوه نازک (بین ۰/۱۵ تا ۰/۲۰ میلی متر)، خوشة ها کاملاً متراکم.....	۱۳الیلوی
۳b	پوست میوه ضخیم (بین ۰/۲۰ تا ۰/۲۵ میلی متر)، سنبله ها غیر متراکم.....	۸-برحی
۴a	پوست میوه خیلی نازک (کمتر از ۱۵ میلی متر)، دارای زمینه قهوه ای.....	۵-بریم
۴b	پوست میوه ضخیم یا نسبتاً ضخیم (بیش از ۰/۲۵ میلی متر) با زمینه زرد یا سبز.....	۵
۵a	بافت میوه کاملاً سفت و شکل میوه بیضی یا تخم مرغی.....	۱۰- Zahedi
۵b	بافت میوه کاملاً سخت و شکل میوه بیضی یا تخم مرغی.....	۶
۶a	کلاهک میوه چین خورده و به رنگ زرد.....	- گنطار
۶b	کلاهک میوه صاف و به رنگ زرد.....	۷
۷a	میوه درشت (بزرگتر از ۱۱ میلی متر).....	۸
۷b	میوه متوسط یا کوچک (کوچکتر از ۱۱ میلی متر).....	۹
۸a	بافت میوه نرم و پوست آن متوسط	- حلاوی
۸b	بافت میوه نیمه خشک و پوست آن ضخیم	۱۱- چچاپ
۹a	پوست میوه ضخیم (بین ۰/۲۰ تا ۰/۲۵ میلی متر).....	۱۰
۹b	پوست میوه متوسط (بین ۰/۱۵ تا ۰/۲۰ میلی متر).....	۱- سعمران
۱۰a	بافت میوه نیمه خشک	۱۱
۱۰b	بافت میوه نرم	۴- خضرابی
۱۱a	بافت میوه نرم و رنگ آن زرد روشن	۷- شکر
۱۱b	بافت میوه نیمه خشک، رنگ آن زرد مایل به سبز	۱۲- مشتوم
۱۲a	میوه تقریباً کروی	۱۳
۱۲b	میوه غیر کروی	۱۴
۱۳a	هسته دارای دو بال (زایده)	۱۴- یوزی
۱۳b	هسته دارای یک بال (زایده)	۲۰- سویدانی
۱۴a	گوشت میوه نرم	۱۵
۱۴b	گوشت میوه خشک یا نسبتاً خشک	۱۷- اشگر
۱۵a	میوه تخم مرغی رنگ قهوه ای روشن و کاملاً زود رس.....	۱۶- هدل
۱۵b	میوه مستطیلی یا بیضی قهوه ای تیره و غیر زود رس	۱۸- عویدانی
۱۶a	هسته تقریباً کروی و خاکستری رنگ، پوست میوه نسبتاً ضخیم	۹- حمراهی
۱۶b	هسته بیضی کشیده و قهوه ای رنگ، پوست میوه کاملاً ضخیم	۱۸- فرسی
۱۷a	کلاهک میوه چین خورده و رنگ زرد مایل به قهوه ای	۱۸
۱۷b	کلاهک میوه صاف یا نسبتاً صاف به رنگ زرد	۱۹- فرسی
۱۸a	میوه قهوه ای تیره	۱۹
۱۸b	میوه قهوه ای روشن	۶- دیری
۱۹a	هسته بیضی کشیده و کرمی رنگ و در داخل میوه آزاد، میوه زود رس.....	۱۶- خصاب
۱۹b	هسته تخم مرغی، نوک تیز قهوه ای روشن و چسبیده به میوه، میوه دیررس	

ب: کلید شناسایی ارقام خرمای شادگان بر مبنای خصوصیات برگ

۲	برگ ها در انتها باز.....-۱a
۱۳	برگ ها در انتها نیمه باز.....-۱b
۳	برگ ها سپری پنجه مانند.....-۲a
۴	برگ ها سپری کامل.....-۲b
۱۰- زاهدی	طول برگ ها بیش از سه نیم متر، خارها بلند، بیش از ۲۵ عدد در هر برگ.....	-۳a
-۸- برحی	طول برگ ها کمتر از سه نیم متر، خارها کوتاه، کمتر از ۲۵ عدد در هر برگ.....	-۳b
۱۲	عرض برگ ها بیش از یک متر.....	-۴a
۵	عرض برگ ها کمتر از یک متر.....	-۴b
۱۷- هدل	طول کوچکترین برگچه ها بیش از نیم متر و فاصله برگچه ها بیش از سه سانتی متر.....	-۵a
۶	طول کوچکترین برگچه ها کمتر از نیم متر و فاصله برگچه ها کمتر از سه سانتی متر.....	-۵b
۴- خضراوی	طول دمبرگ ها بیش از یک متر و فاصله خارها بیش از ۷ سانتی متر.....	-۶a
۷	طول دمبرگ ها کمتر از یک متر و فاصله خارها کمتر از ۷ سانتی متر.....	-۶b
۸	محیط دمبرگ (قطع برش) بیش از ۱۵ سانتی متر.....	-۷a
۹	محیط دمبرگ (قطع برش) کمتر از ۱۵ سانتی متر.....	-۷b
۱۶- خساب	تعداد خارها در هر برگ بیش از ۲۰ عدد و خارها بلند.....	-۸a
۲- گنطار	تعداد خارها در هر برگ کمتر از ۲۰ عدد و خارها بلند.....	-۸b
۱۰	طول دمبرگ بیش از نیم متر.....	-۹a
۱۵- فرسی	طول دمبرگ کمتر از نیم متر.....	-۹b
۱۱	خارها بیشتر از ۱۰ عدد در هر برگ.....	-۱۰a
۱۲	خارها کمتر از ۱۰ عدد در هر برگ.....	-۱۰b
۱۵- بریم	طول برگ بیش از سه متر و طول دمبرگ بیش از ۷۰ سانتی متر.....	-۱۱a
۱۹- اشگر	طول برگ کمتر از سه متر و طول دمبرگ کمتر از ۷۰ سانتی متر.....	-۱۱b
۱۳- لیلوبی	طول دمبرگ بیش از ۷۵ سانتی متر، خارها متوسط.....	-۱۲a
۶- دیری	طول دمبرگ کمتر از ۷۵ سانتی متر، خارها بلند.....	-۱۲b
۱۴	خارها روی برگ بیش از ۲۰ عدد.....	-۱۳a
۱۵	خارها روی برگ کمتر از ۲۰ عدد.....	-۱۳b
۲۰- سویدانی	طول برگها بیش از چهار متر و عرض برگها کمتر از یک متر.....	-۱۴a
۱۴- یوزی	طول برگها کمتر از چهار متر و عرض برگها بیش از یک متر.....	-۱۴b
۱۶	محیط دمبرگ (قطع برش) بیش از ۱۵ سانتی متر.....	-۱۵a
۱۸	محیط دمبرگ (قطع برش) کمتر از ۱۵ سانتی متر.....	-۱۵b
۷- شکر	طول برگها بیش از سه و نیم متر و عرض برگها کمتر از یک متر.....	-۱۶a
۱۷	طول برگها کمتر از سه و نیم متر و عرض برگها بیش از یک متر.....	-۱۶b
۹- حمراوی	تعداد خارها در هر برگ کمتر از ۱۵ عدد و فاصله خارها بیش از ۵ سانتی متر.....	-۱۷a
۱۱- چچاب	تعداد خارها در هر برگ بیش از ۱۵ عدد و فاصله خارها کمتر از ۵ سانتی متر.....	-۱۷b
۱۹	طول برگها بیش از سه متر و طول دمبرگ کمتر از ۷۵ سانتی متر.....	-۱۸a
۱- سعمران	طول برگها کمتر از سه متر و طول دمبرگ بیش از ۷۵ سانتی متر.....	-۱۸b
۱۸- عدیدی	تعداد خارها در هر برگ بیشتر از ۱۵ عدد.....	-۱۹a
۱۵- حلواوی	تعداد خارها در هر برگ کمتر از ۱۵ عدد.....	-۱۹b

نشده است و این تحقیق برای اولین بار الگویی را پیشنهاد می‌کند که همه علاوه‌مندان به شناسایی ارقام خرما در هر منطقه و کشور می‌توانند با استفاده از خصوصیات ظاهر نخل خرما اقدام به تهیه کلید شناسایی ارقام خرمای همان منطقه بنمایند. با جمع‌بندی و نتایج صفات بدست آمده برای ۲۰ رقم از ارقام خرمای شهرستان شادگان، دو کلید شناسایی، یکی بر مبنای خصوصیات میوه و دیگری بر مبنای خصوصیات برگ به شرح ذیل بدست آمد که قابل تعمیم در کلیه مناطق تولید خرما می‌باشد:

نتیجه‌گیری

نتیجه تحقیق انجام شده در خوزستان که با استفاده از اندازه‌گیری صفات مرغولوژیکی ارقام و مقایسه مشاهدات عینی محقق بدست آمده است، در آینده می‌تواند الگوی مناسبی برای مقایسه، شناسایی و معرفی ارقام خرما در مناطق تولید خرما در کشور باشد.

با استفاده از این کلید و روش شناسایی آن، می‌توان رقم‌های دیم خرمای مناطق خشک، بخصوص جنوب استان فارس (لامرد، گله‌دار، خنج، لار)، استان خراسان (طبس)، استان یزد (بافق)، استان اصفهان (خور و بیابانک) و خرمای آبی سایر مناطق تولید خرمای کشور را شناسایی و معرفی نمود.

از نتایج دیگر این تحقیق، شناسایی و معرفی موارد مصرف گوناگون ارقام خرما بر اساس بافت میوه آن می‌باشد. با تعیین ارقام خرمای خشک، نیمه‌خشک و تر، می‌توان مصارف خاص هر کدام را شناسایی و معرفی نمود. شناسایی رقم‌هایی که هسته آن براحتی از گوشت میوه جدا می‌شوند، می‌تواند برای تهیه خرمای بدون هسته (خمیر خرما و یا آرد خرما) مورد استفاده صنایع غذایی گوناگون قرار گیرد. در پایان پیشنهاد می‌گردد، با استفاده از این الگو و صفات بیان شده، کلیه ارقام خرما در هر منطقه از تولید آن در کشور در دستور کار بررسی و تحقیق قرار گیرد و مهمترین و اقتصادی‌ترین و مرغوب‌ترین ارقام خرمای هر منطقه شناسایی و معرفی شوند.

تعداد سنبله در هر رقم، وزن خوشه، طول دم خوشه، طول محورخوشه، طول خوشه، طول بزرگترین خوشه‌چه (بیرونی)، طول کوچکترین خوشه‌چه (داخلی)، تعداد خوشه‌چه، تعداد حبه روی هرخوشه‌چه و تعداد کل حبه روی هرخوشه.

۵- بررسی صفات کمی و کیفی میوه در مرحله خارک و رطب (۱، ۳). مهمترین صفات مورد ارزیابی عبارت بودند از: شکل میوه، بافت میوه، (تر، نیمه خشک و خشک)، رنگ سطح میوه، ضخامت پوست میوه، اندازه میوه (طول × عرض)، وزن حبه، وزن حبه بدون هسته، وزن هسته، نسبت گوشت میوه به هسته و درصد قند.

۶- بررسی صفات مرغولوژیکی هسته و کلاهک در مرحله خارک و رطب (۱، ۳). مهمترین صفات هسته که مورد ارزیابی قرار گرفت عبارت بودند از :

شکل هسته، رنگ هسته، میزان چسبندگی هسته به میوه، میزان چسبندگی هسته به لایه درون میوه، اندازه هسته (طول × عرض) و وزن هسته، صفات ارزیابی شده در مورد کلاهک نیز عبارتند بودند از :

شکل کلاهک، رنگ کلاهک، چسبندگی کلاهک به هسته، چسبندگی کلاهک به میوه و وزن کلاهک.

نتایج و بحث

با توجه به اهداف این تحقیق که ارایه یک روش جدید برای شناسایی ارقام خرما می‌باشد، کلیه صفات مورد نظر در قالب جدول‌های خاص تنظیم و با بررسی صفات ارزیابی شده و مقایسه هر کدام از صفات، درنهایت اقدام به تهیه یک کلید شناسایی خرما گردید. بررسی‌های انجام شده نشان دادند (۴) که گیاه شناسان برای شناسایی گیاهان مختلف، کلید شناسایی تا حد گونه فراهم نموده‌اند؛ اما در این تحقیق کلید شناسایی برای ارقام مختلف خرما برای گونه *Pheonix dactylifera* ارایه گردیده است.

تاکنون در هیچ منبعی شناسایی گیاهان تا حد رقم ارایه

مراجع مورد استفاده

- اعطاء، م. ۱۳۶۵. بررسی تغییرات فیزیکی و شیمیایی محصول نخل ارقام سعمران و زاهدی، اداره اصلاح و تهیه نهال و بذر خوزستان. اهواز.

REFERENCES

۲. اعطاء، م و شاکری، ف. ۱۳۶۷. بررسی مرغولوژی گل آذین نخل نر ارقام خوزستان و میزان گرددهایی. اداره اصلاح و تهیه نهال و بذر خوزستان. اهواز.
۳. دادگر، ع. ۱۳۶۷. شناسایی انگورهای منطقه ارومیه. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. تهران.
۴. رضوی، ف. ارزانی، ک، و ع. وزوایی. ۱۳۷۸. شناسایی ژئوتیپ‌های بومی به (L. *Cydonia oblonga*) در برخی از مناطق استان اصفهان. نشریه علمی، پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر. جلد ۱۵. شماره ۴. کرج.
۵. روحانی، الف. ۱۳۶۷. خرما. مرکز نشر دانشگاهی. تهران.
۶. صانعی شریعت‌بناهی، م. ۱۳۵۸. مرغولوژی و فیزیولوژی میوه. نشریه شماره ۱۷۰۴. دانشگاه تهران. تهران.
۷. کشاورزی سال ۲۰۰۰، ۱۳۶۸. سازمان خواروبار جهانی (F.A.O). مدیریت انتشارات و مطبوعات جهادسازندگی. چاپ اول. تهران.
۸. کاشانی، م. ۱۳۵۷. خلاصه تحقیقات خرما در ایران. وزارت کشاورزی. تهران.
۹. هاشم‌پور، م. ۱۳۷۰. شناسایی ارقام خرمای خوزستان (شادگان). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران. تهران.
۱۰. هاشم‌پور، م. ۱۳۷۸. گنجینه خرما. جلد اول. نشر آموزش کشاورزی. کرج.
۱۱. یزدان‌پناه، ن. و داوسن. وی. ان. دبلیو. ۱۳۴۳. خرما کاری در ایران و طرق کشت و اصلاح آن. مؤسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج.
12. Barreveld. W.H. 1993. Date palm products. F.A.O.
13. Carpenter. J.B. 1990. The date in orchard and Garden. India. California. U.S.A.
14. Dowson. V.N.W. 1982. Date production and protection with special reference to North Africa and the nerarease. F.A.O.
15. Dowson. V.N.W. 1962. Dates Handling Prose. F.A.O.
16. Hussain. A. 1974. Date palm and date with their pests in Iraq.
17. IEPGR. 1984. Banana. Descriptors. Rome.
18. IEPGR. 1986. Description oil palm. Rome.

Identification of Date Palm Cultivars in Khozestan Province (Shadegan)

M. HASHEMPOOR¹, M. SANEI SHARIAT PANAH²
AND M. H. DANESHVAR³

1, 3, Assistant Professors, Faculty of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz,
2, Emeritus Professor, Faculty of Agriculture, University of Tehran, Karaj, Iran

Accepted May. 14, 2003

SUMMARY

About 400-600 cultivars of date have been reported to be identified in Iran, but it is generally believed that most of them are synonyms. By determining the local cultivar characteristics, genetical sources may be conserved. On the other hand suitable genes such as those responsible for resistance to pests, soil salinity, drought and other environmental stresses may be found and transferred to those stocks of high quality. Cultivar identification, in fact, may help to select the best improved commercial dates. In this study, 20 cultivars from shadegan area were identified, all of which belonged to *phoenix dactylifera*. The studied characteristics were as fallows:

1. General cultivar characteristics.
2. Fruit characteristics.
3. Inflorescence characteristics.
4. Bunch characteristics.
5. Seed characteristics.
6. Cap characteristics.

Based upon the studied characteristics two identification keys (based on fruit and leaf characteristics) were presented and the following cutlivars identified:

1) SAAMARAN	2) GANTAR	3) HALLWI	4) KHAZRAVI
5)BRIAM	6) DAYRI	7) SHAKKAR	8) BARIH
9)HAMRAWY	10) ZAHIDI	11) CHACHAB	12) MASHIOUM
13)LILOEI	14) UOZI	15) FERSSI	16) KHASAB
17)HADAL	18) OVADI	19) ASHGAR	20) SOVAIDANI

Key words: Palm, Identification, Iran.