

اثر سولفات روی و غلظت روی بذر بر پاسخ‌های گیاه‌گندم در خاک آهکی

غلامرضا ثوابی فیروزآبادی^۱، محمد جعفر ملکوتی^۲ و محمد معز اردلان^۳

^{۱، ۳} استادیار و دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران، ^۲ استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

تاریخ پذیرش مقاله ۱۰/۱۰/۸۱

خلاصه

کمبود روی یک معضل تغذیه‌ای جهانی برای تولید محصول است و بویژه در غلات در حال رشد در خاکهای آهکی گسترش زیادی دارد. برای مطالعه اثرات سولفات روی و غلظت روی بذر بر پاسخ‌های گیاه‌گندم آزمایشی مزرعه‌ای در یک خاک آهکی دارای کمبود روی (Fine Loamy, Mixed Thermic, Xeric Haplocalcids) در منطقه کرج اجرا شد. در آزمایش فاکتوریل و طرح بلوكهای کامل تصادفی با سه تکرار بذور با روی کم و زیاد کشت و با سطوح صفر، ۵/۲ و ۱۰ کیلوگرم روی در هکتار کود دهنی شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که مصرف روی و غلظت روی بذر بطور معنی داری ($P < 0.01$) عملکرد، درصد پروتئین دانه، جذب کل روی و غلظت روی در دانه، آرد و سبوس را افزایش اما غلظت فسفر، آهن، منگنز، مس و نسبت فسفر به روی دانه را کاهش داد. همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که بخش عمدۀ عنصر معدنی در سبوس مرکز شده است. برای افزایش عملکرد و بالا بردن غلظت روی در دانه و جلوگیری از سوء تغذیه در جامعه، مصرف کود روی، کاشت بذور با غلظت روی زیاد و مصرف کود فسفری صرفا براساس آزمون خاک توصیه می‌شود.

واژه‌های کلیدی : عملکرد، پروتئین دانه، غلظت، جذب، روی

دچار اختلال می‌شوند. گیاهان در موقع کمبود تولید فیتوسیدروفور می‌کنند و از طریق ریشه دفع می‌نمایند و روی غیرقابل جذب را به قابل جذب تبدیل می‌کنند. این مواد اثر کلاتی دارند. گیاهان در شرایط کمبود روی در خاک از روی غیرقابل جذب نیز استفاده می‌کنند. نباتات مختلف و نیز ارقام مختلف در شدت تولید و ترشح فیتوسیدروفور متفاوت هستند. کمبود روی علاوه بر کاهش عملکرد و درصد پروتئین دانه، موجب افت ارزش تغذیه‌ای محصولات تولیدی شده و غلظت کم روی در گندم و نان تولیدی سبب بروز کمبود روی در انسان می‌شود. طبق گزارش ولچ و همکاران (۱۹۹۱)، حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان از کمبود عنصر کم مصرف بویژه روی در رنج می‌باشند. دلیل اصلی کمبود توأم آهن و روی در انسان یا کم خونی ایرانی^۱ مصرف زیاد غلات حاوی آهن و روی کم در جیره

مقدمه

کمبود عنصر کم مصرف در اراضی زیر کشت غلات گسترش جهانی داشته و میلیونها هکتار از اراضی قابل کشت در دنیا دارای کمبود یک یا چند عنصر غذایی کم مصرف هستند(۱۷). فائو در گزارشی جامع از ۳۰ کشور جهان که توسط سیلانپا (۱۶) تهیه شده اعلام نمود که بیش از ۳۰ درصد خاکهای این مناطق دچار کمبود روی هستند. در ایران نیز براساس بررسیهای انجام شده ۴۰ درصد از اراضی تحت کشت گندم آبی، دچار کمبود شدید روی می‌باشند(۱) روی یک عنصر ضروری کم مصرف برای انسان، دام و گیاه است و در بسیاری از سیستم‌های آنزیمی گیاه نقش کاتالیزوری فعال کننده و یا ساختمانی دارد. بر اثر کمبود روی گیاهان از نظر فاکتورهای تنظیم کننده رشد از جمله هورمون گیاهی اکسین

مواد و روشها

این بررسی در یک خاک آهکی منطقه کرج Fine Loamy, Mixed, Thermic Xeric Haplocalcids با مواد آبرفتی (رودخانه کرج) و در شرایط مزرعه به اجرا درآمد. خاک مزرعه دارای ۷/۵ درصد آهک، قابلیت هدایت الکتریکی ۱/۱ دسی زیمنس برمتر، واکنش گل اشیاع ۷/۷، کربن آلی ۰/۴۵ درصد، شن ۳۶/۸ درصد، سیلت ۳۴/۷ درصد، رس ۲۸/۵ درصد، فسفر قابل جذب برابر ۹/۵ میلی گرم در کیلوگرم، پتاسیم قابل جذب ۱۶۵ میلی گرم در کیلوگرم و آهن، منگنز، روی و مس قابل استخراج توسط عصاره گیر DTPA (۱۰) به ترتیب برابر ۳/۵، ۵/۸، ۰/۵۲ و ۰/۶۰ میلی گرم در کیلوگرم بود.

در آزمایش فاکتوریل و طرح بلوكهای کامل تصادفی با سه تکرار، تأثیر چهار سطح صفر، ۲/۵، ۵ و ۱۰ کیلوگرم روی خالص در هکتار از منبع سولفات روی و دو نوع بذر با میزان روی کم و زیاد بر پاسخهای گیاه گندم رقم مهدوی مورد بررسی قرار گرفت. سایر عناصر غذایی و کودهای شیمیایی با توجه به آزمون خاک مصرف شد عملیات کاشت، داشت و برداشت طبق معمول انجام گرفت بذور دارای میزان زیاد روی از مؤسسه تحقیقات خاک و آب واژ واز گندم برداشت شده از مزارع آزمایشی که در آنها کود سولفات روی برای افزایش غلظت روی مصرف شده بود تهیه گردید. این دو بذر از نظر سایر عناصر غذایی تفاوت معنی داری نداشتند. در جدول ۱ غلظت و میزان روی دو نوع بذر گزارش شده است.

جدول ۱- غلظت و میزان روی دو نوع بذر استفاده شده

میزان روی	غلظت روی (میلی گرم در کیلوگرم)	وضعیت روی (نانوگرم در هر بذر)
۲۵۴	۱۱	کم
۸۵۶	۴۶	زیاد

پس از رسیدن محصول در اوایل تیرماه برداشت از دو خط وسط پس از حذف یک متر از ابتدا و انتهای هر کرت صورت گرفت و عملکرد و اجزای عملکرد تعیین شد. نمونه های دانه، کاه، آرد و سبوس در هر تیمار و تکرار جداگانه آسیاب شده و از هر کدام یک گرم توزین و به روش خاکستر نمودن خشک در دمای ۵۵۰ درجه سانتی گراد کوره الکتریکی به مدت ۵ ساعت

غذایی است (۴). در بررسی انجام شده بر روی ۸۸۱ دانش آموز در مقاطع راهنمایی مدارس تهران مشخص شد که ۵۰ درصد آنها مبتلا به کمبود روی هستند (۳). طبق نظر مارشنر (۱۹۹۵) کمبود روی در انسان را می توان از طریق افزایش غلظت این عنصر در غلات برطرف کرد.

غلظت روی دانه علاوه بر افزایش ارزش تغذیه ای گندم تولیدی برای انسان می تواند موجب افزایش کمی و کیفی محصول بویژه در خاکهای با حاصلخیزی کم شود. در مرحله جوانه زنی باید ذخیره عناصر غذایی بذر بقدر کافی زیاد باشد تا بتواند رشد گیاهچه را تا زمانی که خود قادر به جذب عناصر غذایی شود تأمین نماید (۶، ۷، ۸). در گندم میزان روی و منگنز ذخیره شده در بذر تأثیر زیادی بر رشد و عملکرد گندم در خاکهای دچار کمبود دارد (۱۴). موسوی نیک و همکاران (۱۹۹۷) گزارش دادند که در شرایط کمبود منگنز میزان منگنز بذر مهمتر از کود دهی منگنز می باشد.

پولاند و همکاران (۱۹۸۹) اهمیت ذخیره فسفر بذر را در رشد اولیه گیاه و افزایش عملکرد گزارش نموده اند. موسوی نیک و همکاران (۱۹۹۸) گزارش دادند که حدود ۶۳ درصد ذخیره عناصر غذایی دانه گندم در پوسته، ۲۷ درصد در اندوسپرم و ۱۰ درصد در جنبین یا رویان وجود دارد. بنا به نظر رینگل و گراهام (۱۹۹۵) گیاهان رشد یافته از بذور با ذخیره عناصر غذایی بالاتر تولید گیاهچه های قوی تر کرده و حساسیت آنها به عوامل بیماری زای گیاهی نیز کاهش می یابد. با توجه به آهکی بودن خاکهای کشور و pH قلیابی، کمی مواد آلی و بیکربناته بودن آبهای آبیاری کمبود عناصر کم مصرف بویژه روی در خاکهای زیر کشت غلات مشکل جدی بوده و به نظر می رسد گیاهان رشد یافته از بذور دارای غلظت بالای عناصر غذایی بتوانند جذب روی بیشتری از خاک داشته، بازده کود روی مصرفی را نیز افزایش داده و در نتیجه علاوه بر افزایش عملکرد و درصد پروتئین دانه، غلظت روی در دانه های تولیدی را نیز افزایش دهند. این امر علاوه بر تأثیر مثبت در خودکفایی به بهبود سلامتی افراد جامعه نیز کمک می نماید. لذا این تحقیق به منظور بررسی تأثیر غلظت روی دانه بر پاسخهای گیاه گندم نسبت به مصرف سولفات روی دریک خاک آهکی به اجرا درآمد.

سنبله، تعداد سنبله در متر مربع، وزن هزار دانه، میزان کربوهیدرات، نشاسته، پروتئین وايندول استیک اسید (IAA) و به تأخیر انداختن پیری موجب افزایش عملکرد می‌شود بطوریکه یلماز و همکاران (۱۹۹۷) نشان دادند که مصرف روی موجب افزایش معنی داری در عملکرد دانه واجزاء عملکرد (تعداد سنبله در متر مربع ، تعداد دانه در سنبله و وزن هزار دانه) شد که از بین این اجزاء ، تأثیر مصرف روی بر تعداد سنبله در متر مربع شدیدتر بود این محققان نشان دادند که برای مصرف روی تعداد سنبله در متر مربع تا ۸۱ و وزن هزار دانه تا ۲۶ درصد افزایش یافت. رینگل و گراهام (۱۹۹۵) نیز نشان دادند که با مصرف کود روی وزن خشک دانه و کاه وکلشن افزایش یافت و بین ارقام گندم مورد استفاده تفاوت وجود داشت. گیاهان رشد یافته از بذور دارای غلظت روی زیاد نسبت به گیاهان رشد یافته از بذور با غلظت روی کم تعداد بیشتری دانه با وزن هزار دانه بیشتر تولید نمودند. در این بررسی برهمکنش مصرف کود روی و غلظت زیاد روی دانه در بازده کود روی مصرفی معنی دار شد. ودر گیاهان رشد یافته از بذر با غلظت روی کم در مقایسه با گیاهان رشد یافته از بذر با غلظت روی زیاد برای رسیدن به حداکثر شاخص برداشت میزان کود روی بیشتری مورد نیاز بود. همچنین گیاهان رشد یافته از بذر دارای روی زیاد در مقایسه با گیاهان رشد یافته از بذر دارای روی کم دارای بازده فیزیولوژیکی^۱ بالاتری بودند یلماز و همکاران (۱۹۹۸) تأثیر روی بذر را بر عملکرد و غلظت روی دانه گندم آبی و دیم در ترکیه بررسی نمودند و نتیجه گرفتند که در شرایط کمبود روی، غلظت زیاد روی بذر، رشد و عملکرد گندم را افزایش می دهد. در این بررسی افزایش عملکرد ناشی از کشت بذور با روی زیاد در شرایط آبی و دیم به ترتیب ۱۴ و ۱۸ درصد بود.

اثرات اصلی برهمکنش غلظت روی بذر و مصرف روی بر درصد پروتئین دانه نیز در سطح یک درصد معنی دار شد (جدول ۲). در این بررسی کاشت بذور با غلظت روی زیاد ۵/۱ درصد و مصرف ۱۰ کیلوگرم روی در هکتار ۸/۲ درصد میزان پروتئین دانه را نسبت به شاهد افزایش داد (جدول ۳). نقش روی در افزایش میزان پروتئین دانه توسط محققین متعددی گزارش شده است (۴، ۱۱) بطور کلی در شرایط کمبود روی فعالیت

خاکستر شد. عصاره‌گیری با اضافه کردن ۱۰ میلی لیتر اسید کلریدریک ۲ مولار به خاکستر بدست آمده و عبور دادن محلول از کاغذ صافی و اتمن ۴۲ انجام گرفت. در عصاره‌های بدست آمده عناصر روی ، آهن ، منگنز و مس با دستگاه جذب اتمی و فسفر به روش آمونیوم مولیبدات رنگ زرد اندازه گیری شد. نسبت فسفر به روی دانه از تقسیم غلظت فسفر به روی دانه بدست آمد. میزان جذب عناصر غذایی از حاصل ضرب غلظت در عملکرد SAS محاسبه شد. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با نرم افزار SAS انجام شد. مقایسه میانگین‌ها و گروه‌بندی‌ها از طریق آزمون دانکن و محاسبه LSD انجام پذیرفت.

نتایج و بحث

خاک مورد آزمایش خاکی آهکی و از نظر بافت متوسط و فاقد مشکل شوری و قلیائیت بوده وبا توجه به غلظت کم روی برای اجرای این آزمایش مناسب بود. دو نوع بذر انتخابی نیز از نظر غلظت روی چهار برابر و از نظر میزان روی حدود ۳/۵ برابر اختلاف داشتند (جدول ۱). اثرات اصلی و برهمکنش غلظت روی بذر و سولفات روی مصرفی بر عملکرد دانه در سطح یک درصد معنی دار شد (جدول ۲) میانگین عملکرد دانه در تیمار ۶۵۴۰ بذر با روی کم ۶۲۳۳ و در تیمار بذر با غلظت روی زیاد ۳۰۷ کیلو گرم یا ۴/۹۲ درصد افزایش کیلو گرم در هکتار بود که ۱۰ کیلو گرم در هکتار روی ، عملکرد دانه را ۷/۵ درصد افزایش داد اما با کاشت بذور با غلظت روی زیاد و مصرف ۱۰ کیلو گرم در هکتار روی عملکرد دانه ۸۳۷ کیلو گرم در هکتار یا ۱۳/۸۴ درصد نسبت به شاهد افزایش یافت (جدول ۳) که نشانگر برهمکنش مثبت غلظت روی بذر و سولفات روی مصرفی می باشد به عبارت دیگر غلظت روی بذر می تواند عکس العمل عملکرد گیاه نسبت به مصرف روی را افزایش دهد. نتایج رینگل و گراهام (۱۹۹۵) و موسوی نیک و همکاران (۱۹۹۷) نیز مؤید نتایج فوق می باشد. گیاهان رشد یافته از بذور با ذخیره عناصر غذایی بالاتر تولید گیاهچه‌های قوی‌تر کرده و حساسیت آنها به عوامل بیماری زای گیاهی نیز کاهش می‌یابد همچنین با گسترش سیستم ریشه حجم خاک در دسترس ریشه برای جذب آب و عناصر غذایی افزایش می‌یابد. بطور کلی مصرف کود روی از طریق افزایش تعداد دانه در

جدول ۲- مقادیر F تجزیه واریانس صفات اندازه گیری شده در رفتارهای مورد آزمون

F محاسبه شده												منابع تغییر Sov
مس دانه	منگز دانه	آهن دانه	فسفر به روی	روی دانه	فسفر دانه	پروتئین دانه	عملکرد دانه	درجه آزادی	منابع تغییر			
۱/۵۷ns	۱/۷۳ns	+/۱۲ns	۱/۸۴ns	+/۰۱ns	۲/۱۹ns	۲/۰۷ns	+/۰۲ns	+/۴۰ns	۲	تکرار		
۳/۱۱ns	۲/۲۷ns	۳۴/۱۸**	۶۲/۰۷**	۲۰/۱۴۳**	۱۵۲۴/۵۵**	۱۱/۳۴**	۱۴۷۶/۷۷**	۷۸۹/۶۵**	۱	بذر		
۱۰/۱۱**	۲۶۱/۲۹**	۷۲/۶۱**	۸۰/۸۱**	۱۵۲۰/۷۲**	۸۰/۴۲/۱۱**	۱۱۲/۳۸**	۶۹۱/۲۳**	۳۳۱/۷۶**	۳	روی		
+/۰۷ns	۳/۷۳*	۱/۹۶ns	+/۳۲ns	۱۲/۹۶**	۲۸/۹۷**	+/۹۸ns	۱۲۰/۹۷**	۴۸/۰۹**	۳	بذر × روی		
منابع تغییر Sov	منگز سبوس	منگز آرد	مس سبوس	آهن آرد	آهن سبوس	روی آرد	روی سبوس	روی آرد	فسفر آرد	درجه آزادی	منابع تغییر	
۰/۵۷ns	+/۵۴ns	۱/۳۷ns	۲/۲۴ns	۴/۹۷ns	+/۲۳ns	۱/۰۰ns	+/۱۳ns	+/۷۸ns	۲	تکرار		
۳/۰۴ns	+/۰۱ns	+/۰۷ns	+/۳۹ns	۵/۸۴*	+/۰۱	۲/۲۵ns	۹/۱۰**	۳/۱۱*	۱	بذر		
۱۰/۸/۲۲**	۹۷/۱۶**	۶۱/۸۲**	۴۳/۷۵**	۲۳۱/۰۰**	۹۷/۱۶**	۴۳۷/۴۲**	۱۶۵۳**	۱۰/۱۱**	۳	روی		
+/۵۱ns	+/۱۶ns	۱/۴۶ns	+/۱۳ns	+/۰۸۲ns	+/۰۱۶ns	۱/۴۲ns	+/۰۴۹ns	+/۰۵۲ns	۳	بذر × روی		
ns : غیر معنی دار												* و ** به ترتیب معنی دار در سطح یک و پنج درصد

* جدول ۳- اثرات غلظت روی بذر و مصرف روی (کیلوگرم در هکتار) پر عملکرد و درصد پرتوئین دانه

میانگین	۱۰	۵	۲/۵	.	بذر / روی
عملکرد دانه (کیلوگرم در هکتار)					
۶۲۳۳B	۶۲۶۵dc	۶۳۰۴de	۶۲۱۸f	۶۰۴۶g	غلظت کم
۶۵۴۰A	۶۸۸۳a	۶۶۱۱b	۶۳۹۰c	۶۲۷۶ef	غلظت زیاد
۶۳۵۸	۶۶۲۴A	۶۴۵۷B	۶۳۰۴C	۶۱۶۲D	میانگین
۶۵/۰۶ = بذر × روی		۳۲/۵۳ = بذر		۴۶ = روی	LSD٪/۱
درصد پروتئین دانه					
۱۲/۷۳B	۱۳/۱۰c	۱۲/۸۶d	۱۲/۶۸e	۱۲/۳۸f	غلظت کم
۱۳/۳۸A	۱۴/۱۷a	۱۳/۵۲b	۱۳/۰۸c	۱۲/۷۹e	غلظت زیاد
۱۳/۰۵	۱۳/۵۹A	۱۳/۱۹B	۱۲/۸۸C	۱۲/۵۶D	میانگین
۰/۱۰ = بذر × روی		۰/۷۰ = بذر		۰/۰۷ = روی	LSD٪/۱
جذب کل روی (گرم در هکتار)					
۴۶۸/۳۷B	۵۸۳/۱۸c	۵۴۳/۳۶d	۴۵۷/۰۵f	۲۸۹/۹۰h	غلظت کم
۵۴۰/۵۱A	۶۹۱/۳۵a	۶۲۹/۰۰b	۵۰۶/۰۵e	۳۳۵/۶۴g	غلظت زیاد
۵۰۴/۴۴	۶۳۷/۲۷A	۵۸۶/۱۸B	۴۸۱/۵۵C	۳۱۲/۷۶D	میانگین
۸/۶۵۸ = بذر × روی		۴/۳۲۸ = بذر		۶/۱۲۲ = روی	LSD٪/۱

* میانگین‌های دارای حداقل یک حرف بزرگ لاتین مشابه در ردیف یا ستون و حرف کوچک در متن جدول فاقد اختلاف معنی‌دار در سطح یک درصد می‌باشند.

موجب ۱۱/۵۳ درصد افزایش در غلظت روی دانه شد و تیمار ۱۰ کیلوگرم در هکتار روی غلظت روی دانه را ۸۴/۷ درصد افزایش داد و این امر نشان می دهد که با کاشت بذور با غلظت روی زیاد و مصرف کود سولفات روی می توان غلظت روی دانه را افزایش داد و درنتیجه ارزش تغذیه ای گندمهای تولیدی را برای استفاده انسان بالا ب دارد . علاوه بر آن گندمهای، با غلظت دوی، زیاد که دارد

آنژیم RNA پلیمراز و انتقال اسیدهای آمینه به دانه کاهش یافته و فعالیت آنژیم RNA آز و تجزیه و تخریب RNA افزایش در نتیجه سنتز پروتئین شدیداً کاهش می‌یابد. همچنین روی از اجزاء ضروری ساختمانی ریبوزوم‌ها می‌باشد. اثرات اصلی و برهmekنش غلظت روی بذر و روی مصرفی برغلاظت روی دانه در سطح یک دصد معنی دارشد (حدو، ۲). تماماً غلظت روی بذر،

است (۱۱). مقدار روی در محلول خاک به ویژه با حضور کربنات کلسیم و pH بالا بسیار ناچیز است (3×10^{-7} مول در لیتر). حداکثر جذب روی در گیاه در غلظت $10^{-6} \times 2/5$ مول در لیتر روی در محلول صورت می‌گیرد و حداکثر عملکرد نیز با جذب ۲۰ نانوگرم روی در گرم وزن تر ریشه در روز مشاهده شد (۴). رینگل و گراهام (۱۹۹۵) در بررسی خود شدت جذب خالص روی در گیاهان بدون مصرف کود روی، چهار میکروگرم بر گرم وزن خشک ریشه بدست آوردن و با مصرف کود روی شدت جذب سه برابر شد. طبق نظر این محققین مقدار فوق برای رسیدن به عملکرد نزدیک به ماکریزیم، حداقل در گیاهان رشد یافته از بذور با غلظت روی زیاد کافی می‌باشد. اثرات اصلی غلظت روی بذر و مصرف کود سولفات روی بر غلظت فسفر دانه در سطح یک درصد معنی دارشد ولی بر همکنش آنها اختلاف معنی‌داری را نشان نداد (جدول ۲). با مصرف روی غلظت فسفر دانه از $0/44$ درصد در $Zn_{0.38}$ به $0/38$ درصد در $Zn_{0.2}$ کاهش یافت (جدول ۴) که نشانگر بر همکنش فسفر و روی در گیاه می‌باشد. بر همکنش فسفر و روی یکی از شناخته شده‌ترین و مؤثرترین بر همکنش‌های عناصر غذایی است که در کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی و تولیدات باغی دارای اهمیت بسزایی می‌باشد. این بر همکنش در خاک، مرحله جذب، انتقال و یا استفاده فیزیولوژیکی در گیاه می‌باشد و مکانیسم‌های متعددی در خصوص این بر همکنش عنوان گردیده است (۴، ۱۱).

نسبت فسفر به روی در دانه نیز تحت تأثیر معنی دار اثرات اصلی و بر همکنش غلظت روی بذر و مصرف کود سولفات روی Zn_0 قرار گرفت (جدول ۲). نسبت فسفر به روی از $150/41$ در $Zn_{0.41}$ به $468/37$ در $Zn_{0.38}$ رسید (جدول ۴). این مقدار کاهش در نسبت فسفر به روی دانه می‌تواند بدليل افزایش غلظت روی دانه بر اثر مصرف کود سولفات روی و همچنین کاهش غلظت فسفر دانه در نتیجه بر همکنش منفی فسفر و روی باشد. نسبت فسفر به روی همبستگی بالایی با نسبت اسید فیتیک به روی دانه دارد که از نظر جذب روی توسط انسان عامل بسیار مهمی است نسبت فسفر به روی در ارزیابی وضعیت تغذیه‌ای روی گیاه مناسب‌تر از غلظت روی می‌باشد. مینگ و چانگرین (۱۹۹۵) نسبت متعادل فسفر به روی دانه گندم را برابر 50 گزارش نموده‌اند. اثرات اصلی غلظت روی بذر و مصرف کود سولفات

کشت بعدی به عنوان بذر استفاده می‌شوند می‌توانند اثرات مثبتی در رشد و عملکرد داشته باشند. نتایج بدست آمده با یافته‌های رینگل و گراهام (۱۹۹۵) مطابقت دارد. چاک ماک و همکاران (۱۹۹۷)، یلماز و همکاران (۱۹۹۷) و ملکوتی و لطفاللهی (۱۳۷۸) نیز افزایش غلظت روی دانه بر اثر مصرف کود روی گزارش نموده‌اند. یلماز و همکاران (۱۹۹۷) با استفاده از روش‌های مختلف مصرف سولفات روی در ارقام مختلف گندم نتیجه گرفتند که مصرف سولفات روی نه تنها عملکرده را به طور قابل توجهی افزایش داد بلکه غلظت این عنصر در دانه گندم نیز زیاد شد. موسوی نیک و همکاران (۱۹۹۷) مشاهده نمودند که با مصرف کودهای سولفات روی و سولفات منگنز علاوه بر افزایش تولید و غنی‌سازی بذور گندم به علت ذخیره سازی عناصر غذایی از ریشه‌دهی بیشتری برخوردار می‌شوند. اگر تغذیه برگی در زمان گل دهی انجام گیرد و قوع حالت فوق حتمی است. طبق گزارش این محققین 20 درصد از مقدار روی دانه در رویان، 23 درصد در آندوسپیرم و 57 درصد در پوسته می‌باشد. در مقایسه با سایر عناصر غذایی درصد بالاتری از کل روی و منگنز دانه در رویان موجود است (20 و 17 درصد کل) مقدار بالای روی و منگنز در بذر مانند یک کود شروع کننده عمل می‌کند و بذور با ذخیره روی و منگنز بیشتردارای قدرت جوانه زنی بهتری هستند. اثرات اصلی و بر همکنش غلظت روی بذر و مصرف سولفات روی بر جذب کل روی در سطح یک درصد معنی‌دار شد (جدول ۲). جذب کل روی در تیمار بذر با غلظت روی کم $468/37$ و در تیمار بذر با غلظت روی زیاد به $540/51$ گرم در هکتار رسید و $72/14$ گرم در هکتار یا $15/4$ درصد افزایش در جذب کل روی حاصل شد. بیشترین میزان جذب روی توسط گیاه ($691/35$ گرم در هکتار) در تیمار بذر با غلظت روی زیاد و مصرف 10 کیلوگرم در هکتار روی مشاهده شد (جدول ۳) که نسبت به تیمار شاهد 138 درصد افزایش نشان می‌دهد. ضیائیان و ملکوتی (۱۳۷۸) نیز گزارش دادند که مصرف روی موجب 112 درصد افزایش در جذب کل روی و 153 درصد افزایش جذب روی توسط دانه گندم در شرایط گلخانه شد. این اختلاف می‌تواند ناشی از تفاوت در خصوصیات خاک، نوع رقم و شرایط آزمایش باشد. روی به صورت $ZnO^{+}H$ و Zn^{++} در خاکهای قلیایی جذب می‌شود و جذب آن به صورت فعال

جدول ۴ - اثرات غلظت روی بذر و مصرف روی (کیلوگرم در هکتار) بر غلظت عناصر غذایی و نسبت فسفر بر روی دانه

میانگین	۱۰	۵	۲/۵	.	بذر / روی
غلظت فسفر دانه (درصد)					
۰/۴۱۷A	۰/۳۸۶e	۰/۴۱۱cd	۰/۴۲۵bc	۰/۴۴۶a	غلظت کم
۰/۴۰۹B	۰/۳۷۴e	۰/۴۰۳d	۰/۴۲۳bc	۰/۴۳۶ab	غلظت زیاد
۰/۴۱۳	۰/۳۸D	۰/۴۰۷C	۰/۴۲۴B	۰/۴۴۱A	میانگین
	=۰/۰۱۴ بذر × روی	=۰/۰۰۷ بذر	=۰/۰۱۰ روی		LSD٪/۱
غلظت روی دانه (میلی گرم در کیلوگرم)					
۴۱/۹۸B	۵۱/۳۰c	۴۸/۲۵d	۴۰/۷۵f	۲۷/۶۲h	غلظت کم
۴۶/۸۲A	۵۷/۷۲a	۵۳/۷۲b	۴۴/۴۲e	۳۱/۴۲g	غلظت زیاد
۴۴/۴۰	۵۴/۵۱A	۵۰/۹۸B	۴۲/۵۸C	۲۹/۵۲۵	میانگین
	=۰/۰۷۴ بذر × روی	=۰/۰۵۲ بذر	=۰/۰۳۷ روی		LSD٪/۱
غلظت آهن دانه (میلی گرم در کیلوگرم)					
۶۰/۰۲A	۵۷/۳۳d	۵۹/۱۰c	۶۱/۱۶ab	۶۲/۵۰a	غلظت کم
۵۸/۰۵B	۵۵/۲۳e	۵۷/۴۰d	۵۹/۴۰c	۶۰/۲۰bc	غلظت زیاد
۵۹/۰۳	۵۶/۲۸D	۵۸/۲۵C	۶۰/۲۸B	۶۱/۳۵A	میانگین
	=۱/۰۴۸ بذر × روی	=۰/۰۷۴ بذر	=۰/۰۱۰ روی		LSD٪/۱
غلظت منگنز دانه (میلی گرم در کیلوگرم)					
۴۳/۶۰A	۴۱/۶۰d	۴۲/۹۰cd	۴۴/۳۳b	۴۵/۵۶a	غلظت کم
۴۲/۲۵B	۳۹/۳۳e	۴۱/۸۳d	۴۲/۵۳bc	۴۴/۳۲ab	غلظت زیاد
۴۲/۹۲	۴۰/۰۶D	۴۲/۳۶C	۴۳/۹۳B	۴۴/۹۵A	میانگین
	=۱/۰۳۶ بذر × روی	=۰/۰۶۸ بذر	=۰/۰۹۶ روی		LSD٪/۱
غلظت مس دانه (میلی گرم در کیلوگرم)					
۷/۳۵A	۷/۲۰c	۷/۳۰bc	۷/۴۳ab	۷/۴۶a	غلظت کم
۷/۳۰A	۷/۰۰d	۷/۳۰bc	۷/۴۳ab	۷/۵۰a	غلظت زیاد
۷/۳۳	۷/۱۰C	۷/۳۰B	۷/۴۳B	۷/۴۸A	میانگین
	=۰/۰۱۶ بذر × روی	=۰/۰۸ بذر	=۰/۰۱۲ روی		LSD٪/۱
نسبت فسفر به روی دانه (P/Zn)					
۱۰/۶۶۲A	۷۵/۳۳f	۸۵/۱۶e	۱۰۴/۱۶c	۱۶۱/۸۳a	غلظت کم
۹۳/۶۲B	۶۴/۶۰g	۷۵/۵۰f	۹۵/۳۳d	۱۳۹/۰۰b	غلظت زیاد
۱۰۰/۱۲	۷۰/۰۰D	۸۰/۳۲C	۹۹/۷۵B	۱۵۰/۴۱A	میانگین
	=۰/۰۴۵ بذر × روی	=۲/۷۳ بذر	=۳/۸۵ روی		LSD٪/۱

* میانگین های دارای حداقل یک حرف بزرگ لاتین مشابه در ردیف یا ستون و حروف کوچک در متن جدول فاقد اختلاف معنی دار درسطح یک درصد می باشند.

برغلظت فسفر سبوس و برهمنکنش آن باکود سولفات روی مصرفی معنی دارنشد (جدول ۲) غلظت فسفر آرد و سبوس در Zn_{۰/۱۳} و ۶۵/۰ درصد و در Zn_{۰/۱۱} و ۵۸/۰ درصد برابر رسید. ملکوتی و همکاران (۱۳۷۸) نیز نتایج مشابهی گزارش نموده‌اند. غلظت روی بذر و برهمنکنش غلظت روی بذر و مصرف کود سولفات روی برغلظت روی آرد و سبوس اثر معنی‌داری نداشت و فقط تأثیر مصرف کود روی برغلظت روی آرد و سبوس میانگین غلظت روی درآرد و سبوس درسطح یک درصد معنی دارد (جدول ۲) میانگین ۱۰/۴۳ و Zn_۰ به ترتیب ۱۰/۴۳ و ۳۵/۷۳ میلی گرم و در ۲/۰/۵ برابر ۱۲/۰/۵ و ۶۵/۴۳ میلی گرم در کیلوگرم بود به عبارت دیگر با مصرف ۱۰ کیلوگرم روی در هکتار، غلظت روی آرد ۱۵/۵۳ درصد و غلظت روی سبوس ۸۳/۱۲ درصد افزایش یافت. اثرات اصلی غلظت روی بذر و مصرف روی برغلظت آهن آرد و اثر اصلی کود سولفات روی بذر و غلظت آهن سبوس درسطح یک درصد معنی دارد و برهمنکنش آنها معنی دارند (جدول ۲). میانگین غلظت آهن در آرد و سبوس به ترتیب ۱۸/۶۹ و ۸۷/۷۳ میلی گرم در کیلوگرم اندازه‌گیری شد. با مصرف روی غلظت آهن درآرد و سبوس، کاهش یافت (جدول ۶). موسوی نیک و همکاران (۱۹۹۸) اثرات مصرف کود سولفات روی و غلظت روی بذر بر تجمع عناصر غذایی در دانه در جدول ۵ آورده شده است. با توجه به داده‌های جدول مشخص می‌شود که تیمار ۲/۵ کیلوگرم در هکتار روی نه تنها موجب کاهش برداشت فسفر توسط دانه نشده است بلکه به دلیل افزایش عملکرد دانه ناشی از مصرف روی برداشت فسفر نیز افزایش یافته ولی در تیمار ۱۰ کیلوگرم روی در هکتار برداشت فسفر کاهش یافته که می‌تواند ناشی از کاهش غلظت فسفر در گیاه براثر مصرف روی باشد که مکانیسم‌های مختلفی می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. همانطوریکه نتایج نشان می‌دهد بیشترین برداشت روی از مصرف ۱۰ کیلوگرم روی و کاهش بذر با روی زیاد حاصل شده است. این امر می‌تواند از نظر تأمین سلامتی افراد جامعه تأثیر زیادی داشته باشد.

اثرات اصلی مصرف کود سولفات روی درسطح یک درصد برغلظت فسفر آرد و سبوس معنی دارد. اما تأثیر غلظت روی بذر درسطح پنج درصد برغلظت فسفر آرد معنی دارد و اثر آن اثر اصلی مصرف کود سولفات روی برغلظت مس دانه درسطح یک درصد و برهمنکنش غلظت روی بذر و کود روی مصرفی دردانه گندم گزارش نموده است. اثرات اصلی غلظت روی بذر و مصرف کود سولفات روی برغلظت منگنز دانه درسطح یک درصد معنی دارد. اما برهمنکنش آنها تأثیر معنی‌داری نداشت. دردانه گندم گزارش نموده است. اثرات اصلی غلظت روی بذر و مصرف کود سولفات روی برغلظت مس دانه درسطح یک درصد و برهمنکنش غلظت روی بذر و کود روی مصرفی درسطح پنج درصد معنی‌دارد (جدول ۲). رینگل و همکاران (۱۹۹۵) نیز دربررسی خود نشان دادند که با مصرف کود روی، غلظت عناصر غذایی از جمله آهن، منگنز، روی و مس در دانه کاهش یافت. این محققین، علت اصلی این کاهش را اثر رقت می‌دانند نه رقابت در جذب ولی به نظر می‌رسد که دربرهمکنش منفی این عناصر مکانیسم‌های متعددی از جمله رقابت در جذب، انتقال و استفاده فیزیولوژیکی در گیاه و همچنین اثر رقت مؤثر باشد که بسته به شرایط خاک و گیاه ممکن است تأثیر یکی از این عوامل شدت بیشتری داشته باشد.

اثرات اصلی مصرف کود سولفات روی و غلظت روی بذر بر تجمع عناصر غذایی در دانه در جدول ۵ آورده شده است. با توجه به داده‌های جدول مشخص می‌شود که تیمار ۲/۵ کیلوگرم در هکتار روی نه تنها موجب کاهش برداشت فسفر توسط دانه نشده است بلکه به دلیل افزایش عملکرد دانه ناشی از مصرف روی برداشت فسفر نیز افزایش یافته ولی در تیمار ۱۰ کیلوگرم روی در هکتار برداشت فسفر کاهش یافته که می‌تواند ناشی از کاهش غلظت فسفر در گیاه براثر مصرف روی باشد که مکانیسم‌های مختلفی می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد. همانطوریکه نتایج نشان می‌دهد بیشترین برداشت روی از مصرف ۱۰ کیلوگرم روی و کاهش بذر با روی زیاد حاصل شده است. این امر می‌تواند از نظر تأمین سلامتی افراد جامعه تأثیر زیادی داشته باشد.

اثرات اصلی مصرف کود سولفات روی درسطح یک درصد برغلظت فسفر آرد و سبوس معنی دارد. اما تأثیر غلظت روی بذر درسطح پنج درصد برغلظت فسفر آرد معنی دارد و اثر آن

جدول ۵ - اثرات غلظت روی بذر و مصرف روی (کیلوگرم در هکتار) بر برداشت عناصر غذایی توسط دانه *

میانگین	۱۰	۵	۲/۵	.	بذر / روی
برداشت فسفر (کیلوگرم در هکتار)					
۲۶/۱۳A	۲۴/۶۱C	۲۵/۹۴abc	۲۷/۰۰ab	۲۶/۶۶ab	غلظت کم
۲۶/۷۰A	۲۵/۷۰C	۲۶/۶۶ab	۲۷/۰۵ab	۲۷/۳۸a	غلظت زیاد
۲۶/۴۱	۲۵/۱۵B	۲۶/۳۰A	۲۷/۰۲A	۲۷/۱۹A	میانگین
	=۱/۵۰۰ بذر × روی	=۰/۷۵ بذر		=۱/۰۵۹ روی	LSD٪/۱
برداشت روی (گرم در هکتار)					
۲۶۲/۷۶B	۳۲۶/۵۲C	۳۰/۴/۱۳d	۲۵۳/۳۹f	۱۷۰/۰۰h	غلظت کم
۳۰۸/۳۶	۳۹۷/۲۷a	۳۵۵/۱۵b	۲۸۳/۸۲e	۱۹۷/۲۰g	غلظت زیاد
۲۸۵/۵۶	۳۶۱/۸۹A	۳۲۹/۶۴B	۲۶۸/۶۰C	۱۸۲/۱۰D	میانگین
	=۵/۵۴ بذر × روی	=۲/۷۷ بذر		=۳/۹۱ روی	LSD٪/۱
برداشت آهن (گرم در هکتار)					
۳۷۳/۹۳B	۳۶۴/۹۲b	۳۷۲/۵۲b	۳۸۰/۳۶a	۳۷۷/۹۱a	غلظت کم
۳۷۹/۲۸A	۳۸۰/۱۹a	۳۷۹/۵۱a	۳۷۹/۵۶a	۳۷۷/۸۵a	غلظت زیاد
۳۷۶/۶۰	۳۷۲/۵۶A	۳۷۶/۰۱A	۳۷۹/۹۶A	۳۷۷/۸۸A	میانگین
	=۱۰/۵۸ بذر × روی	=۵/۳۰ بذر		=۷/۸۳ روی	LSD٪/۱
برداشت منگنز (گرم در هکتار)					
۲۷۶/۰۱A	۲۶۴/۷۸b	۲۷۰/۴۱ab	۲۷۵/۶۷a	۲۷۵/۵۲a	غلظت کم
۲۷۱/۵۹B	۲۷۰/۷۳ab	۲۷۶/۵۶a	۲۷۸/۱۶a	۲۷۸/۲۷a	غلظت زیاد
۲۷۳/۸۰	۲۶۷/۷۵B	۲۷۳/۴۹A	۲۷۷/۰۷A	۲۷۶/۸۹A	میانگین
	=۸/۰۴ بذر × روی	=۳/۹۷ بذر		=۵/۶۲ روی	LSD٪/۱
برداشت مس (گرم در هکتار)					
۴۵/۸۰B	۴۵/۸۲cd	۴۶/۰۱cd	۴۶/۲۲cd	۴۵/۱۴d	غلظت کم
۴۷/۶۷A	۴۸/۱۸a	۴۸/۲۶a	۴۷/۵۰ab	۴۶/۷۴bc	غلظت زیاد
۴۶/۷۲	۴۷/۰۵A	۴۷/۱۳A	۴۶/۸۶AB	۴۵/۹۴B	میانگین
	=۱/۳۶ بذر × روی	=۰/۶۸ بذر		=۰/۹۶۰ روی	LSD٪/۱

* میانگین های دارای حداقل یک حرف بزرگ لاتین مشابه در ردیف یا ستون و حروف کوچک در متن جدول فاقد اختلاف معنی دار درسطح یک درصد می باشند.

می یابند و در هنگام تهیه آرد در گندمهای دانه نرم این لایه از سبوس جدا نمی شود و همراه با سبوس از آرد جدا می گردد لذا توصیه می شود سبوس چنین گندمهایی با دستگاه سبوس تمیز کن جدعا هم زدن سبوس آرد چسبیده به آن نیز که دارای عناصر معدنی بالایی است پس از جدا سازی به آرد به دست آمده اضافه شود. اضافه کردن خود سبوس به دلیل اسید فیتیک بالا مانع جذب عناصر غذایی موجود در نان مصرفی وسایر اجزاء جیره غذایی در انسان می شود. همچنین با مصرف

وجود دارد. همانطوری که نتایج نشان می دهند بخش اعظم عناصر غذایی دانه در سبوس تجمع یافته و متأسفانه بدلیل آنکه در هنگام تهیه آرد، سبوس جداسازی شده و برای مصارف دیگر مورد مصرف قرار می گیرد این عمل موجب می شود بخش عمده عناصر غذایی دانه از دسترس مصرف انسان در نان تهیه شده خارج شود و عارضه کمبود عناصر مغذی در انسان همچنان مشکل آفرین باشد. البته با توجه به اینکه بیشترین مقدار عناصر معدنی در بیرونی ترین لایه اندوسپرم یعنی لایه آرلون تجمع

جدول ۶ - اثرات مصرف روی بر غلظت عناصر غذایی آرد و سبوس

آرد

روی مصرفی (کیلوگرم در هکتار)	فسفر (درصد)	روی	آهن (میلی گرم در کیلوگرم)	منگنز (میلی گرم در کیلوگرم)	مس
.	۰/۱۲A	۱۰/۴۳D	۲۰/۱۰A	۷/۳۶A	۲/۹۳A
۲/۵	۰/۱۱B	۱۱/۳۶C	۱۹/۰۰B	۷/۱۵B	۲/۸۳B
۵	۰/۱۰C	۱۱/۷۱B	۱۸/۳۰C	۶/۹۶C	۲/۶۵C
۱۰	۰/۰۹D	۱۲/۰۵A	۱۷/۳۶D	۶/۷۶D	۲/۴۸D
میانگین	۰/۱۱	۱۱/۳۸	۱۸/۶۹	۷/۰۶	۲/۷۲
LSD٪۱	۰/۰۰۸	۰/۱۴۰	۰/۳۱۹	۰/۱۹۴	۰/۰۸۰

سبوس

فسفر (درصد)	روی (میلی گرم در کیلوگرم)	آهن (میلی گرم در کیلوگرم)	منگنز (میلی گرم در کیلوگرم)	مس
.	۰/۶۵A	۳۵/۷۳D	۹۰/۱۰A	۷۲/۰۸A
۲/۵	۰/۶۵A	۵۲/۵۳C	۸۸/۵۸B	۷۱/۰۰B
۵	۰/۶۱B	۵۹/۱۶B	۸۷/۰۰C	۷۰/۵۸B
۱۰	۰/۵۸C	۶۵/۴۳A	۸۵/۲۶D	۷۰/۰۰C
میانگین	۰/۶۲	۵۳/۲۱	۸۷/۷۳	۷۰/۹۱
LSD٪۱	۰/۰۱۰	۰/۴۱۸	۰/۸۸۷	۰/۵۵۹
۰/۰۹۵				

* میانگین های دارای حداقل یک حرف لاتین مشابه در هر ستون فاقد اختلاف معنی دار در سطح یک درصد می باشند.

بیش از ۲۵ باشد جذب روی و سایر عناصر موجود در جیره غذایی انسان توسط بدن کاهش می یابد. اسید فیتیک ($\text{C}_6\text{H}_{۱۸}\text{O}_{۲۴}\text{P}_۲$) فرم ذخیره‌ای فسفر آلی دردانه است که عوامل گیاهی و محیطی از جمله تغذیه گیاه می‌تواند برمقدار آن مؤثر باشد و بعضی از ارقام گیاهی غلات و حبوبات دارای پتانسیل تجمع کمتر این ماده می‌باشند. بنابراین با بهره‌گیری از روش‌های نوین بیوتکنولوژی و مهندسی ژنتیک می‌توان ارقامی را که دارای

متداول کود به ویژه مصرف کودهای فسفری براساس آزمون خاک ومصرف سولفات روی می توان با کاهش میزان اسید فیتیک دانه و افزایش غلظت روی دانه نسبت اسید فیتیک به روی (PA/Zn) را کاهش داد و این طریق به سلامتی افراد جامعه کمک نمود . نسبت PA/Zn پارامتری است که برای ارزیابی قابلیت استفاده عناصر معدنی موجود در مواد غذایی مورد استفاده برای انسان کاربرد دارد. به طوری که اگر این نسبت

های توصیه کودی و مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه بطور ویژه به این عنصر غذایی مهم توجه شود تا علاوه برافزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصول در راستای تأمین نیازهای غذایی و ارتقای سلامتی افراد جامعه، بتوان با افزایش غلظت روی در دانه‌های تولیدی و کاشت آنها محصولی بیشتر با کیفیت بهتر برداشت نمود.

پتانسیل تجمع کمتر اسید فیتیک دردانه می‌باشد و دارای سایر خصوصیات مناسب نیز هستند معرفی نمود. بدیهی است نقش تغذیه متعادل گیاه نیز نباید نادیده انگاشت.

بطور کلی با توجه به اثرات مثبت مصرف کود سولفات روی درافزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و با توجه به کمبود گسترده روی در اراضی کشاورزی کشور ضروری است در برنامه

REFERENCES

مراجع مورد استفاده

۱. بلالی، م. ر. ملکوتی، م. ج. مشایخی ح. ح. و ز. خادمی. ۱۳۷۸. اثر عناصر ریز مغذی برافزایش عملکرد و تعیین حد بحرانی آنها در خاکهای تحت کشت گندم آبی ایران. مجله خاک و آب، ویژه نامه گندم، ج ۱۲، ش ۶، ص ۱۱۹-۱۱۱، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، تهران، ایران.
۲. ضیائیان، ع. ح. و م. ج. ملکوتی. ۱۳۷۸. تأثیر مصرف روی بر رشد و عملکرد گندم در تعدادی از خاکهای شدیداً آهکی استان فارس. مجله خاک و آب، ویژه نامه گندم، ج ۱۲، ش ۶، ص ۹۹-۱۱۰. مؤسسه تحقیقات خاک و آب، تهران، ایران.
۳. محمودی، م. کیمیاگر، م. ولای، ن. و م. غفارپور. ۱۳۷۸. بررسی اپیدمیولوژی کمبود روی در دانش آموزان مدارس راهنمایی شهر تهران سال ۱۳۷۶. پنجمین کنگره تغذیه ایران. امنیت غذا و تغذیه خانوار، تهران، ایران.
۴. ملکوتی، م. ج. و م. لطف الهی. ۱۳۷۸. نقش روی درافزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و بهبود سلامتی جامعه. سازمان تات وزارت کشاورزی، کرج، ایران.
۵. ملکوتی، م. ج. ثوابقی. غ. ر. و م. ر. بلالی. ۱۳۷۸. بررسی اثرات عناصر ریز مغذی در غنی سازی آرد و سبوس گندم و کاهش اسید فیتیک به منظور ارتقاء سلامتی جامعه (قسمت سوم). مجله خاک و آب، ویژه نامه گندم، ج ۱۲، ش ۶، ص ۱۸۶-۱۷۷، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، تهران، ایران.
6. Asher , C.J.1987. Crop nutrition during the establishment phase , role of seed reserves. In : I.M.Wood (ed). Crop establishment problem in Queensland Australia. Institut of Agricultural Sciences, Australia.
7. Bardbeer , J.W.1988.Seed dormancy and germination. Chapman and Hail.New York.
8. Bolland , M.,B. Paynter and M.Barker.1989. Increasing phosphorus concentration in lupin seed increased grain yield in phosphorus deficient soil. Aust.J.Exp. Agric .29:797-801
9. Cakmak , I.,H.Ekis , A.Yilmaz , B.Tourun , N.Koleli , I.Gultekin , A.Alkan and S.Eker. 1997. Differential response of rye , triticale , bread and durum wheats to zinc deficiency in calcareous soils. Plant Soil 188: 1-10
10. Lindsay , W.L.and W.A.Norvel.1978. Development of a DTPA soil test for zinc , iron , manganese and copper . Soil Sci. Soc. Am.J.42:421-428
11. Marschner , H.1995. Mineral nutrition of higher Plants. 2nd ed. Academic Press. 890 P.,Stuttgart , Germany.
12. Ming , C. and Y. Chungreen. 1995. Effect of manganese and zinc fertilizers on nutrient balance and deficiency diagnosis of winter wheat crop in experiment. Beigieng , China.
13. Moussavi - Nik , M.,J.N.Pearson and R.D.Graham. 1998. Dynamics of nutrient remobilization during germination and early seedlings development in wheat. J.Plant Nutr. 21:421-434
14. Moussavi - Nik , M.,J.N.Pearson , G.J.Hollamby and R.D.Graham. 1997.Seed manganese (Mn) content is more important than Mn fertilization for wheat growth under Mn deficient conditions. J.Plant Nutrition for Sustainable Food Production and Environment.267-268
15. Rengel , Z. and R.D. Graham. 1995. Importance of seed Zn content for wheat growth on Zn deficient soils. I-Vegetative growth. Plant Soil 173:267-244.

16. Sillanpaa , M.1982.Micronutrients and nutrient status of soils. A global study. FAO Soil Bultein. No. 48.FAO,Rome, Italy.
17. Welch , R.M.,W.H.Allaway , W.A. House and J.Kubota. 1991. Geographic distribution of trace element problems. PP.31-37,In :J.J.Mortvedt (ed.) Micronutrients in agriculture (2nd ed.). Soil Sci. Soc.Am.Madison,WI.
18. Yilmaz , A.,H.Ekis and I. Cakmak. 1997. Effect of different zinc application methods on grain yield and zinc concentration in wheat. J.Plant Nutr.20:461-471.
19. Yilmaz, A.,H.Ekis,I.Gultekin , B.Torun, H.Barut , S.Karanlik and I.Cakmak.1998.Effect of seed zinc content on grain yield and zinc concentration of wheat grown in zinc deficient calcareous soils. J.Plant Nutr.21:2257-2264

Effects of Zinc Sulfate Application as well as Seed Zinc Concentration on Responses of Wheat Plant in a Calcareous Soil

GH. R. SAVAGHEBI FIROUZABADI¹, M. J. MALAKOUTI²,
M. MOEZ ARDALAN³

1, 3, Assistant and Associate Professors, Faculty of Agriculture, University of Tehran
2, Professor, Faculty of Agriculture, University of Tarbiat Modarres, Tehran, Iran.

Accepted Jan. 8, 2003

SUMMARY

Zinc deficiency is a worldwide nutritional constraint in crop production particularly in cereals growing on calcareous soils. In order to study the effects of zinc sulfate application and seed zinc concentration on responses of wheat plant a field experiment was carried out in a Zn – deficient calcareous soil (Fine Loamy, Mixed Thermic, Xeric Haplocalcid) in Karaj region. In a factorial experiment of randomized complete block design (RCBD) with three replications low and high – Zn seeds of wheat were sown and fertilized with 0, 2.5, 5 and 10 Kg Zn ha⁻¹. ANOVA results indicated that Zn application and seed Zn concentration significantly ($P<0.01$) increased grain yield as well as protein content. Total Zn uptake as well as concentration of Zn in grain , bran and flour increased whereas P, Fe, Mn and Cu concentrations along with P/Zn ratio decreased. The results further indicated that the major portion of these mineral elements are concentrated in bran. For increasing yield and enhancement of Zn concentration in grain as well as prevention of malnutrition in the society, application of Zn - fertilizer, cultivation of high - Zn seeds and application of P - fertilizer (only on the basis of soil tests) are recommended.

Key words: Yield, Grain protein, Concentration, Uptake Zinc.