

علوم زیستی ورزشی \_ بهار ۱۳۸۹  
شماره ۴- ص ص : ۵۷-۳۹  
تاریخ دریافت : ۱۶ / ۰۹ / ۸۷  
تاریخ تصویب : ۰۶ / ۰۶ / ۸۸

## تأثیر یک دوره فعالیت های هوایی متوسط همراه با مصرف ویتامین E بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) و شاخص های استرس اکسایشی و آسیب عضلانی دانشجویان پسر فعال

حسن نقی زاده<sup>۱</sup> \_ حسین اکبرزاده \_ فرشته کتبی

مریم گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت، عضو هیأت علمی دانشگاه یزد، مریم گروه تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت

### چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر یک دوره فعالیت هوایی متوسط همراه با مصرف ویتامین E بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) و شاخص های استرس اکسایشی و آسیب عضلانی دانشجویان پسر فعال بود. به این منظور ۴۵ دانشجوی پسر سالم فعال به صورت هدفمند انتخاب شدند و به شکل تصادفی در سه گروه قرار گرفتند؛ گروه تمرین - دارونما ( $n=15$ ) وزن  $22/4 \pm 2/3$  کیلوگرم، سن  $23/8 \pm 1/6$  سال، گروه تمرین - مکمل ( $n=15$ ) وزن  $22/2 \pm 4/5$  کیلوگرم، سن  $22/4 \pm 5/3$  کیلوگرم، سن  $22/9 \pm 6/8$  سال. آزمودنی ها به مدت ۸ هفته تحت سال) و گروه کنترل - دارونما ( $n=11$ ) وزن  $22/9 \pm 1/8$  کیلوگرم، سن  $22/8 \pm 6/8$  سال. آزمودنی ها با شدت ۶۰-۶۵ درصد حداکثر ضربان قلب همراه با مصرف ویتامین E قرار گرفتند. برای اندازه گیری متغیرهای وابسته، نمونه خونی آزمودنی ها ۲۴ ساعت قبل از اولین جلسه تمرین و ۲۴ ساعت پس از آخرین جلسه تمرین در وضعیت استراحتی جمع آوری شد. نتایج آزمون آنالیز واریانس نشان داد که مقادیر GPX، CP .MAD و VO<sub>2max</sub> پس از آزمون گروه تمرین - مکمل در مقایسه با پیش آزمون تفاوت معنی داری داشته است.

### واژه های کلیدی

فعالیت هوایی متوسط، مکمل سازی، گلوتاتیون پراکسیداز، استرس اکسایشی، آسیب عضلانی.

## مقدمه

تأثیر سمی رادیکال‌های آزاد (مولکول‌هایی که یک یا چند الکترون جفت نشده در مدار خارجی خود دارند)، به استرس اکسایشی در سلول منجر می‌شود (۱). بیشتر رادیکال‌های آزاد از گونه‌های اکسیژنی فعال تولید می‌شوند. اعتقاد بر آن است تولید کنترل نشده این گونه‌های اکسیژن فعال در درون سلول موجب می‌شود مولکول‌های زیستی همانند اسیدهای نوکلئیک (DNA)، پروتئین‌ها و چربی‌ها اکسید شوند و در نتیجه، اطلاعات ژنتیکی و ماهیت طبیعی پروتئین‌ها تغییر کند؛ آنزیم‌ها غیرفعال و غشاها زیستی دچار اختلال شوند. نتیجه این فعل و انفعالات، تولید (استرس) اکسایشی در بدن است که از طریق اختلال در موازنۀ اکسیدکننده‌ها و ضد اکسید کننده‌ها، بر اکسایش درون سلول تاثیر می‌گذارد و موجب بروز بیماری‌ها، مسمومیت و پیری می‌شوند (۴، ۵). البته بدن تمامی موجودات زنده مکانیسم‌های دفاعی در برابر گونه‌های اکسیژن دارد. آنزیم‌های ضد اکسایشی اولین خط دفاعی در برابر حملۀ انواع رادیکال‌های فعال اکسیژن هستند. آنزیم‌های ضد اکسایشی شامل سوپراکساید دیسموتاز (SOD) کاتالاز (CAT) گلوتاتیون پراکسید (GPX) و گلوتاتیون S ترانسفراز (GST) هستند. مواد ضد اکسایشی مثل آلفا - توکوفرول (ویتامین E) و ویتامین C، خط دفاعی بعدی را تشکیل می‌دهند. به طور کلی، ضد اکسیدان‌ها می‌توانند در یک یا چند مرحله از مراحل پراکسیداسیون لیپیدها شرکت کرده و از عمل مذکور در یکی از مراحل شروع، انتشار، خاتمه یا شروع مجدد جلوگیری کنند (۱، ۳). شواهد فراوانی نشانی می‌دهد که در شرایط فیزیولوژیک و پاتولوژیک گوناگونی از جمله ورزش شدید، تمرین در ارتفاع زیاد، عدم تحرک و خیلی از بیماری‌ها، مواد ضد اکسایشی درونزا (آنزیم‌ها آنتی اکسیدان) نمی‌توانند به طور کامل از آسیب اکسایشی و عضلانی جلوگیری کنند. به لحاظ اکسایشی، این شرایط ممکن است به پروتئین‌ها، DNA و لیپیدها آسیب وارد سازد، که در نتیجه آن این امکان وجود دارد که تعادل بین اکسیدانت‌ها و مواد آنتی اکسیدانی به نفع اکسیدانت‌ها تغییر یابد و مواد آنتی اکسیدانی درون‌زا دیگر قادر نباشند آثار اکسیدانت‌ها را خنثی کنند. چنین موقعی، نقش مواد آنتی اکسیدانی رژیم غذایی مانند ویتامین E، C و بتا - کاروتون و غیره ...، خیلی اهمیت پیدا می‌کند، چون آنها می‌توانند توانایی آنتی اکسیدانی درون‌زا (TAC) و ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (CAT, GPX, SOD) دهنند (۱، ۵). ویتامین E، به عنوان یکی از آنتی اکسیدان‌ها، مهم‌ترین ماده ضد اکسایشی زنجیرۀ انتقال الکترونی

در آنجاست. تحقیقات انجام شده در این زمینه نشان می دهد که کمبود ویتامین E در رژیم غذایی همراه با فعالیت بدنی با مشکلاتی مانند کاهش نرمی غشای سلول، کاهش پیوستگی تنفس میتوکندریایی، آسیب عضلات اسکلتی، کاهش سیستم ایمنی و دفاعی بدن همراه است و متعاقب آن موجب افزایش شیوع بیماری های قلبی و عروقی و آسیب های عضلانی می شود (۳۱، ۱). مکمل های تغذیه ای از جمله ویتامین E، می تواند مقاومت بافت ها را در مقابل پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از ورزش، از طریق تقویت آنزیم های آنتی اکسیدانی و سیستم ایمنی بدن افزایش دهد. سومیدا<sup>۱</sup> و همکارانش (۱۹۸۹) اثر حفاظتی مکمل ویتامین E (۳۰۰ میلی گرم در روز) را در کاهش مالون دی آلدئید<sup>۲</sup> (MDA) و شاخص های آنزیم بافتی به هنگام تمرینات هوایی متوسط خاطرنشان کرده اند (۱). نتایج تحقیقات قبلی نشان داده اند که مصرف ۶۰ روزه مکمل ویتامین E، تولید رادیکال های آزاد ناشی از ورزش و پراکسیداسیون لیپید را در عضله قلبی موش کاهش می دهد (۵، ۱۰).

برخی صاحب نظران معتقدند، پراکسیداسیون لیپیدی یکی از تاثیرات مضر حمله رادیکال های آزاد به غشای سلول است که ممکن است پس از فعالیت بدنی درمانده ساز در بدن رخ دهد (۴، ۸). طی این فرایند، سیال بودن و نفوذ پذیری غشا در نتیجه کاهش پروتئین های سیتوزولی از بین می رود و زمینه بروز مرگ بافتی و سلولی مهیا می شود (۸، ۱۹). کنجدکاوی در مورد تعیین اثر دقیق فعالیت بدنی همراه با مصرف مکمل بر تولید یا عدم تولید فشار (استرس) اکسایشی و ایجاد آسیب عضلانی در بافت های بدن و روشن ساختن پاسخ بدن به این فشارها، محققان را بر آن داشته است که اثر انواع تمرینات بدنی، با ماهیت و شدت های متفاوت همراه با مصرف مکمل بر روی سیستم های دفاعی آنتی اکسیدانی، شاخص های استرس اکسایشی و آسیب عضلانی بدن را بررسی کنند. از آنجا که یافته ها و اطلاعات اندکی در این زمینه وجود دارد، محقق بر آن شد که تأثیر تمرین هوایی با شدت ۶۰-۶۵ درصد حداکثر ضربان قلب همراه با مصرف ویتامین E بر فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) و شاخص های استرس اکسایشی (CP, MAD)<sup>۳</sup> و آسیب عضلانی (CK)<sup>۴</sup> دانشجویان پسر فعال را بررسی کند. به نظر محقق، آگاهی از نوع و میزان ارتباط فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی بدن و تغییر در مشخصات کیفی پراکسیداسیون لیپیدی و آسیب های عضلانی، به تنها یکی و هم در تعامل با تمرینات

1 - Sumida

2 - Malondialdehyde

3 - Carbonyl Protein

4 - Creatine Kinase

بدنی، ارزش فیزیولوژی زیادی دارد و انسان را در شناخت ارتباط درونی این متغیرها و آسیب شناسی بسیاری از بیماری‌ها که با عوامل یاد شده مرتبط‌اند، کمک کرده و از حوادث بالینی که سلامتی وی را تهدید می‌کند، جلوگیری می‌کند.

## روش تحقیق

روش تحقیق پژوهش حاضر، از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است.

### جامعه آماری

جمعیت آماری این تحقیق کلیه دانشجویان پسر حاضر در کلاس‌های تربیت بدنی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۸۵ (۱۶۲ نفر) بودند.

### روش انتخاب نمونه‌ها

۴۵ آزمودنی با میانگین سنی ۱۹ تا ۲۴ سال، با توجه به مراحل زیر به عنوان نمونه تحقیق برگزیده شدند:

۱. ابتدا موضوع تحقیق با نصب اطلاعیه در نقاط مختلف دانشگاه و حضور محقق در سر کلاس‌های درس، به اطلاع دانشجویان رسانده شد.
۲. در مرحله اول ۸۵ نفر از دانشجویان آمادگی خود را برای شرکت در تحقیق اعلام داشتند. این افراد بنابر یک برنامه زمان بندی شده در آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش حاضر شدند و آزمون فاکس را روی دوچرخه کارسنج انجام دادند. سپس از میان این افراد، ۴۵ نفر که بیشترین امتیاز را در آزمون فاکس به دست آورده بودند و از طریق پرسشنامه محقق ساخته، که وضعیت سلامتی، فعالیت بدنی و تغذیه شرکت کنندگان را ارزیابی می‌کند، همسان شده بودند، به عنوان نمونه‌های تحقیق برگزیده شده و به طور تصادفی به سه گروه ۱۵ نفری، یک گروه کنترل - دارونما، یک گروه تمرین - دارونما و یک گروه تمرین - مکمل تقسیم شدند. آزمودنی‌های انتخاب

شده، سابقه بیماری قلبی - عروقی، مصرف دخانیات، مصرف مکمل های آنتی اکسیدانی و نیروزا نداشتند و قبل از انجام تحقیق حداقل دو ماه در کلاس های عمومی تربیت بدنی شرکت داشتند.

### روش ها و وسائل اندازه گیری

تمامی متغیرهای وابسته که تحقیق در دو مرحله پیش و پس از پایان آزمون اندازه گیری شدند. نمونه های خونی در حالت ناشتا (۱۲ ساعت) از ورید جلوی آرنج توسط متخصصان علوم آزمایشگاهی در دانشکده علوم پزشکی تبریز گرفته شد. درجه حرارت محل خونگیری در هر دو مرحله ۲۲ درجه سانتیگراد ثبت شد.

اندازه گیری ها در این تحقیق شامل اندازه گیری فعالیت آنزیم  $\text{GPX}$ ،  $\text{CK}$ ،  $\text{CP}$ ،  $\text{MAD}$ ،  $\text{VO}_{2\text{max}}$  است که در زیر چگونگی آنها شرح داده می شود:

اندازه گیری فعالیت آنزیم  $\text{GPX}$  بر اساس مهار واکنش اتواکسیداسیون پیروگالول (۲۴) انجام گرفت؛ برای اندازه گیری  $\text{MDA}$ ، از یک معرف رنگی به نام تیوباربیتوریک اسید استفاده شد. برای تهیه منحنی استاندارد  $\text{MDA}$  از ۱، ۳، ۱، ۳ تتراتوکسی پروپان استفاده شد (۹)؛

برای اندازه گیری  $\text{CP}$  از یک معرف رنگی به نام ۴، ۲، ۴ دی نیتروفنیل هیدرازین استفاده شد. برای تهیه منحنی استاندارد از  $\text{BAS}$  استفاده شد (۲۲).

برای اندازه گیری  $\text{CK}$  از معرف های رنگی آلفانفتول و دی استیل استفاده شد. برای تهیه منحنی استاندارد از کراتین استاندارد استفاده شد (۰)؛

اکسیژن مصرفی بیشینه ( $\text{VO}_{2\text{max}}$ ) از طریق اجرای پروتکل فاکس بر روی دوچرخه کارسنج به مدت ۵ دقیقه، با شدت ۱۵۰ وات و سرعت ۶۰ دور در دقیقه و ثبت ضربان قلب در پایان دقیقه پنجم ( $\text{HR}_5$ ) و قراردادن این عدد در معادله زیر برآورد شد :

$$\text{VO}_{2\text{max}}(\text{ml} \cdot \text{min}^{-1}) = 6300 - 19/26(\text{HR}_5)$$

### پروتکل تمرین

طول دوره تمرینات ۸ هفته بود و هفته ای ۳ جلسه و هر جلسه به مدت ۴۵ دقیقه به مرحله اجرا درآمد.

#### جزییات برنامه تمرینی به اجرا درآمده برای گروه های تجربی

بخش های تمرین	نوع حرکات	شدت تمرین	مدت تمرین
گرم کردن	راه رفتن و حرکات کششی	MHR %۴۰-۴۵	۱۰-۱۵ دقیقه
بخش اصلی	راه رفتن سریع و پریدن از روی مانع، شنای سوئندی و طناب زدن	MHR %۶۰-۶۵	۲۰-۳۰ دقیقه
سرد کردن	راه رفتن با سرعت متوسط و کشش	MHR %۳۰-۳۵	۵-۱۰ دقیقه

گروه تجربی ۱: گروه تمرین - مکمل، مصرف قرص ۵۰ میلی گرمی ویتامین در هر جلسه تمرینی.

گروه تجربی ۲: گروه تمرین - دارونما، مصرف قرص ۵۰۰ میلی گرمی دارونما (نشاسته) در هر جلسه تمرینی.

گروه کنترل ۳: گروه دارونما، مصرف قرص ۵۰۰ میلی گرمی دارونما (نشاسته) در زمان های مشابه با گروه های تجربی.

### روش های آماری

به منظور جمع آوری اطلاعات و همسان کردن وضعیت سلامتی، مشخصات فردی، سابقه ورزشی و وضعیت تغذیه نمونه های تحقیق، از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن به اثبات رسیده بود، استفاده شد. برای بررسی طبیعی بودن داده ها از آزمون آماری کلموگروف - اسمیرنف و برای بررسی اختلاف میانگین های بین گروه ها در مراحل پیش و پس از تمرین از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و در صورت معنی دار بودن آن از آزمون تعقیبی LSD استفاده شد. در همه آزمون ها مقدار خطأ در سطح  $P < 0.05$  محاسبه و تمامی تجزیه و تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و EXELL انجام شد.

## نتایج و یافته‌های تحقیق

ویژگی‌های جسمانی و ترکیب بدنی آزمودنی‌های سه گروه در جدول ۱ ارائه شده است. نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف در دو مرحله پیش و پس آزمون، طبیعی بودن توزیع داده‌ها را تأیید کرد. نتایج آزمون تحلیل واریانس یک طرفه (One-Way ANOVA) و آزمون تعقیبی LSD در مورد بررسی اختلاف میانگین‌های بین گروه‌ها در مراحل پیش و پس از تمرین و معنی دار بودن متغیرهای وابسته در جدول‌های ۲ و ۳ مشخص شده است.

جدول ۱\_ شاخص جسمانی و ترکیب بدنی آزمودنی‌ها

BMI (kg/m <sup>2</sup> )	قد (سانتیمتر)	وزن (کیلوگرم)	سن (سال)	شاخص‌ها گروه‌ها
۲۳/۳۹ ± ۲/۱۰	۱۷۳/۲۴ ± ۵/۳۱	۶۹/۴۵ ± ۵/۳۱	۲۳/۸ ± ۱/۶	تمرین – مکمل
۲۳/۵۱ ± ۲/۲۷	۱۷۵/۲۸ ± ۴/۹۴	۷۲/۲۱ ± ۴/۵۶	۲۲/۴ ± ۲/۳	تمرین – دارونما
۲۳/۸۷ ± ۲/۱۸	۱۷۰/۴۱ ± ۶/۷۱	۶۸/۷۴ ± ۶/۸۶	۲۲/۹ ± ۱/۸	کنترل – دارونما

نتایج آنالیز واریانس یک طرفه مشخص کرد که بین میانگین‌های متغیرهای پژوهشی در مرحله پیش آزمون اختلاف معنی داری وجود ندارد ( $P > 0.05$ ). در مرحله پس آزمون اختلاف معنی داری بین میانگین‌های  $VO_{2\text{max}}$  و GPX، CP، MAD در بین سه گروه مشاهده شد ( $P < 0.05$ ) (جدول ۲).

جدول ۲\_نتایج (One-Way ANOVA) در مورد مقایسه اختلاف میانگین های متغیرها در مراحل زمانی (نفر ۴۵)

P-Value	پس آزمون	بیش آزمون	گروه ها	متغیرها
↓ * ۰/۰۲۱	۱۶/۰۱ ± ۲/۱۱	۲۰/۱۱ ± ۵/۲۵	تمرین - مکمل	MAD (نانومول در میلی متر)
۰/۳۲۴	۱۷/۲۱ ± ۲/۵۱	۱۹/۱۲ ± ۴/۴۱	تمرین - دارونما	
۰/۶۴۱	۱۹/۹۸ ± ۵/۶۷	۱۹/۸۵ ± ۵/۲۸	کنترل - دارونما	
↓ * ۰/۰۴۹	۱/۱۳ ± ۰/۱۷	۲/۶۸ ± ۰/۶۴	تمرین - مکمل	CP (نانومول در هر میلی گرم پروتئین )
۰/۰۷۵	۱/۰۲ ± ۰/۲۷	۱/۴۸ ± ۰/۵۸	تمرین - دارونما	
۰/۳۴۱	۱/۷۱ ± ۰/۶۴	۱/۳۴ ± ۰/۳۸	کنترل - دارونما	
۰/۰۵۸	۱۹۷/۴۷ ± ۵۲/۴۷	۲۰۱/۱۸ ± ۷۲/۲۱	تمرین - مکمل	CK (واحد بین المللی در لیتر)
۰/۰۶۷	۱۹۸/۷۷ ± ۹۰/۷۱	۲۰۰/۲۷ ± ۸۷/۳۷	تمرین - دارونما	
۰/۳۲۷	۲۰۲/۴۸ ± ۸۸/۴۶	۱۹۹/۵۱ ± ۸۲/۵۹	کنترل - دارونما	
↑ * ۰/۰۳۷	۵۹/۷۸ ± ۸/۴۱	۴۵/۲۱ ± ۵/۳۲	تمرین - مکمل	VO <sub>2</sub> max (ml/kg/min)
↑ * ۰/۰۴۶	۵۳/۳۶ ± ۶/۴۷	۴۱/۱۷ ± ۴/۹۰	تمرین - دارونما	
۰/۷۲۱	۴۱/۳۸ ± ۴/۲۱	۴۲/۲۷ ± ۴/۶۷	کنترل - دارونما	
↑ * ۰/۰۰۳	۱۲/۴۲ ± ۲/۷۵	۶/۳۹ ± ۰/۲۸	تمرین - مکمل	GPX (U/ml)
۰/۰۵۸	۷/۲۱ ± ۰/۸۷	۵/۱۴ ± ۰/۱۴	تمرین - دارونما	
۰/۸۴۵	۴/۵۱ ± ۰/۲۳	۵/۳۷ ± ۰/۶۴	کنترل - دارونما	

\* تفاوت معنی دار در سطح ۰/۰۵  $P <$  : ↑: افزایش معنی دار؛ ↓: کاهش معنی دار

یافته های آزمون تعییبی (LSD) نشان داد که در میانگین مقادیر GPX ، CP ، MAD ، CK و VO<sub>2</sub>max پس مکمل با گروه کنترل اختلاف معنی داری وجود دارد ( $P < ۰/۰۵$ ). همچنین در میانگین آزمون بین هر دو گروه تجربی با گروه کنترل اختلاف معنی داری مشاهده شد ( $P < ۰/۰۵$ ) (جدول ۳).

جدول ۳ \_ نتایج آزمون تعقیبی LSD در مورد مقایسه متغیرهای وابسته بین گروه های شرکت کننده در تحقیق

متغیرها	گروه ها	تمرین - مکمل	تمرین - دارونما	کنترل - دارونما
MAD (نانومول در میلی متر)	تمرین - مکمل	-	۰/۳۴	*۰/۰۳۲
	تمرین - دارونما	-	-	۰/۱۴۷
	کنترل - دارونما	-	-	-
CP (نانومول در هر میلی گرم پروتئین )	تمرین - مکمل	-	۰/۵۴	*۰/۰۴۶
	تمرین - دارونما	-	-	۰/۵۰۷
	کنترل - دارونما	-	-	-
GPX (U/ml)	تمرین - مکمل	-	۰/۰۸	*۰/۰۴۴
	تمرین - دارونما	-	-	۰/۱۱۷
	کنترل - دارونما	-	-	-
VO <sub>2</sub> max (ml/kg/min)	تمرین - مکمل	-	۰/۲۹	*۰/۰۰۲
	تمرین - دارونما	-	-	*۰/۰۳۹
	کنترل - دارونما	-	-	-

اعداد جدول نشان دهنده مقادیر P-Value است . \* وجود اختلاف معنی دار در سطح  $<0/05$

## بحث و نتیجه‌گیری

در تحقیق حاضر الگوی تغییرات MAD و CP گروه تمرین - مکمل در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری نشان داد که ممکن است در اثر مصرف ویتامین E باشد، به عبارتی نشان دهنده تبدیل ویتامین E به رادیکال آن و جلوگیری از استرس اکسایشی با ممانعت از افزایش MAD و CP است. به عبارت دیگر، مصرف ویتامین E به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی محلول در چربی موجب تقویت سیستم آنتی اکسیدانی

درون زای بدن شد و از پراکسیداسیون چربی و آسیب پذیری غشا در گروه تمرین – مکمل به طور معنی داری جلوگیری کرد. هر چند الگوی تغییرات CP و MAD در گروه تمرین بر اثر تمرینات انجام شده در مقایسه با پیش آزمون کاهش داشت، ولی این کاهش معنی دار نبود. این نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر دلالت بر نقش تمرینات هوایی باشد. ۶۵-۶۰ درصد حداکثر ضربان قلب بر کنترل شاخص های استرس اکسایشی و پیشگیری از پراکسیداسیون لیپید و آسیب پذیری غشا دارد، به ویژه اگر با مصرف مکمل ویتامین E هماهنگ باشد. شدت و مدت فعالیت بدنی، متغیرهای مهمی اند که در نوع اثرگذاری فعالیت بدنی بر روی شاخص های استرس اکسایشی و وضعیت آنتی اکسیدانی بدن دخالت دارند (۶). در این زمینه گزارش شده که مصرف مکمل های آنتی اکسیدانی ممکن است این اثر فعالیت های بدنی را در راستای افزایش عملکرد مطلوب سیستم های حیاتی بدن و کاهش عوامل خطرساز قلبی و عروقی سوق دهد (۱). همچنان که نتایج تحقیق حاضر مؤید گفته های مذکور است. فاتاروس<sup>۱</sup> و همکارانش (۲۰۰۴) در تحقیق روی مردان مسن، اظهار داشتند تمرین استقامتی هماه با مصرف ویتامین C موجب کاهش پراکسیداسیون چربی حالت پایه و پراکسیداسیون لیپیدی ناشی از ورزش می شود، اما قطع تمرین ممکن است تمامی این سازگاری ها را معکوس کند (۱۴). بسیاری از تحقیقات نشان دادند که فعالیت های بدنی با شدت زیاد و طولانی مدت بدون مصرف مکمل ممکن است موجب افزایش تولید رادیکال های آزاد، واکنش های التهابی و در نتیجه آسیب ماکرومولکول های سلول مثل DNA، بروتئین و چربی شود (۱۷، ۱۹)؛ بنابراین، این نوع فعالیت ها از عوامل خطرزای تندرستی به شمای می روند و با تخریب سلول روند پیری و مرگ را تسريع می کنند (۱۹). یکی از دلایل افزایش شاخص مالون دی آلدئید ممکن است ناشی از افزایش تولید رادیکال های آزاد در زنجیره انتقال الکترون باشد که مناسب با افزایش مصرف اکسیژن است. اسیدهای چرب غیراشبع چندگانه غشا به اثر رادیکال های آزاد بسیار حساس اند. مالون دی آلدئید، محصول ثانویه پراکسیداسیون لیپید است که به عنوان شاخص فشار اکسایشی اندازه گیری می شود (۱، ۱۷). در برخی تحقیقات گزارش شده است که بین افزایش MDA سرم یا پلاسمما و افزایش MDA گلبول های قرمز رابطه مستقیمی وجود دارد (۲۰، ۲۱). یعنی فعالیت جسمانی شدید به آسیب اکسایشی در سلول های خونی همانند گلبول های قرمز و لنفوцит ها منجر می شود. با این حال، در برخی تحقیقات گزارش شده که شاخص

MDA و CP سرم یا پلاسمای بعد از فعالیت استقامتی یا مقاومتی همراه با مصرف مکمل‌های ویتامین C، E و بتاکاروتن تغییر نمی‌کند یا با کاهش همراه است (۲۵، ۱۵) که با نتایج تحقیق حاضر همسوست.

برخی پژوهش‌ها نشان می‌دهند حتی یک جلسه فعالیت بدنی متوسط همراه با مصرف مکمل، شاخص پراکسیداسیون لیپیدی و آسیب‌پذیری غشا را کاهش می‌دهد، در دیگر تحقیقات چنین تغییری مشاهده نشده است (۵). در تحقیق حاضر، شاخص MDA و CP گروه تمرین – مکمل پس از هشت جلسه فعالیت هوایی با شدت ۶۰-۶۵ درصد حداکثر ضربان قلب همراه با مصرف مکمل در مقایسه با گروه کنترل کاهش معنی داری داشت که با تحقیقات برخی پژوهشگران (۳۰، ۱۸) همسوست. اما آلسیو<sup>۱</sup> و همکارانش (۲۰۰۰) شاخص TBARS و CP را پس از دو نوع فعالیت خسته کننده (هوایی و ایزومتریک درمانده ساز) بدون مصرف مکمل های تعذیبه‌ای مطالعه و اظهار کردند پس از هر دو نوع فعالیت، استرس اکسایشی و آسیب‌پذیری غشا افزایش یافته است (۳). برایند تحقیقات گذشته در زمینه تاثیر مصرف مکمل طی فعالیت‌های هوایی متوسط نشان می‌دهد هر چه شدت متوسط و مدت فعالیت طولانی‌تر باشد، مقدار بروز پراکسیداسیون چربی و آسیب‌پذیری غشای سلول نیز کمتر خواهد بود، همان نتیجه‌ای که در تحقیق حاضر به دست آمد. فایر<sup>۲</sup> و همکارانش (۲۰۰۵) شواهدی ارائه کرده‌اند که استفاده از مکمل سازی ضد اکسایشی را در درمان بیماری کرونر قلبی تایید می‌کند (۱۶). همچنین نشان دادند که استرس اکسایشی ناشی از فعالیت ورزشی در آزمودنی‌های تمرین کرده‌ای که روزانه به مدت دو هفته ویتامین E دریافت کرده بودند، کمتر از آزمودنی‌های تمرین نکرده بوده است (۱۶).

در این تحقیق همزمان با ادامه دار شدن تمرین، نوعی سازگاری مثبت در گروه تمرین – مکمل به لحاظ شاخص‌های استرس اکسایشی دیده شد، به طوری که مقادیر MAD و CP پس آزمون گروه تمرین – مکمل در مقایسه با پیش آزمون کاهش معنی داری داشت. تحقیقات انجام شده در زمینه مکمل سازی ضد اکسایشی ناشی از ورزش (۳۲، ۳۳) نشان داد که مکمل سازی ۸ هفته ویتامین E از اکسایش پروتئین عضله اسکلتی، در زمان استراحت و پس از ورزش جلوگیری کرده است. همچنین مکمل سازی ویتامین E و کوانزیم Q<sub>10</sub>، تشکیل کربونیل پروتئین عضلانی ناشی از استرس اکسایشی متعاقب تمرین استقامتی را کاهش داده است (۳۱). که با نتایج تحقیق حاضر همسوست. با توجه به تفاوت‌های موجود در ماهیت انواع فعالیت‌های ورزشی، میزان آمادگی

1 - Alissio

2 - Fry

آزمودنی‌ها، نوع بافت مورد بررسی، مدت و شدت فعالیت همراه با مصرف انواع مکمل‌های آنتی اکسیدانی بروزن‌زا، نمی‌توان به نتیجه گیری قاطع در زمینه نhoe تاثیرپذیری پراکسیداسیون چربی و آسیب پذیری غشا در اثر فعالیت ورزشی منظم دست یافت، اما در کل می‌توان اظهار داشت با انجام تمرين منظم همراه با مصرف مکمل‌های تاثیرگذار و در اثر سازگاری هایی که به احتمال زیاد در دستگاه ضداکسایشی بدن به وجود می‌آید، پاسخ‌های پراکسیداسیون چربی کاهش می‌یابد و یا حتی متوقف می‌شود.

با وجود کاهش معنی دار شاخص‌های استرس اکسایشی، آسیب عضلانی را بعد از پایان ۸ هفته برنامه تمرينی مشاهده نکردیم، ولی با مقایسه میانگین‌های پیش و پس آزمون دریافتیم که ماهیت برنامه تمرينی به حدی بود که موجب کاهش آسیب عضلانی شود، هر چند این کاهش معنی دار نبود. دیوتی<sup>۱</sup> و همکارانش (۱۹۹۰)، ایناما<sup>۲</sup> و همکارانش (۱۹۹۶) افزایش CK یا آسیب عضلانی را متعاقب ورزش با وجود افزایش استرس اکسایشی در افراد تمرين کرده مشاهده کردند (۱۳) که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی ندارد. چایلد<sup>۳</sup> کاهش غیرمعنی دار CK را متعاقب برنامه تمرينی به اجرا درآمده به مدت ۱۲ هفته همراه با مصرف ویتامین C در غیرورزشکاران مشاهده کرد (۱۲) که همسو با یافته‌های ماست. ساکستون<sup>۴</sup> و همکاران (۲۰۰۳) و بویر و گلدفارب<sup>۵</sup> (۲۰۰۲) نیز افزایش CK و عدم افزایش استرس اکسایشی را بعد از ورزش در آزمودنی‌ها غیرورزشکار گزارش کردند (۷، ۳۰). با توجه به این یافته‌ها، به نظر می‌رسد که آسیب عضلانی با استرس اکسایشی ارتباط کمی داشته باشد. مصرف مکمل‌ها، تعداد آزمودنی‌ها، تجربه آزمودنی‌ها، ماهیت برنامه تمرينی به اجرا درآمده، سطح هیجان ایجاد شده در پی فعالیت و روش‌های مختلف مورد استفاده برای اندازه‌گیری رادیکال‌های آزاد، از عوامل تعیین کننده عدم همخوانی نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات قبلی است. به نظر می‌رسد که رادیکال‌های آزاد در آسیب عضلانی نقش غیرمستقیمی داشته باشند. برای روشن شدن ارتباط بین رادیکال‌های آزاد و آسیب عضلانی، به تحقیقات کنترل شده خوبی نیاز است؛ ویژگی‌ای که تحقیق ما به علت ماهیت آن و هدف دیگری دنبال می‌کردیم، فاقد آن است.

1 - Dathie

2 - Inayama

3 - Chaild

4 - Saxton

5 - Boyer and Gofarb

در این تحقیق معلوم شد که فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز گروه تمرين - مکمل نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داشته است، به عبارت دیگر، قدرت و ظرفیت سیستم دفاع آنتی اکسیدانی افزایش یافته است. هر چند در گروه تمرينی هم شاهد افزایش بودیم، ولی معنی دار نبود. این نتیجه به نقش مهم و با اهمیت مکمل های مصرفی در تقویت و افزایش کلایی سیستم آنتی اکسیدانی درون زای بدن در برابر استرس اکسایشی تولید شده در جریان تمرين دلالت دارد. تحقیقات و برخی گزارش ها هم نقش فعالیت های بدنی و تمرينات ورزشی را همراه با مصرف مکمل در تقویت سیستم دفاع آنتی اکسیدانی بدن و سازگاری واحد های حرکتی، به ویژه عضلات نوع اول (نعلی) که بیشترین تطابق را بر اثر تمرين به دست می آورددند، نشان می دهند (۲۹). ریکاردو<sup>۱</sup> و همکارنش (۲۰۰۶) نیز به نتیجه مشابهی در افزایش فعالیت پراکساید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز عضله قرمز چهار سر ران و دوقلوی موش های تمرين کرده نسبت به تمرين نکرده، بعد از ۱۲ هفته تمرين پیشرونده از نظر زمان، سرعت و شبیب دست یافتند (۲۷)، این نتایج با نتایج تحقیق حاضر همسو است، در حالی که فعالیت کاتالاز در تمام عضلات مورد آزمایش آزمودنی های تمرين کرده نسبت به تمرين نکرده، کاهش معنی داری نشان داده بود (۲۷). باربارا<sup>۲</sup> و همکارانش (۲۰۰۶) بعد از دویدن (۴۵ دقیقه در روز، ۵ روز در هفته، برای ۶ و ۸ هفته همراه با مصرف مکمل در هر جلسه) افزایش معنی داری در فعالیت آنزیم SOD وابسته به منگنز (Mn-) و GPX (SOD و GPX) موش های پیر تمرين کرده نسبت به موش های پیر و جوان تمرين نکرده، مشاهده کردند (۱۰) که با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد. به علاوه، تغییر یا افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی همانند کاتالاز (CAT)، SOD و GPX پس از تمرينات حاد و شدید بدنی همراه با مصرف مکمل های آنتی اکسیدانی برون زا (۱۸، ۱۹، ۲۸) نیز گزارش شده است. نتایج مذکور با نتایج تحقیق حاضر مبنی بر بالاتر بودن معنی دار GPX نسبت به گروه کنترل همخوانی دارد. از این رو به نظر می رسد ماهیت تمرينات ۱۲ هفته ای پیش رونده از نظر زمان، سرعت و شبیب و سطح آمادگی آزمودنی ها با تمرينات منظم و طولانی و اجرای تمرينات ۶ الی ۸ هفته ای همراه با مصرف مکمل با محتوای برنامه تمرينی تحقیق حاضر تا حدود زیادی مشابه باشد و همین را می توان از عوامل همخوانی نتایج دانست. علاوه بر نتایج مذکور، نتایجی مغایر با نتایج تحقیق حاضر در تحقیقات (۲۱، ۱۵، ۱۱) گزارش شده که احتمال می رود عدم همخوانی برخی نتایج در به کار بردن

1 - Ricardo

2 - Barbara

شیوه های خاص تمرینی، روش های مختلف آزمایشی، فقر آنتی اکسیدانی بدن، جنسیت، عدم مصرف مکمل ها، منطقه چغرافیایی، تعداد نمونه ها، عوامل وراثتی و غیره می باشد. دیگر عوامل مانند اندازه گیری شاخص های استرس اکسیداتیو در بافت های مختلف بدن هم ممکن است در نتایج تاثیر گذاشته باشد. نتایج برخی تحقیقات نشان می دهد که تمرین بدنه فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در عضلات مخطط و به مقدار کمتر در کبد، قلب و ریه را تحریک می کند (۲، ۶). این شواهد دال بر آن است تمرین بر سیستم های آنتی اکسیدانی کبد یا قلب، به اندازه عضله اسکلتی تاثیر ندارد. به عقیده بعضی محققان، وجود این تاثیرات متفاوت تمرینی ممکن است ناشی از وجود جایگاه های سلولی ویژه (جایی که اقسام اکسیژن واکنشی تولید می شوند) و ظرفیت آنتی اکسیدانی پایه بافت های مختلف باشد (۴). عضله اسکلتی کمترین مقدار آنزیم های آنتی - اکسیدانی را دارد و حمل اکسیژن به این بافت های حین تمرین شدید ممکن است تا ۱۰۰ برابر افزایش یابد. سوخت و ساز پایه قلب حدود ۱۰۰ برابر کبد است و مغز نیز در حدود ۲۰ درصد اکسیژن مصرفی بدن را مورد استفاده قرار می دهد (۵). این به معنی بالاتر و متفاوت بودن مقدار پراکسیداسیون چربی ناشی از استرس اکسیداتیو در این بافت ها و صدمه دیدگی آنها بر اثر تمرین است.

از دیگر نتایج تحقیق حاضر، بالاتر بودن حداکثر اکسیژن مصرفی بیشینه هر دو گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل است. تحقیق روی ورزشکاران و اندازه گیری  $VO_{2\text{max}}$  آنها از طریق آزمون بروس، نشان داده که ورزشکاران نسبت به غیرورزشکاران توان هوای نسبتاً بالا و آمادگی قلبی - عروقی مناسبی برای فعالیت های استقامتی دارند (۴). همچنین نتایج تحقیقات (۴، ۵) مبنی بر بالاتر بودن  $VO_{2\text{max}}$  افراد تمرین کرده در مقایسه با گروه کنترل، با نتایج تحقیق حاضر همسوست. بالاتر بودن مقدار  $VO_{2\text{max}}$  گروه های تمرینی در تحقیق حاضر، نشان از نقش تأثیرگذار تمرینات هوایی باشد ۶۵-۶۰ درصد حداکثر ضربان قلب همراه با مصرف مکمل بر شاخص ها و عوامل آمادگی جسمانی، و دستیابی به شرایط مطلوب بدنی و کاهش عوامل خطرزای قلبی و عروقی دارد. تحقیقات گذشته نیز برتری فیزیولوژیکی ورزشکاران بر غیرورزشکاران یا تغییر معنی دار در شاخص های فیزیولوژیک پس از تمرین منظم را نشان داده اند (۲، ۵). همچنین اثر معنی دار تمرین بر  $VO_{2\text{max}}$  در افراد با تمرینات هوایی شدید و متوسط پس از ۴ هفته تمرین نیز مشاهده شده است (۴، ۶). یافته های تحقیق حاضر این مسئله را روشن می سازد که برای رسیدن به سطح مطلوب آمادگی جسمانی

و ترکیب بدنی مناسب، می توان برنامه تمرينی اجرا شده در طول ۸ هفته را در دستور کار افرادی قرار داد که می خواهند حداکثر سودمندی را از انجام فعالیت های بدنی ببرند، زیرا نتایج تحقیق حاضر مؤید گفته های بالا است.

### نتیجه گیری

بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق، مکمل سازی ویتامین E بر اثربخش بودن تأثیرات تمرينات هوایی متوسط باشد ۶۵-۶۰ درصد حداکثر ضربان قلب بر شاخص های استرس اکسایشی و وضعیت آنتی اکسیدانی و سیستم ایمنی بدن سودمند است و نتایج چنین پروتکل تمرينی نشان دهنده کاهش خطر عوامل آتروژنیک، افزایش آمادگی جسمانی، افزایش طول عمر و کاهش عوامل دخیل در بروز بیماری های قلبی و عروقی است که می تواند در دستور کار افرادی قرار گیرد که می خواهند بیشترین سودمندی را از انجام فعالیت های بدنی به جای درمان های دارویی ببرند.

### منابع و مأخذ

۱. ژولت ، راداک.(۱۳۸۳). "رادیکالهای آزاد در ورزش و پیشگیری" ، ترجمه، دکتر عباسعلی گائینی، دکتر محمد رضا حامدی نیا، دکتر رضا طیبی، چاپ اول، دانشگاه تربیت معلم سبزوار.
- 2- Adams, A.K, and Best, T.M.(2005). "The role of antioxidant in exercise and disease prevention". *The Physician and Sport Medicine*. 30(5): PP: 37-44.
- 3- Alissio, H.M., Lippi, G., Federico, S., Gian, L.S.(2000). "Effects of physical activity or exercise on cardiovascular parameters and oxidative stress in rats". *Med Sci Sport Exer, Supple, P: s81*.
- 4- Afzalpour, ME., Gaeini, A., Khazai, M.(2006). "Effects of aerobic exercise on the serum LDL and Total Capacity in Non-Active healthy men". *11<sup>th</sup> Annual Congress of the European College of Sport Scince, 05-08 July 2006- Switzerland*.

- 5- Afzalpour, ME.(2007). "Interaction between Aerobic exercise and oxidative stress in sedentary men". *12<sup>th</sup> Annual Congress of the ECSS, 11-14 July 2007-Finland.*
- 6- Ashton, T. Aguijo, A., Tauler, P., Guix, M.P.(1998). "Electron spin resonance spectroscopic detection of oxygen-centred radicals in human serum following exhaustive exercise". *Eur J Appl Physiol Occup Physiol.* 77(6): PP: 498-502.
- 7- Boyer, F. and Goldfarb J.R.(2002) "Introduction: Oxidant stress, aging, and exercise ". *Med Sci Sport Exerc.* 25(8): 210-212.
- 8- Britez, F., Travacio, M., Gambino, G.(2000). "Regular exercise improve lipid and antioxidant profile. In: Abstracts of XIIth International Symposium on Atherosclerosis". Stockholm Sweden. 25-29 Jun, P: 162.
- 9- Botsoglou, N.A., Natson, T.A., Marly, L.K., Garg, M.L.(1994). "Rapid, sensitive, and specific thiobarbituric Acid Method for measuring lipid peroxidation in Animal tissue, Food and feedstuff samples". *J. Agric. Food chem.* 42: PP: 1931-1937.
- 10- Barbara, R., Usberti, M., Gerardi, G.M., Micheli, A.M.(2006)."Exercise training affects age-induced changes in SOD and heat shock protein expression in rat heart". *J. Experimental Gerontology.* 41: PP: 764–770.
- 11- Balog, T., [Khaleghi, M.](#), [Hensrud, D.D.](#)(2006). "The influence of season on oxidant–antioxidant status in trained and sedentary subjects". *Life Sciences.* 78(13): PP: 1441-1559.
- 12- Chaild, L.(1997). "Adaptations of glutathione antioxidant system to endurance training ate tissue and muscle fiber specific". *Am J physiol.* 272: R363 – R369.
- 13- Dathie, G.G., Liner, Q., Park, M.(1990). "Blood antioxidant status and erythrocyte lipid peroxidation following distance running". *Archives of Biochemistry and Biophysics.* 282: PP: 78 – 83.

- 14- Fatouros, I.G., Shyan, W.J., Lin, C.C., Chen, J.K.(2004). "Oxidative stress responses in older men during endurance training and detraining". *Med Sci Sports Exerc.* 36(12): PP: 2065-72.
- 15- Franzoni, F., Levine, R., Fever, K.L., Likhi, P.(2005). "Physical activity, plasma antioxidant capacity, and endothelium-dependent vasodilation in young and older men". *Am J Hypertens,* 18(4 Pt 1): PP: 510-6.
- 16- Fry, A.C., Mastaloudis, A., Marrow, J., Hopkins, D.(2005). "Resistance exercise overtraining and overreaching". *Sports Med.* 23: PP:106–129.
- 17- Gunduz F, and Senturk UK.(2005). "The effect of reactive oxidant routine incremental cycling exercise in healthy sedentary subjects". *Respir Physiol Neurobiol.* 144 (1): PP: 81-90.
- 18- Inayama, T., Cheryl, M.B., Arthur, L.W., Kevin, R.V.(1996). "Plasma protein bound sulphydryl group oxidation in humans following a full marathon race". *Life sciences.* 59: PP: 537 – 578.
- 19- Ji, L. and Mitchell, E.(1992). "Glutathione and antioxidant enzymes in skeletal muscle: effects of fiber type and exercise intensity". *J Appl Physiol,* 73(5): PP: 1854-9.
- 20- Judge, A. R. and S. L. Dodd.(2004). "Xanthine oxidase and activated neutrophils cause oxidative damage to skeletal muscle after contractile claudication". *Am J Physiol Heart Circ Physiol.* 286(1): PP: H252-6.
- 21- Kipp, Ronald. W. and Askew, E. Wayne.(2001). "Antioxidant status and oxidative stress in Elite Alpine ski Racers".*International Journal of sport nutrition and Exercise metabolism.* 11: PP: 32-41.
- 22- Levine, R., Inga, E.S., Ant, E.T., Dear, K.G., Tomas, O.(1990). "Determination of carbonyl content in oxidatively modified proteins". *METHODS IN ENZYMOLOGY.* Vol, 186. PP: 464-479.

- 23- Liu, J., Eugene, B., Karen, E.(2000). "Chronically and acutely exercise rats: biomarkers of oxidative stress and endogenous antioxidants". *J Appl Physiol*, 89(1): PP: 21-8.
- 24- Marklund, S. and Marklund, G.(1974). "Involvement of the Superoxide Anion Radical in the Autoxidation of Pyrogallol and a Convenient Assay for Superoxide Dismutase and Glutathion Peroxidase". *Biochem*. 47: PP: 469-474.
- 25- Ogonovzky, H. Berkers, I., Kumagia, S., Teck, J., Simon, T.(2005). "The effects of moderate,strenuous, and overtraning on oxidative stress markers and DNA repair in rat liver". *Can J Appl Physiol*, 30(2): PP: 186- 95.
- 26- RuiLi, M.S., Gianmario, S., Danilo, N., Oberdan, M.(2006). "Effect of antioxidant capacity on blood lipid metabolism and lipoprotein lipase activity of rats fed a high- fat diet". *Journal of Nutrition*. 24(4): PP: 1185-1191.
- 27- Ricardo, A. Schaller, G., Mittermayer, F., Assuero, G.(2006). "Imbalance in SOD/CAT activities in rat skeletal muscles submitted to treadmill training exercise". *Cell Biology International*. 30(10): PP: 848-853.
- 28- Rokitzki, I.(1994). "Alpha- tocopherol supplementation in racing cyclists during extreme endurance training". *International Journal of sports Nutrition*. 4: PP: 255-261.
- 29- Robertson, J.D., Kartikya, A., Alpaca, H., Dungun, O., Thomas, D.(1991). "Increased blood antioxidant system of runners in response to training load". *Clinical science*. 80: PP: 611-618.
- 30- Saxton, J.M., Nicolas, E., Patrick, L., Christian, P.(2003). "Indices of free-radical mediated damage following maximum voluntary eccentric and concentric muscular work". *European Jorunal of Applied physiology*. 68: PP: 189 - 193.
- 31- Sacheck, J. and M, Blumberg, J.B.(2001). "Role of vitamin and oxidative stress in exercise". *Nutrition*. 17(2): PP: 809-814.

32- Uchiyama, S., Green, R., Jill, E.W., Sampath, P.(2006). "Relationship between oxidative stress in muscle tissue and weight lifting-induced muscle damage". *Eur. J. Physiol.* 452: PP: 109–116.

33- White, A., Kirschvink, N., Coudert, J.N., Fellmann, N.(2001). "Role of exercise and ascorbate on plasma antioxidant capacity in thoroughbred race horses". *Comparative Biochemistry and Physiology*. 128(9): PP: 99-104.