

بررسی شیوع اورنیتوباکتریوم رینوتراکتال در گلهای مرغ گوشتی مبتلا به عوارض تنفسی در استان مرکزی

شمس الدین قائم مقامی^{۱*} جلیل وند یوسفی^۲ حجت ا. نیروند^۳ عباسعلی منصفی^۳ سعید احمدلو^۴

(۱) موسسه واکسن و سرم سازی رازی شعبه اراک، مرکزی- ایران.

(۲) موسسه واکسن و سرم سازی رازی کرج، تهران- ایران.

(۳) بخش خصوصی دامپزشکی، تهران- ایران.

(۴) اداره کل دامپزشکی استان مرکزی، مرکزی- ایران.

(دریافت مقاله: ۲۱ خردادماه ۱۳۸۴، پذیرش نهایی: ۹ دی ماه ۱۳۸۵)

چکیده

بیماریهای تنفسی از عوارض معمول موجود در گلهای طیور گوشتی بوده و از عوامل مهم زیان اقتصادی در این مزارع به حساب می‌آیند. در طی دهه‌گذشته یک باکتری گرم منفی پلئومورف از مرغ‌های گوشتی با عالم تنفسی جداسده است که در حال حاضر تحت عنوان اورنیتوباکتریوم رینوتراکتال نامیده می‌شود. در این مطالعه نمونه‌های نای و ریه تهیه شده از مرغان دارای عالم تنفسی در ۱۷۳ مرغداری گوشتی تحت عملیات کشش باکتریایی قرار گرفت. به منظور تعیین هویت باکتری از تست‌های بیوشیمیایی اختصاصی استفاده بعمل آمد. در این مطالعه اورنیتوباکتریوم رینوتراکتال از نمونه‌های مربوط به ۱۷ مرغداری (درصد) جدا گردیده، علاوه بر این حساسیت باکتری‌های مختلف به آنتی بیوتیک‌های مختلف به روش کربی- باور مورداً مایش قرار گرفت و اغلب آنها نسبت به داکسی‌سایکلین حساسیت نشان دادند. با توجه به نتایج بدست آمده توجه به biosecurity و استفاده از واکسن در گلهای مادر توصیه می‌شود.

واژه‌های کلیدی: شیوع، اورنیتوباکتریوم رینوتراکتال، مرغ گوشتی، عوارض تنفسی.

. است(۳).

در آمریکا وجود باکتری در گلهای تخم‌گذار برای اولین بار توسط Sprenger گزارش گردید(۱). در اکثر نقاط دنیا آنتی بادیهای مادری اورنیتوباکتریوم در تخم مرغ‌ها و جوجه‌های یک روزه تشخیص داده شده است. بررسی‌های سرو‌لوزیک متعددی نشانگر این بوده که گلهای مرغ و بوقلمون موجود در اروپا، آفریقا، آمریکای شمالی و جنوبی و بعضی از کشورهای آسیایی با اورنیتوباکتریوم تماس داشته‌اند(۱۵). قابلیت بیماری‌زایی باکتری مذکور به عنوان یک پاتوژن اولیه در طیور گوشتی توسط Van Veen و همکاران توصیف شده است. همچنین محققین فوچ و جود اختلاف در بیماری‌زایی سویه‌های مختلف باکتری را نشان داده‌اند(۱۷). تحقیقات انجام شده در آفریقایی‌زبان تأیید قابلیت باکتری در ایجاد بیماری به طور اولیه، وجود تفاوت در شدت بیماری‌زایی سویه‌های جداسده باکتری در آفریقای جنوبی را نشان داد(۱۳). در ایران گزارش مربوط به اولین مورد جداسازی اورنیتوباکتریوم از یک گله گوشتی و تخم‌گذار توسط بنانی و همکاران ارائه گردیده است(۱). هدف از انجام این تحقیق بررسی شیوع اورنیتوباکتریوم در مرغداری‌های گوشتی مبتلا به عوارض تنفسی در استان مرکزی بود.

مواد و روش کار

نمونه‌گیری: نمونه مورد استفاده در این طرح شامل نای و ریه مرغ گوشتی مبتلا به عوارض تنفسی بود که از مرغ‌های زنده مبتلا و تلف شده تهیه گردید. به طور کلی در طی این طرح نمونه‌های مربوط به ۱۷۳ مرغداری مبتلا

مقدمه

بیماریهای تنفسی از جمله جدی ترین بیماری‌هایی هستند که طیور را تحت تأثیر قرار می‌دهند. این بیماری‌ها از یک طرف به علت تلفات و از طرف دیگر به دلیل ایجاد اختلال در متابولیسم حیوان و بنابراین کاهش رشد و تولید، خسارت اقتصادی قابل توجهی را به صنعت مرغداری وارد می‌نمایند. گذشته از این سهم بسزایی از داروهای مصرفی در این صنعت، به منظور پیشگیری و یا رفع مشکلات تنفسی گله مورد استفاده قرار می‌گیرد(۱). عوارض تنفسی غالباً در نتیجه مجموعه‌ای از عوامل عفونی از قبیل ویروسها، باکتریها، قارچها و همچنین فاکتورهای مدیریتی ایجاد می‌گرددند.

در سال ۱۹۹۱ یک باکتری گرم منفی پلئومورف که امکان طبقه‌بندی آن در هر یک از گروههای شناخته شده باکتریها وجود نداشت، از ارگانهای مرغ‌های گوشتی بیمار در آفریقای جنوبی جدا گردید. در ابتدا باکتری به عنوان یک شبیه پاستورلا قلمداد گردید. ولی بعداً تحت عنوان اورنیتوباکتریوم نامگذاری شد. وجود این باکتری در طیور صنعتی و پرندگان وحشی بیانگر این است که این باکتری یک شیوع جهانی دارد(۱۵). اولین مورد جداسازی باکتری از بوقلمون در آلمان صورت گرفته است(۱). همچنین باکتری برای اولین بار از مرغ‌های گوشتی همراه با عالم تنفسی خفیف در قسمت فوقانی دستگاه تنفس جدا گردید(۱۲). در مکزیک آن را ز مرغ‌های گوشتی و تخم‌گذار با عالم تنفسی شبیه کوریزا چدانموده‌اند(۹). در اردن باکتری از طیور گوشتی مبتلا به التهاب کیسه‌های هوایی جدا شده



جدول ۲- میزان شیوع اورنیتوباکتریوم در گلهای گوشتی مبتلا به عوارض تنفسی در استان مرکزی (سال ۱۳۸۲).

فراوانی نسبی %	فراوانی مطلق	وجود اورنیتوباکتریوم
مجموع %		
۹/۸	۱۷	موارد مثبت
۹۰/۲	۱۵۶	موارد منفی
۱۰۰	۱۷۳	جمع

جدول ۳- میزان شیوع اورنیتوباکتریوم در گلهای طیور گوشتی مبتلا به عوارض تنفسی براساس محل نمونه گیری (سال ۱۳۸۲).

مجموع %	فراوانی نسبی %	فراوانی مطلق	میزان شیوع اورنیتوباکتریوم	محل نمونه‌گیری
%	منفی %	مثبت %	منفی	مثبت
۱۰۰	۱۰۰	۰	۵	آشتیان
۱۰۰	۹۴/۶	۵/۴	۳۵	اراک
۱۰۰	۱۰۰	۰	۳	تفرش
۱۰۰	۸۳/۳	۱۶/۷	۱۵	خمین
۱۰۰	۸۹/۹	۱۱/۱	۲۴	دليجان
۱۰۰	۸۳/۴	۱۶/۶	۱۰	ساوه
۱۰۰	۹۰/۹	۹/۱	۲۰	شازند
۱۰۰	۷۶/۹	۲۳/۱	۱۰	فراهان
۱۰۰	۹۴/۵	۵/۵	۳۴	محلات

جدول ۴- میزان شیوع اورنیتوباکتریوم در گلهای طیور گوشتی مبتلا به عوارض تنفسی براساس فصل (۱۳۸۲).

مجموع %	فراوانی نسبی %	فراوانی مطلق	میزان شیوع اورنیتوباکتریوم	فصل
%	منفی %	مثبت %	منفی	مثبت
۱۰۰	۹۵/۹	۴/۱	۴۷	۲
۱۰۰	۸۷/۹	۱۲/۱	۱۰۹	۱۵

جدول ۵- نتایج مربوط به آزمایش تعیین حساسیت ۱۰ ایزوله اورنیتوباکتریوم به آنتی بیوتیکها را نشان می دهد (سال ۱۳۸۲).

فراوانی ایزوله های مقاوم %	فراوانی ایزوله های نسبتاً حساس %	فراوانی ایزوله های حساس %	نام دارو
۱۰	-	۹۰	داکسی سایلکلین
۲۰	-	۸۰	فلور فنیکل
۲۰	۱۰	۷۰	تری متوبیریم سولفاماتازول
۱۰	۲۰	۷۰	انروفلوكسازین
۲۰	۲۰	۶۰	سفنتیوفور
۳۰	۱۰	۶۰	کلرآمفینیکل
۱۰	۵۰	۴۰	فلومکونین
۷۰	۲۰	۱۰	تالیوزین
۷۰	۲۰	۱۰	لینکواسپکتین

نتیجه مربوط به آزمایش تعیین حساسیت ۱۰ ایزوله اورنیتوباکتریوم (آنٹی بیوگرام) ۱۰ ایزوله باکتری در جدول ۵ آورده شده است.

بحث

همان طوری که در جدول ۲ مشاهده می شود میزان شیوع اورنیتوباکتریوم

به عوارض تنفسی مورد بررسی قرار گرفت.

جدا سازی و تعیین هویت باکتری: در این قسمت با استفاده از لوب میکروبی، از داخل نای و ریه مرغ هانمونه برداری شده و بروی آگار خون دار گوسفندی حاوی جنتاماکسین (۱۰ میکروگرم در هر میلی لیتر) و همچنین آگار مک کانگی کشت داده شد. محیط های آگار خون دار در داخل جار بیهوده و تحت شرایط میکروآئروفیلیک در دمای ۳۷ درجه سانتیگراد قرار گرفت پس از مشاهده کلنی های مشکوک در محیط کشت و بعد از رنگ آمیزی، از آزمایش های تکمیلی بیوشیمیابی جهت تعیین هویت باکتری جدا شده استفاده به عمل آمد. در این مطالعه به منظور تعیین هویت اورنیتوباکتریوم رینوتراکتال از تستهای بیوشیمیابی کاتالاز، اکسیداز، اندول، اوره آز، نیترات، ژلاتیناز و آزمایش تخمیر قندهای گلوکز، لاکتوز، مالتوز، مانیتول، آراینزو و سوکروز استفاده به عمل آمد (جدول ۱).

آزمایش تعیین حساسیت به ترکیبات ضد باکتریالی: به منظور تعیین حساسیت اورنیتوباکتریوم های جدا شده در طی طرح حاضر در شرایط آزمایشگاهی از روش انتشار دیسک کربی - باور استفاده به عمل آمد (۸). آزمایش مذکور بروی ۱۰ جدایه باکتری صورت پذیرفت.

نتایج

نتیجه مربوط به بررسی نمونه های مربوط به ۱۷۳ مرغداری گوشتی مبتلا به بیماری تنفسی در سطح استان در جدول ۲ آورده شده است. در جدول ۳ میزان شیوع باکتری براساس محل نمونه گیری ارائه شده است.

جدول ۴ میزان شیوع باکتری براساس فصول را نشان می دهد.

جدول ۱- خواص بیوشیمیابی اورنیتوباکتریوم رینوتراکتال جدا شده از استان مرکزی.

نوع آزمایش	نتیجه
کشت در ژلوز خوندار همراه با جنتاماکسین	+
کشت در محیط مک کانگی	-
رشد هوایی	+
رشد در شرایط میکروآئروفیلیک	+
رنگ آمیزی	گرم منفی، پلیومورف شدید
کاتالاز	-
اکسیداز	+
اندول	-
اوره	-
احیای نیترات	-
ژلاتیناز	-
گلوکز	+
لاکتوز	+
مالتوز	+
سوکروز	+
آراینزو	+
مانیتول	-



در بررسی حافظنشان داده شد که ۹۰٪ از صدسویه‌های جداشده از آلمان به انوفلوکسائین، نئومایسین، جنتامایسین و تری متواپریم + سولفامتاژول مقاوم بوده و تمامی سویه‌های مورد بررسی در مقابل تتراسایکلین، کلارامینیکل و آموکسی سیلین حساس می‌باشدند^(۴). در صورتی که در مطالعه حاضر ۷۰٪ در صدار سویه‌های مورد آزمایش نسبت به آنتی بیوتیک انوفلوکسائین کاملاً حساس بودند.

تحقیقات انجام شده در آمریکا، مکزیک و هلند، افزایش میزان سویه‌های مقاوم باکتری به آنتی بیوتیک‌ها در طی گذشت زمان را نشان می‌دهد^(۱۰، ۱۶). گزارش‌های فوق و نتایج طرح حاضر نشان دهنده این است که اولاً سویه‌های جدا شده در مناطق جغرافیایی مختلف از نظر حساسیت به آنتی بیوتیک‌ها متفاوت‌می‌باشند و ثانیاً به دلیل ایجاد مقاومت با گذشت زمان، انجام متناوب تست‌های حساسیت در ارتباط با سویه‌های جدا شده لازم می‌باشد. کنترل عوارض مربوط به اورنیتوباکتریوم در صنعت طیور به دلیل توانایی این عامل در توسعه سریع مقاومت دارویی، پیچیدگی خاصی داشته و لذا توجه به مسائل زیر می‌تواند در کاهش مشکلات مربوطه موثر باشد.

۱- ارتقاء کیفیت محل نگهداری طیور و مدیریت پرورش براساس موازین بهداشتی.

۲- استفاده از واکسن مناسب (ترجیح‌آمیخته شده از سویه‌های بومی) لازم به تذکر است در حال حاضر واکسن به صورت تجاری موجود بوده و از جهت واکسیناسیون مرغان مادر استفاده به عمل می‌آید.

۳- انجام متناوب آزمایش‌های حساسیت میکروبی (آنتی بیوگرام) به منظور حصول نتایج بهتر از آنتی بیوتیک تراپی.

تشکر و قدردانی

مقاله حاضر از طرح تحقیقاتی با عنوان «بررسی شیوع اورنیتوباکتریوم رینوتراکتال در گله‌های مرغ گوشته ایستان مرکزی» که در کارگروه پژوهش و فناوری استان مرکزی به تصویب رسیده است استخراج شده و اعتبار طرح مذکور توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی تأمین گردیده است. بدینوسیله از همکاران ذیل که ما را در اجرای طرح مذکور باری نموده‌اند تشکر و قدردانی می‌نماییم.

۱- مهندس ابراهیمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی
۲- دکتر حمزه لوئیان رئیس بیمارستان دامپزشکی مرکزی اراک ۳- سرکار خانم بیگی مسئول آزمایشگاه تشخیصی دامپزشکی محلات^(۴)- آقای آخانی مدیر محترم پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی ۵- آقای احمدی کارشناس آزمایشگاه تحقیقات دامپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی.

در گله‌های مرغ گوشته مبتلا به عوارض تنفسی در استان مرکزی بر اساس نتایج حاصله از آزمایش‌های کشت میکروبی ۹/۶ درصد تعیین گردیده است.

در طی بررسی که در ترکیه بر روی تعداد ۹۶ نمونه نای ارسالی از کشتارگاه انجام شد اورنیتوباکتریوم رینوتراکتال از ۱۱/۴۶ درصد نمونه‌ها جدأگردید^(۱۶).

در اردن نیز ۸/۸ درصد از باکتریهای جدا شده از ۱۰۰ مزرعه مرغداری گوشته مبتلا به التهاب کیسه‌های هوایی شامل اورنیتوباکتریوم رینوتراکتال بوده است^(۳).

همان طوری که گفته شد اولین گزارش مربوط به جداسازی این باکتری در گله‌های طیور ایران در سال ۱۳۷۹ توسط بنانی و همکاران ارائه گردیده است^(۱). گزارش‌های موجود در زمینه بررسی سرمی نیز آمار و ارقام متفاوتی را نشان می‌دهد. در طی بررسی سرمی انجام شده در آمریکا، وجود آنتی بادی در ۹۰ درصد گله‌های تخم‌گذار و ۴۳ درصد گله‌های پولت تشخیص داده شده است^(۵).

در برزیل وجود آنتی بادی اورنیتوباکتریوم در ۶۳/۸ درصد از گله‌های مرغ گوشته تشخیص داده شد^(۲).

در ترکیه نیز در طی بررسی انجام شده بر روی ۳۸۴ نمونه سرم خون مرغ‌های کشتار شده در کشتارگاه، وجود آنتی بادی اورنیتوباکتریوم در ۴/۶ درصد از نمونه‌ها تعیین گردید و این در حالیست که باکتری تنها از ۱۱/۴۶ درصد از نمونه‌ها جداسازی شده است^(۱۶).

گزارش‌های موجود و نتایج طرح حاضر بر شیوع سراسری اورنیتوباکتریوم و دلالت آن در بروز عوارض تنفسی در مرغ‌های گوشته دلالت می‌کند. همان طوری که در نتایج طرح حاضر مشاهده می‌شود (جدول ۴) میزان شیوع باکتری در فصول سرمه‌سال (پاییز و زمستان) به میزان قبل توجهی بالاتر از میزان شیوع آن در فصول گرم و معتدل (بهار و تابستان) می‌باشد که این مسئله احتمالاً به دلیل وجود شرایط مناسب ابتلا گله‌ها به عوارض تنفسی در فصول سرد می‌باشد.

همچنین در طی مطالعه انجام شده بر روی میزان ماندگاری اورنیتوباکتریوم در پوشال و کاه استریل شده کف مرغداری مشخص شده که میزان بقاء باکتری در دمای پایین به مراتب بالا بوده و احتمالاً یکی از دلایل افزایش وقوع آلوودگی با باکتری در فصول سرد، قابلیت بقاء این عامل در دمای پایین می‌باشد^(۶).

در ارتباط با نتایج حاصل از آزمایش تعیین حساسیت به آنتی بیوتیک‌ها (جدول ۵) همان طوری که مشاهده می‌شود باکتریهای جداشده از مزارع مرغداری استان مرکزی به ترتیب نسبت به داکسی سایکلین، فلورنینیکل، انوفلوکسائین، تری متواپریم + سولفامتاژول، سفتیوفور، کلارامینیکل و فلومکوئین حساس بوده و غالباً نسبت به لینکو اسپکتین و تایلوزین مقاوم می‌باشد.

در طی تحقیقات انجام شده توسط بنانی و همکاران بر روی باکتریهای جدا شده از یک گله گوشته و تخم‌گذار، مقاومت باکتریهای جدا شده به آنتی بیوتیک‌هایی از قبیل تری متواپریم + سولفامتاژول، تتراسایکلین و داکسی تتراسایکلین مشخص گردید در صورتی که در بررسی حاضر ۷۰٪ درصد باکتریهای جدا شده نسبت به تری متواپریم + سولفامتاژول حساس بوده‌اند^(۱).



References

1. Banani, M., Khaki, P., Goodarzi, H., Vand Yoisefi, J., Pourbakhsh, S.A.(2000) Isolation and identification of *Ornithobacterium rhinotracheale* from a broiler and a Pullet flock. *Pajouhesh-va-Sazandegi*. 46:106-109.
2. Canal,C.W., Leao, J.A.,Ferreira, D.J., Macagnan,M., PippiSalle,C.T. and Back, A .(2003) Prevalence of antibodies against *Ornithobacterium rhinotracheale* in broilers and breeders in southern Brazil. *Avian Dis.*47:731-7 .
3. EI-Sukhon,S.N., Musa,A., Al-Attar,M.(2002) studies on the bacterial etiology of airsaculitis of broilers in northern and middle Jordan with special reference to *Escherichia coli*, *Ornithobacterium rhinotracheale*, and *Bordetella avium*. *Avian Dis.*A6,3:605-12.
4. Hafes, H.M. (1996) Current status on the role of *Ornithobacterium rhinotracheale* in respiratory disease complexes in poultry. *Archiv fur Geflagelkunde*. 61:208-211.
5. Heeder, C.J., Lopes,V.C., Nagavaja, K.V., Shaw, D.P. and Halvorson, D.A .(2001) Sero prevalence of *Ornithobacterium rhinotracheale* infection in commercial laying hens in the north central region of the united states. *Avian Dis.* 45:1064-7.
6. Lopes, V.C., Velayudhan, B., Halvorson, D.A., Nagaraja, K.V.(2002) Survival of *Ornithobacterium rhinotracheale* in sterilized poultry litter. *Avian Dis.* 46: 1011- 4.
7. Malik, Y.S.,Olsen, K., Kamar, K., Gogal, S.M . (2003) In vitro antibiotic resistance profile of *Ornithobacterium rhinotracheale* strains from Minnesota turkeys during 1996-2002. *Avian Dis.* 47: 588-93 .
8. Quin, P.J., Carter, M.E., Makey, B., Carter, G.R.(1994) Clinical Veterinary Microbiology. Wolf Publication.
9. Soriano,V. E., Longinos, M. G, Navarrete, P. G, Fernandez, R.P. (2002) Identification and characterization of *Ornithobacterium rhinotracheale* isolated from Mexico. *Avian Dis.* A6: 686-90.
10. Soriano, V. E., Vera, N. A., Salado, C. R., Fernandes, R.P. and Blackall, P.J. (2003) In vitro susceptibility of *Ornithobacterium rhinotracheale* to several antimicrobial drugs . *Avian Dis.* 47: 476-80.
11. Sprenger, S.I., Halvorson, D.A., Nagaraja, K.V.,
- Spasojevic, R., Dutton, R.S. and Shaw, D.P.(2000) *Ornithobacterium rhinotracheale* infection in commercial laying-type chickens. *Avian Dis.* 44: 725-9.
12. Travers,A.F.(1990) Concomitant *Ornithobacterium rhinotracheale* and newcastle disease infection in broilers in south Africa. *Avian Dis.* 40:488-490.
13. Travers, A.F., Coetzee, L., Gammow, B.(1996) Pathogenicity differences between South African isolates of *Ornithobacterium rhinotracheale*. *Onderstepoort, J. Vet. Res.* 63:197- 207.
14. Turan, N.,AK, S. (2002) Investigation of the presence of *Ornithobacterium rhinotracheale* in chicken Turkeys and determination of the seroprevalence of the infection using the enzyme - linked immunosorbent assay. *Avian Dis.* 46: 442-6 .
15. VanVeen,L. (2003) Do we know the real impact of *Ornithobacterium rhinotracheale* infections. *Poultry International*. May , 42,5 .
16. Van Veen, L., Hartman, E., Fabri, T. (2001) In vitro antibiotic sensitivity of strains of *Ornithobacterium rhinotracheale* isolated in the Netherlands between 1996 and 1999 . *Vet. Rec.* 17;149,20: 611-3 .
17. Van Veen, L., Van Empel, P., Fabri,T.(2000) *Ornithobacterium rhinotracheale*: a primary pathogen in Broilers . *Avian Dis.* 44:896-900.



SURVEY OF PREVALENCE OF *ORNITHOBACTERIUM RHINOTRACHEALE* IN BROILER FARMS AFFECTED WITH RESPIRATORY DISORDERS IN MARKAZI PROVINCE

Ghaemmaghami, S.H.^{1*}, Vande Yousefi, J.², Nirooumand, H.³, Monsefi, A.³, Ahmadloo, S.⁴

¹Razi Institute Arak branch, Tehran-Iran.

²Razi Institute Karaj, Tehran-Iran.

³Private Clinician, Tehran-Iran.

⁴General office of Veterinary Medicine of Markazi province.

(Received 11 June 2005 , Accepted 30 December 2006)

Abstract:

Respiratory diseases are considered as common disorders in broiler farms. Over the past decade a pleomorphic gram negative bacteria which isolated from broilers with respiratory diseases now calls *ornithobacterium rhinotracheale*. In this study, samples from trachea and lung collected from chicken with clinical respiratory signs in 173 broiler farms and then subjected on bacterial culture. The bacteria were identified using specific biochemical tests. The *ornithobacterium rhinotracheale* was isolated from 17 samples (9/8%). in addition sensitivity of isolated bacteria against different antibiotic was examined with kerby- bauer method. As results most of the isolates were sensitive to doxycycline antibiotic. Therefore, biosecurity and vaccination in breeders is recommended.

Key words: Prevalence, *ornithobacterium rhinotracheale*, broiler, respiratory disorders.

*Corresponding author's email: ghaemagham@yahoo.com, Tel: 0862- 3273703-4, Fax: 0862-3273705

