

حرکت

شماره ۲۷، صص: ۱۸۸ - ۱۷۳

تاریخ دریافت: ۸۴/۱۲/۱۴

تاریخ تصویب: ۸۵/۰۱/۲۶

تأثیر مصرف مکمل های گلوتامین و کراتین بر عملکرد ورزشی کشنی گیران نخبه پس از یک دوره کاهش وزن حاد

دکتر علی اکبرنژاد^۱ - دکتر علی اصغر رواسی - دکتر نوراندخت امینیان - دکتر عیسی نورمحمدی
حضور میان علمی دانشگاه تهران - دانشیار دانشگاه تهران - استادیار دانشگاه تهران - دانشیار دانشگاه
علوم پزشکی ایران

چکیده

هدف این تحقیق تأثیر مصرف مکمل های گلوتامین و کراتین بر عملکرد ورزشی کشنی گیران آزاد کار نخبه پس از یک دوره کاهش وزن حاد بود. جامعه آماری را کشنی گیران نخبه تشکیل می‌دادند که ۲۱ نفر از آنان به صورت داوطلب با میانگین سن 25.0 ± 9.4 سال، وزن 70 ± 5.0 کیلوگرم، قد 170 ± 5.0 سانتی‌متر و $BMI = 25.0 \pm 2.7$ بودند. عنوان نمونه آماری انتخاب و به سه گروه هفت نفره تقسیم شدند. ایندا از آزمودنی‌های سه گروه آزمون های عملکرد ورزشی (توان هوایی، آستانه و تحمل لاقات) با استفاده از دستگاه تحریه و تحلیل گازهای تنفس (Zelma K) و دستگاه نوارگردان برای مشخص کردن مقادیر پایه متغیرها به عمل آمد. گروه اول، در دوره شش روزه کاهش وزن و پس از آن در دوره ۱۶ ساعت برگشت به حالت اولیه پیچ مکمل مصرف نکردند. گروه دوم، در دوره کاهش وزن و برگشت به حالت اولیه، مکمل گلوتامین و گروه سوم، در دوره کاهش وزن گلوتامین و در دوره برگشت به حالت اولیه گلوتامین و کراتین مصرف کردند. برای تعیین تأثیر کاهش وزن و مصرف مکمل ها بر متغیرهای عملکرد ورزشی، پار دیگر آزمون های عملکرد ورزشی به عمل آمد. برای تحلیل داده ها از آزمون ^۱وابست، آزمون آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تفکیش شده استفاده شد. نتایج درون گروهی نشان داد در گروه کنترل متغیرهای عملکرد ورزشی کاهش یافتدند. ولی این کاهش از نظر آماری معنی دار نبود. در گروه گلوتامین نه تنها کاهش وجود داشت، بلکه افزایش اندک اما غیرمعنی دار نیز در تعامل متغیرها مشاهده شد. در گروه ترکیبی گلوتامین + کراتین در تعامل متغیرها افزایش وجود داشت که این افزایش در متغیر تحمل لاقات معنی دار بود مقایسه گروه ها نتایج متفاوت معنی داری بین دو گروه ترکیبی و کنترل را در متغیرهای توان هوایی و تحمل لاقات نشان داد. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان می‌دهد مصرف مکمل های گلوتامین در دوره کاهش وزن حاد و گلوتامین و کراتین در دوره بازگشت به حالت اولیه می‌توانند تأثیرات سودمندی بر عملکرد ورزشی داشته باشد.

واژه های کلیدی

کشنی گیران آزاد کار، کاهش وزن حاد، مکمل گلوتامین، مکمل کراتین و عملکرد ورزشی.

مقدمه

کشته از جمله ورزش هایی است که طبقه بندی وزنی دارد و ورزشکار باید روز قبل از مسابقه در وزن تعیین شده قرار گیرد. کشته گیران اعتقاد دارند که در رده وزنی پایین تر می توانند به موفقیت ورزشی بیشتری دست یابند. از این رو اغلب برای رسیدن به وزن مورد نظر راهکارهای مختلفی را مدنظر قرار می دهند (۱۲، ۲۱ و ۲۴). روش های اولیه مورد استفاده برای کاهش وزن^۱، شامل تمرینات ورزشی شدید، محدودیت غذایی و روش های مختلف آبردازی^۲ است. ضمن اینکه در صد کمی از کشته گیران برای کاهش وزن از مواد مدرن، تحریک کننده ها و ملین ها استفاده می کنند (۲۱، ۲۸، ۳۲ و ۳۹). روش های نامناسبی هم وجود داردند که کمتر به کار می روند و در آن حجمی از خون ورزشکار گرفته شده و پس از وزن کشی دوباره تزریق می شود. همه روش های کاهش وزن به طور بالقوه وضعیت تغذیه ای، فیزیولوژیکی و عملکرد ورزشکار را تحت تأثیر قرار می دهد (۹). کاهش بیش از ۵ درصد وزن بدن ورزشکار در کمتر از ۷۲ الی ۹۶ ساعت بر عملکرد هوایی "توان" استقامت عضله، قدرت عضله بویژه در گروه های عضلات درشت اندام های تحتانی، تمرکز روانی، سیستم ایمنی و قابلیت تنظیم دمای بدن تأثیر منفی می گذارد (۱۰، ۲۰، ۲۳، ۲۴، ۲۶ و ۳۵). کاهش وزن وضعیت تغذیه ای پروتئین را کاهش و وضعیت هورمونی را تغییر می دهد. پیامدهایی چون آمبولی ریوی و پانکراتیتیس^۳ در پی دارد و از رشد و تکامل طبیعی بدن جلوگیری می کند (۱۱، ۱۷ و ۲۰).

نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهد که این عوامل موجب بروز اختلال در تندرنستی و عملکرد ورزشکار می شود. مطالعات نشان داده اند فرایند کاهش وزن در بین یک سوم کشته گیران بیش از ۱۰ بار در طول سال تکرار شده است. این موضوع موجب نگرانی متخصصان تندرنستی، دانشمندان علوم ورزشی، مریبان و والدین شده است (۳۷).

به تازگی نشان داده شده هنگام فعالیت های ورزشی شدید، تمرینات سنگین، خستگی مزمن، آسیب های عضلانی و شرایط کاهش وزن، گلوتامین پلاسمای عضلات اسکلتی کاهش می یابند.

1 - Wight Loss

2 - Dehydration

3 - Pancreatitis

(۳). از آنجا که گلوتامین فراوان ترین اسید آمینه آزاد بدن انسان است و ۵۰ تا ۶۰ درصد کل ذخایر اسیدهای آمینه آزاد در عضله اسکلتی و حدود ۲۰ درصد ذخایر اسیدهای آمینه پلاسمای را تشکیل می‌دهد، برای هموستاز (شامل تعادل مایعات، PH و تنظیم حرارت بدن و ضربان قلب) و عملکرد مطلوب تعدادی از بافت‌های بدن بویژه سیستم ایمنی و روده ضروری است. همچنین گلوتامین در انتقال نیتروژن از عضوی به عضو دیگر درگیر است و به طور مستقیم بر تعادل ساخت پروتئین (فرایند آنابولیک) و تجزیه پروتئین (فرایند کاتابولیک) تأثیر می‌گذارد (۱۲ و ۱۳). گلوتامین ممکن است در رژیم غذایی از نظر کمی و کیفی بویژه در زمان هایی که محدودیت غذایی وجود دارد، به دست نماید در مواقعی که بدن قادر به تولید مقدار مورد نیاز آن نباشد، نیاز به آن افزایش می‌یابد (۱۳، ۱۴ و ۲۷).

نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد کراتین که هم در داخل بدن از اسیدهای آمینه ساخته می‌شود و هم از طریق رژیم غذایی بدست می‌آید و استفاده خارجی آن با افزایش میزان بازسازی ATP هنگام فعالیت‌های ورزشی شدید و همین طور با افزایش ذخیره PCR هنگام دوره برگشت به حالت اولیه همراه است. می‌تواند مؤثر ترین روش برای بازسازی ذخایر انرژی به تأخیر انداختن خستگی و بهبود عملکرد ورزشی باشد (۲، ۱۴ و ۱۵).

بیشتر مطالعاتی که ارزش انرژی زایی مکمل کراتین را بررسی کرده اند، افزایش معنی‌داری را در قدرت، توان و یا کار انجام شده هنگام مجموعه‌ای از انقباضات عضلانی با تلاش بیشینه گزارش کرده اند (۷ و ۲۱). با توجه به قوانین فعلی رشتة کشتی که ورزشکار باید ۵ تا ۶ مسابقه پرفشار را در یک روز به انجام برساند و همچنین با توجه به زمان محدود پس از وزن کشی تا شروع مسابقات، یافتن راهبردهایی برای جلوگیری از کاهش توده خالص بدنی و سایر آثار منفی کاهش وزن و همچنین بازسازی ذخایر انرژی و تولید توان بیشتر و حفظ آن برای وله‌های بعدی فعالیت، برای ورزشکارانی که وزن کم می‌کنند، بویژه کشتی گیران، اهمیت ویژه‌ای دارد. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که آیا مصرف مکمل‌های گلوتامین و کراتین می‌توانند آثار منفی کاهش وزن بر عملکرد ورزشی را از بین ببرد یا کاهش دهد.

روش تحقیق جامعه و نمونه آماری


روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی است و جامعه آماری آن را کشتی گیران نخج آزادکار تشکیل می دهند که براساس اهداف تحقیق از بین آنها ۲۱ نفر به صورت داوطلب به عنوان نمونه آماری انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه هفت نفره تقسیم شدند.

گروه اول (گروه کترل) فقط وزن کم کردند و هیچ مکملی دریافت نکردند، گروه دوم (گروه مکمل گلوتامین)، به همراه کاهش وزن و پس از آن در دوره برگشت به حالت اولیه مکمل گلوتامین مصرف کردند. گروه سوم (گروه گلوتامین و کراتین) نیز در دوره کاهش وزن مکمل گلوتامین و در دوره برگشت به حالت اولیه گلوتامین و کراتین مصرف کردند.

روش جمع آوری اطلاعات

ابتدا از آزمودنی های هر سه گروه برای مشخص کردن مقادیر پایه متغیرها، آزمون های عملکرد ورزشی (توان هوایی، آستانه لاقتات و تحمل لاقتات) به عمل آمد. سپس یک دوره شش روزه کاهش وزن از طریق محدودیت غذایی، فعالیت ورزشی و روش های مختلف آبزدایی انجام شد که در آن ۶ درصد وزن بدن کشتی گیران کاهش یافت (روش های معمول که توسط کشتی گیران زده در شرایط واقعی به کار گرفته می شود).

پس از آن یک دوره بازگشت به حالت اولیه ۱۶ ساعته داشتند که بعد از آن بار دیگر آزمون عملکرد ورزشی به عمل آمد تا تأثیر کاهش وزن و همچنین مصرف مکمل ها بر متغیرها مشخص شود.



آزمون های عملکرد ورزش اول = T_1

آزمون های عملکرد ورزش دوم = T_2

شکل ۱. طرح تجربی پژوهش

مقدار مصرف مکمل های غذایی

مقدار مصرف روزانه مکمل گلوتامین در دوره کاهش وزن و پس از آن در دوره برگشت به حالت اولیه ۰/۲ گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بود. مقدار مصرف کراتین نیز که در زمان برگشت به حالت اولیه مورد استفاده قرار می گرفت، ۰/۳ گرم به ازای هر کیلوگرم از وزن بدن تعیین شده است.

آزمون های عملکرد ورزشی

برای اندازه گیری حداقل اکسیژن مصرفی (توان هوایی) از دستگاه تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی (K_{O_2}) و دستگاه نوارگردان استفاده شد که با اندازه گیری مستقیم اکسیژن دمی و آزمون فراپینده ای که با سرعت Km/h شروع و هر دقیقه یک کیلومتر به سرعت آن اضافه می شد، تا حد واماندگی انجام و حداقل اکسیژن مصرفی ثبت شد. برای اندازه گیری آستانه و تحمل لاكتات از آزمون فراپینده روی دستگاه نوارگردان و دستگاه Kub از طریق میزان O_2 دمی و CO_2 بازدمی استفاده شد. با رسم نمودار این دو حجم و محاسبه نقطه قطع منحنی این دو و با رسم نمودار VE

(تهویه دقیقه ای) در مقابل VO_2 و تعیین نقطه شکست تهویه و مقایسه آن با نقطه قطع منحنی VO_2 و VCO_2 (حجم دی اکسید کربن بازدمی به اکسیژن دمی)، آستانه لاکات محسوبه شد. پس از رسیدن به حد آستانه تا زمان قطع آزمون یعنی رسیدن به واماندگی، زمان تحمل لاکات فرد محسوبه شد. میانگین دمای محل اندازه گیری در طول آجرای آزمون ها ۲۴ درجه سانتی گراد ثبت شد.

روش آماری

برای دسته بندی و توصیف اولیه داده ها از آمار توصیفی استفاده شد. آزمون آماری کولموگرف اسمیرنوف برای طبیعی بودن توزیع داده ها مورد استفاده قرار گرفت و برای تعیین تفاوت معنی داری درون گروهی در مراحل مختلف (پیش آزمون و پس آزمون) از تست t وابسته و برای مقایسه تفاوت بین گروه ها از آنالیز واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی شفه استفاده شد.

نتایج و یافته های تحقیق

در اینجا نتایج مربوط به مشخصات بدنی و ویژگی های آزمودنی ها و سپس جداول مربوط به توصیف و تحلیل هر متغیر به ترتیب ارائه می شود.

جدول ۱_مشخصات بدنی و ویژگی های کلی آزمودنی ها

| تعداد | حداکثر | حداقل | انحراف استاندارد | میانگین | شاخص آماری متغیر |
|-------|--------|-------|------------------|---------|---------------------|
| ۲۱ | ۲۹ | ۱۸ | ۲/۵۰ | ۲۲/۲۳ | سن (سال) |
| ۲۱ | ۹۷/۰۰ | ۵۹/۷۰ | ۹/۴۰ | ۷۵ | وزن (Kg) |
| ۲۱ | ۱۸۱ | ۱۶۳ | ۵/۵۰ | ۱۷۰ | قد (cm) |
| ۲۱ | ۳۴/۴۰ | ۲۱/۹۰ | ۲/۷۰ | ۲۵/۸ | BMI |

جدول ۲ - میانگین، انحراف استاندارد، مقادیر P و t مشاهده شده در متغیر توان هوایی سه گروه در مرحله

پیش آزمون و پس آزمون

| مقدار t | مقدار P | پیش آزمون | | پس آزمون | | مراحل آزمون متغیرها و شاخص آماری توان هوایی ($ml/kg^{-1}/min^{-1}$) |
|-----------|-----------|-----------|-------|----------|-------|---|
| | | SD | M | SD | M | |
| - | - | ۴۷۴۸ | ۴۸۰۸ | ۶۷۷۵ | ۵۱۲۵ | |
| +/۷۹ | +/۴۴ | | | | | گروه کنترل |
| +/۱۰۸ | +/۹۳ | ۴/۹۹ | ۵۱/۳۳ | ۵/۸۷ | ۵۱/۰۸ | گروه مکمل گلوتامین |
| +/۱۱۷ | +/۲۸ | ۵/۳۰ | ۵۵/۴۸ | ۶/۲۸ | ۵۲/۰۱ | گروه مکمل های گلوتامین + کراتین |

بررسی های درون گروهی بین مراحل پیش و پس آزمون نشان داد که تغییرات در هیچ کدام از گروه ها از نظر آماری معنی دار نبوده است.

جدول ۳ - آزمون آنالیز واریانس یکطرفه برای متغیر توان هوایی

| مقدار P | مقدار F | میانگین مریعات | درجه آزادی | مجموع مریعات | منبع تغییرات |
|-----------|-----------|----------------|------------|--------------|---------------|
| +/۰۳* | ۲/۹۰ | ۹۶/۳۰ | ۲ | ۱۹۲/۶۰ | بین گروه ها |
| | | ۲۴/۳۵ | ۱۸ | ۴۳۸/۳۶ | داخلی گروه ها |
| | | | ۲۰ | ۶۳۰/۹۷ | جمع |

* نشانه معنی داری آماری است.

نتایج تحلیل ها نشان داد که بین میزان VO_{2max} سه گروه در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری وجود داشته است ($P = +/۰۳$).

جدول ۴ - آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه تفاوت بین گروهی

| گلوتامین + کراتین | گلوتامین | کنترل | مقایسه گروه ها |
|-------------------|------------|-------|-------------------|
| $P < +/۰۵$ | $P > +/۰۵$ | * | کنترل |
| $P > +/۰۵$ | * | - | گلوتامین |
| * | - | - | گلوتامین + کراتین |

آزمون تعییی شفه نشان داد که بین دو گروه کنترل و گروه ترکیبی گلوتامین و کراتین تفاوت معنی داری وجود دارد.

جدول ۵_ میانگین، انحراف استاندارد، مقادیر P و ا مشاهده شده در متغیر آستانه لاکتات سه گروه در مراحل پیش و پس آزمون

| مقادیر | P | مقادر P | پس - آزمون | | پیش - آزمون | | متغیرها و شاخص آماری آستانه لاکتات (bpm) | مراحل آزمون |
|--------|------|-----------|------------|--------|-------------|--------|---|---------------------------------|
| | | | SD | M | SD | M | | |
| - | - | - | ۹۱۰۸ | ۱۰۰ | ۱۰۱۰ | ۱۹۵/۸۵ | | گروه کنترل |
| ۱/۰۶ | ۰/۳۰ | | | | | | | گروه مکمل گلوتامین |
| ۰/۰۳ | ۰/۹۷ | | ۵ | ۱۵۸/۲۸ | ۲/۹۰ | ۱۵۸/۲۸ | | گروه مکمل های گلوتامین + کراتین |
| ۰/۷ | ۰/۴۹ | | ۵/۱۲ | ۱۶۲/۸۵ | ۵/۴۵ | ۱۶۰/۸۵ | | |

بررسی های درون گروهی بین مراحل پیش و پس آزمون نشان داد که تغییرات در هیچ کدام از گروه ها از نظر آماری معنی دار نبوده است.

جدول ۶_ آزمون آنالیز واریانس یک طرفه برای متغیر آستانه لاکتات

| مقادر P | F | مقادر F | درجه آزادی | مجموع مریعات | منبع تغییرات |
|-----------|------|---------|------------|--------------|--------------|
| ۰/۰۵۳ | ۲/۴۰ | ۱۰۸/۸۱ | ۲ | ۲۱۷/۶۲ | بین گروه ها |
| | | | ۱۸ | ۵۹۷/۰۶ | داخل گروه ها |
| | | | ۲۰ | ۷۴۴/۴۸ | جمع |

نتایج این تحلیل ها نشان داد که بین میزان آستانه لاکتات آزمودنی ها در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری وجود نداشته است.

جدول ۷_ میانگین، انحراف استاندارد، مقدار P و آ مشاهده شده در متغیر تحمل لاكتات سه گروه در مراحل پیش و پس آزمون

| مقدار ۱ | P | مقدار | پس_آزمون | پیش_آزمون | متغیرها و شاخص آماری | |
|-------------------|-------|-------|----------|-----------|----------------------|---------------------------------|
| | | | | | متغیرها و شاخص آماری | |
| تحمل لاكتات (min) | | | | | | |
| - | - | SD | M | SD | M | تحمل لاكتات (min) |
| ۱/۰۲ | ۰/۱۵ | ۱/۷۱ | ۴/۱ | ۱/۷۷ | ۵/۲۷ | گروه کنترل |
| ۰/۱۲ | ۰/۲۸ | ۱/۱۳ | ۰/۰۸ | ۱/۰۹ | ۴/۰۹ | گروه مکمل گلوتامین |
| ۲/۳۰ | ۰/۰۴* | ۱/۱۹ | ۸/۰۹ | ۰/۹۸ | ۰/۰۰ | گروه مکمل های گلوتامین + کراتین |

* نشانه معنی داری آماری است.

بررسی های درون گروهی در مراحل پیش و پس آزمون نشان داد در گروه ترکیبی گلوتامین و کراتین افزایش معنی داری وجود داشته است ($P = ۰/۰۴$)

جدول ۸_ آزمون آنالیز واریانس پکظرقه برای متغیر تحمل لاكتات

| مقدار P | F | مقدار | میانگین مریعات | درجه آزادی | مجموع مریعات | مربع تغییرات |
|-----------|------|-------|----------------|------------|--------------|--------------|
| ۰/۰۰۴* | ۷/۰۱ | | ۱۴/۰۷ | ۲ | ۲۸/۱۴ | بین گروه ها |
| | | | ۱/۸۷ | ۱۸ | ۳۳/۷۰ | داخل گروه ها |
| | | | | ۲۰ | ۶۱/۸۴ | جمع |

* نشانه معنی داری آماری است.

نتایج این تحلیل ها نشان داد که بین مقدار تحمل لاكتات سه گروه در مرحله پس آزمون تفاوت معنی داری وجود داشته است ($P = ۰/۰۰۴$).

جدول ۹_ آزمون تعقیبی شفه برای مقایسه تفاوت بین گروه ها

| مقایسه گروه ها | گلوتامین | کنترل | گلوتامین + کراتین |
|-------------------|------------|-------|-------------------|
| کنترل | $P < ۰/۰۱$ | * | |
| گلوتامین | $P > ۰/۰۵$ | - | |
| گلوتامین + کراتین | * | - | |

آزمون تعقیبی شفه نشان داد بین دو گروه کنترل و گروه ترکیبی گلوتامین و کراتین تفاوت معنی داری وجود دارد ($P < 0.05$).

بحث و نتیجه گیری

نتایج این تحقیق نشان می دهد کاهش وزن کشتی گیران وضعیت فیزیولوژیکی و عملکرد ورزشی آنان را تحت تأثیر قرار می دهد و موجب کاهش عملکرد هوایی و بی هوایی و دیگر عوامل می شود. این موضوع برای ورزشکاران رقابتی که در زمان مسابقه باید در بهترین شرایط فیزیولوژیکی برای اجرای مطلوب باشند. اهمیت ویژه ای دارد (۲۲، ۲۳ و ۴۰).

نتایج تحقیقات سیکواوتا و همکارانش (۲۰۰۲) در مورد جودوکاران رقابتی نشان داد، گروهی که کاهش وزن زیادتری داشتند در مقایسه با گروهی که کاهش وزن کمتری داشتند، توان هوایی آنها کاهش یافت (۳۴).

نیلسن و کوبیکا (۱۹۸۱) نیز کاهش ظرفیت هوایی در نتیجه کاهش ۶ درصدی وزن بدن کشتی گیران را نشان دادند (۲۹). نتایج پژوهش های اسکات و بستر (۱۹۹۰) نشان داد در کشتی گیرانی که ۴/۹ درصد وزن بدن خود را طی ۳۶ ساعت کم کردند، توان هوایی ۶/۷ درصد کاهش یافت. همچنین توان بی هوایی، آستانه لاكتات و تحمل لاكتات کشتی گیران در اثر کاهش وزن کاهش یافته است (۴۲). هیکنر و همکارانش (۱۹۹۱) نشان دادند ۴/۵ درصد کاهش وزن بدن طی سه روز منجر به کاهش تحمل لاكتات می شود (۱۸). در تحقیق حاضر نیز گروه کنترل که هیچ مکمل مصرف نکرده بودند، در اثر کاهش وزن، کاهش متغیرهای عملکرد ورزشی (توان هوایی، آستانه لاكتات و تحمل لاكتات) را نشان دادند که با نتایج تحقیقات مذکور همخوانی دارد.

محمدخانی (۱۳۷۹) در پژوهشی پر امون اثر کاهش ۴ درصدی وزن بدن به روش های آبزدایی و رژیم غذایی، تأثیر معنی داری بر استقامت قلبی تنفسی مشاهده نکرد (۴).

به طور کلی کاهش سطح مایعات و ذخایر گلیکوژن بدن، الکترولیت ها و تجزیه پروتئین را که در دوره کاهش وزن حاد روی می دهند، می توان در زمرة علل کاهش عملکرد برشمرد مشخص شده است جایگزینی مجدد آب در کمتر از ۲۴ تا ۴۸ ساعت به طور کامل امکان پذیر نیست. جایگزینی کامل گلیکوژن عضله تا ۷۲ ساعت به طول می انجامد و جایگزینی توده خالص بدن نیز

به زمان بیشتری نیاز دارد (۱۰، ۱۲، ۲۲ و ۴۴). در مورد مصرف مکمل گلوتامین در این پژوهش عملکرد ورزشی به میزان کمی بهبود یافت، ولی این افزایش از نظر آماری معنی دار نبود. علت احتمالی این عدم تغییرات منفی می تواند ضروری بودن اسیدآمینه گلوتامین برای بدن در زمان هایی که شرایط خاصی همچون استرس، سندروم بیش تمرینی و موقعي که روند طبیعی تغذیه با اختلال مواجه می شود (دوره کاهش وزن) باشد (۱۲ و ۲۷).

با توجه به اینکه تحقیقات نشان داده اند گلوتامین نقش سازنده ای در تنظیم گلوكز دارد و بعد از فعالیت ورزشی ذخایر گلیکوژن عضله و کبد تخلیه می شوند، گلوتامین به عنوان سویسترا برای تشکیل گلوكز و تنظیم کننده این فرایند، تولید گلوكز و ذخیره گلیکوژن عضله را افزایش می دهد (۱۶)، ضمن اینکه گلوتامین در سنتز پروتئین عضله اسکلتی نقش مهمی دارد و از سوی دیگر مهارکننده آنزیم های فرایند پروتولیز به شمار می رود (اثر گلوتامین به عنوان یک ماده آنتی کاتابولیک موجب تعديل آسیب های ناشی از نسبت بالای کورتیزول به تستسترون می شود) (۱۹).

نتایج این تحقیق در مورد مصرف مکمل ترکیبی گلوتامین و کراتین نشان می دهد که در همه متغیرهای عملکردی، افزایش از مرحله پیش آزمون به پس آزمون بوده که این افزایش در متغیر تحمل لاكتات معنی دار بوده است. همچنین اختلاف معنی داری بین این گروه و گروه کنترل در متغیرهای توان هوایی و تحمل لاكتات مشاهده شد.

در فرایندهای زیستی کراتین فسفات با آزاد کردن فسفات و انرژی نقش مهمی در حفظ شارژ انرژی سلولی دارد. افزایش سریع انرژی موجب می شود عضلات بتوانند در رشته هایی همچون کشتی، وزنه برداری، فوتبال آمریکایی و ... که به قدرت انفجاری نیاز دارد، اجرای بهتری داشته باشند. با مصرف کراتین بدن می تواند کراتین فسفات بیشتری تولید کند. این مسئله به بازسازی بیشتر عضله کمک می کند، در نتیجه عضلات قادر به کار بیشتر باشد بالاتر می گردد (۱). در سال های گذشته تحقیقات زیادی در مورد اثرهای مصرف کراتین بر استقامت ورزشکاران انجام شده است، در حقیقت ثابت شده که کراتین می تواند استقامت را هم افزایش دهد. در تحقیقی به گروهی از ورزشکاران به مدت ۵ روز، روزانه ۲۰ گرم کراتین و گروه دیگر دارونما داده شد. بنابر نتایج به دست آمده گروه اول قادر به انجام تمرینات ورزشی بیشتر و طولانی تری نسبت به گروه

دوم بودند. در تحقیق دیگری نشان داده شد که مکمل کراتین می‌تواند موجب افزایش قابل توجهی در آستانه اسیدلاکتیک از ۶۷ درصد به ۷۴ درصد شود (۱). البته تحقیق لوین بورک در مؤسسه ورزشی استرالیا، نشان داد هیچ پیشرفتی در شناگرانی که مکمل کراتین استفاده کرده بودند، مشاهده نشد که ممکن است به واسطه افزایش وزن شناگران حاصل از افزایش توده عضلانی باشد (۱).

اوپیک و همکاران (۲۰۰۲) بیز در تحقیقی بر روی کشتی گیرانی که ۴/۵ تا ۵/۳ درصد کاهش وزن داشتند و در دوره بازیافت با کراتین مکمل سازی کردند بودند. افزایش معنی‌داری در توان هوایی مشاهده کردند (۳۰). موجیکا (۲۰۰۰)، جاکوبسن (۱۹۹۷)، بی سکیو (۲۰۰۰)، کرايدر و همکاران (۱۹۹۸) و پژوهشگران دیگر نیز افزایش متغیرهای عملکردی بر اثر مصرف مکمل کراتین را در رشته‌های مختلف ورزشی نشان داده اند (۴۵) که با نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد. این تأثیرات مثبت همان طور که ویلیامز و برانچ (۱۹۹۸) نشان دادند، می‌تواند در نتیجه افزایش کل کراتین عضله^۱ (TCr) از طریق Cr خارجی باشد که می‌تواند با افزایش بازسازی ATP هنگام فعالیت‌های ورزشی و افزایش بازسازی PCR هنگام دوره برگشت به حالت اولیه همراه بوده و اثر انرژی زایی داشته باشد (۳۴ و ۳۶)، به طوریکه می‌تواند عامل مؤثری برای بازسازی ذخایر انرژی، به تأخیرانداختن خستگی و بهبود عملکرد ورزشی باشد (۲، ۱۴ و ۱۵).

به طور کلی نتایج این پژوهش نشان داد مصرف مکمل گلوتامین در دوره کاهش وزن حاد و گلوتامین و کراتین در دوره برگشت به حالت اولیه می‌تواند بر متغیرهای عملکرد ورزشی تأثیر معنی‌داری داشته باشد. چنانکه نشان داده شد مصرف این مکمل‌ها می‌تواند از افت ایجادشده در نتیجه کاهش وزن در بیشتر متغیرهای عملکرد ورزشی جلوگیری کند و حتی سبب بهبود آنها شود. البته اظهار نظر قطعی در مورد تأثیر مصرف این مکمل‌ها و نحوه تعامل آنها با آثار فیزیولوژیکی کاهش وزن و عملکرد ورزشی به تحقیقات بیشتری نیاز دارد.

منابع و مأخذ

۱. ادموند آر، بورک. (۱۳۸۲). "بازگشت به حالت اولیه مطلوب در ورزش". ترجمه نعیما خواجهی، حمید رجی، انتشارات دنیای حرکت، چاپ اول.
۲. ران موگان، میکائیل گلیسون، گرین هاف. (۱۳۸۰). "بیوشیمی فعالیت های ورزشی". ترجمه عباسعلی گائینی و همکاران، انتشارات سمت، چاپ اول.
۳. لاری تی. مکینون. (۱۳۸۲). "ایمونولوژی و ورزش". ترجمه طاهره موسوی و مجتبی عبدالهی، انتشارات دانشگاه امام حسین، چاپ اول.
۴. محمدخانی، جواد. (۱۳۷۹). "بررسی و مقایسه آثار کاهش وزن به دو روش آبزدایی و رژیم غذایی و منتخبی از آمادگی جسمانی و حرکتی کشتی گیران نخبه اوزان ۶۵ تا ۸۵ کیلوگرم". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت معلم.
5. ACSM "Position Stant on Weight Loss in Wrestlers". *Med. Sci Exerc.* 1996; Vol. 28, No.2, PP ix-xii.
6. American medical association . (1967). "Wrestling and weight control" . *J.A.M.A.* 201: PP:541-543.
7. Bocque, M.D.Lochmann, J.D.and Melrose, D.R.(2000). "Effects of oral creatine supplementation on muscular strength and body composition". *Medicine and science in sports and exercise.* 32;PP:654-58.
8. Brownell, K. D. Steen, S.N. and Wilmore, J.H. (1990). "Weight regulation practices in wrestlers: Analysis of metabolic and health effects". *Med.Sci Sports Exercise,* 59,PP:546-56.
9. Buschschluter S.(1977). "Games blood_ Letting swimming technique". 13:PP:99.
10. Coyle, E.F. and E Coyle .(1993). "Carbohydrates that speed recovery from training". *Physician Sports Med.* 21; PP:111-123.
11. Croyle, P.H.Place, R. A. and A,D,Hilgenberg. (1979). "Massive pulmona embolism in a school wrestler". *S.A.M.A.* 241:PP:827-8.
12. E,R.Optimal Muscle Recovery. (1999). "Aver publishing group", New York, PP:80-84.
13. Glutamine Peptide: (June 1996). "A New perspective in sports nutrition". DMV international business unit nutritionals communication. Pg.3.

14. Greenhaff, PL. Bodin, k. Saderlund, et al.(1995). "Effects of oral creatine supplementation on skeletal muscle phosphocreatine resynthesis" *Am J Physiol* ;266: PP: 725-30.
15. Greenhaff, PL.(1995). "Creatine and its application as an ergogenic aid". *Int J Sport Nutr;e*: PP: 94-101.
16. Hammarqvist, F. et al.(1990). "Alanyl-Glutamine Counteracts the Depletion of Free Glutamine and the postoperative Decline in protein Synthesis inskeletal Muscle" *Ann.Surg.* 212: PP:637-644.
17. Hansen,N.C. (1978). "Wrestling with making weight". *Physician Sports med.* 6: PP:106-111.
18. Hickner, R.C.Harswill, C.A.Welker,J.M.Scott, J.Roemminch, J.N.Costill, D,L: (1991). "Test development for the study of physical performance in wrestlers following weight loss". *Int. J.Sports Med.* 12(6): PP:557-62.
19. Hoogeveen, A.R.and Zonderland. M.L.(1996). "Relationships between Tesstosterone, cortisol, and performance in professional Cyclists". *Int. J.Sports Med.* 17: PP:423-428.
20. Horswill C,A,R,C,Hrcner,J,R, Scott, D,L, Costill. And D, Gould.(1990). "Wheight loss, dietary carbohydrate, modifications and high intensity physical performance". *Med.Sci.Sport Exerc.* 22: PP:470-476.
21. Houston, ME,D,A. Marrin, H.J.Green, and J.A, Thomson . (1981). "The effect of rapid weight reduction on physiological functions in wrestlers". *Physical sports med* 9:PP: 73-78.
22. Hultman, E. and L. Nilsson . (1973). "Liver glycogen as glucose – supplying source during exercise". *Limiting factors of physical performance* . PP:179-189.
23. Kelly, J.M.B,A, Gorney . and K,K,Kalm. (1978). "The effect of a collegiate westling season on body composition, cardiovascular fitness, and muscular strength, and endurance". *Med. Sci. Sports Exerc.* 10 : PP: 119-124.
24. Klinzing. J.E. and W, Karpowiez . (1986). "The effect of rapid weight loss and rehydration on a wrestling performance test". *J.Sports med.* 26: PP:149-145.
25. Kocak, S.Karu, U.(2003). "Effects of high dose oral creatine supplementation on anaerobic capacity of elite wrestlers". *J Sports Med phys Fitness*, 43: PP: 488-92.
26. kono, I, et al. (1988). "Weight reduction in athletes may adversely effect phagocytic function of monocytes" *Physician Sport med.* 16 :PP:56-65.

27. Lacey, J.M. and Wilmore, D.W. IS(1990). "Glutamine a conditionally essential amino acid". *Nutr. Rev.* 48:PP:297-309.
28. Lakin, J.A.S,N.Steen. and R. A. (1990). "Oppliger eating behaviors, weight loss methods, and nutritional practices of high school wrestlers". *J.Community nurs.* 7: PP:223-234.
29. Nielson, B.Kubica, R.(1981). "Physical capacity after dehydration and hyperthermia. Scand ".*J.Sports Sci.* 3(1).
- 30 . Oopik, V.Paasude, M. Timpmann, S.Medijainen , L.Ereline, J.Gapejeva, J.(2002). "Effects of creatin supplement ation during recovery from rapid body mass reduction on metabolism and muscle performance capacity in well-trained wrestlers". *Jsports Med Phys Fitness* ; 42:PP:330-9.
31. Oppliger, R. A. (1992). "Accuracy of body fat testing among high school wrestlers confirmed". *Med. Sci. Sports Exerc.* 24(suppl): S10.
32. Oppliger, R. A.G.L, Landry. S.A, Fofier . and A, C.Lambrecht.(1993). "Bulimic behaviors among high school wrestler: a statewide survey. *Pediatr*". *Res.* 94: PP:826-831.
33. Ribisl, P,M, and W, G, Herbert. (1970). "Effect of rapid weight reduction and subsequent rehydration upon the physical working capacity of wrestlers". *Res. Q.* 41:PP:536-541.
34. Seikouohita, et al. (2002). "Depressed humoral immunity after weight reduction in competitive judoists". *Luminescence*; 17: PP150-157 DOI : 10. 1002/Bio. 686.
35. Serfass, R.C.G, A, Stuff. J, F, Alexander and J, L, Ewing . (1984). "The effects of rapid weight loss and attempted rehydration on strength and endurance of the hand muscle in college wretnlers". *Res. Q.Exerc. Sports.* 55 :PP:46-52.
36. Snow, R.J., McKenna, M.J.Selig, S.E. (1998). "Effect of creatine Supplementation on Sporint Exercise Performance and Muscle Metabolism". *Journal of Applied Physiology*; 84: PP:1667-75.
37. Steen, S, N. and K, D, Brownell. (1990). "Patterns of weight loss and regain in wrestlers: Has the tradition changed". *Med. Sci. Sports Exerc.* 22: PP:262-268.
38. Steen,S,N and S, Mckinney. (1986). "Nutritional assessment of college wrestlers". *Physician Sport med.* 14: PP:100-116.
39. Steen, S.N. and A, Oppleger and K,D, Brownell. (1988). "Metabolic effects of repeated weight loss and regain in adolescent wrestlers". *J.A.M.A.* 260:PP:47-50.

-
40. Umeda, T.Nakaji, S.Shimoyama, T.Kojima , A. Yamamoto, Y. Sugawara, K. (2004). "Adverse effects of energy restriction on changes in immunoglobulin and complements during weight reduction in judoists " *J Sports Med phys Fitness*; 44: PP:328-34.
41. Viltasalo, J and Kyroelaeinenm, H.(1987). "Effetcs of rapid weight reduction on force production and vertical jmping hight" *Int. J.Sports Med. (Stuttgart)*. 8(4): PP:281-85.
42. Webster, S. R, Rutt. And A , Weltman. (1990). "Physiological effect of a wight loss regimen practiced by college wrestlers". *Med. Sci Sports Exercise.*, Vol.22, No 2, PP:229-34.
43. Williams . M.H, (1998). "Creatin Suplementeation and Exercise Performance ", *An Up to Date, J.American College of Nutrition*. 17: PP:210-234.
44. <http://www.acbsp.com> American chiropractic of sports physicians weight loss in wrestling, position paper, (Internet)
45. [http : // www. Jssm.org](http://www.Jssm.org) creatin supplementation and exercise performance : A brief reviw. *Journal of Sports Science and Medicine*. 2003; 2, PP:123-132.