



The Effect of Eight-Week Endurance, Resistance and High-Intensity Interval Training on SREBP-1 and 12.13-diHome Gene Expression in Male Obese Vistar Rats

Mohsen Akbari¹, Amir Rashidlamir², Nahid Bijeh³, Seyed Ali Reza Hosseini Kakhek⁴

1. Department of Sports Physiology, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.

Email: mohsen.akbari64@um.ac.ir.

2. Corresponding Author, Department of Sports Physiology, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran. Email: rashidlamir@um.ac.ir

3. Department of Sports Physiology, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
Email: bijeh@um.ac.ir.

4. Department of Sports Physiology, Faculty of Sports Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
Email: hosseini@um.ac.ir.

Article Info

ABSTRACT

Article type:

Research

Article history:

Received:

15 February 2023

Received in revised form:

3 May 2023

Accepted:

8 May 2023

Published online:

8 May 2023

Keywords:

12.13-diHOME,

Endurance,

HIIT,

Resistance,

SREBP-1.

Introduction: Obesity and overweight are metabolic disorders in which fat tissue levels are influential in this disorder. The current research aimed to investigate the effect of eight weeks of endurance, resistance, and high-intensity interval training on the SREBP-1 and 12.13.diHome gene expression in male obese Wistar rats.

Methods: In the current study, 36 obese male Wistar rats (eight weeks old rats with a weight of 325 ± 40 grams) were randomly divided into four Endurance ($n=10$), Resistance ($n=8$), High-Intensity Interval Training ($n=10$) and Control ($n=8$) groups. The rats in the experimental groups performed five sessions of endurance training at an intensity of 70-80% of the maximum speed, resistance training at an intensity of 50-120% of the body weight, and HIIT at an intensity of 85-90% of the maximum speed for eight weeks. To measure SREBP-1 and 12.13.diHome gene expression, the Real Time-PCR method was used. The statistical method of one-way analysis of variance with Tukey's post hoc test was used to determine the difference between groups at a significant level of $\alpha = 0.05$.

Results: The results of the present study showed that all three training models of endurance, resistance, and HIIT caused a significant increase in the expression of the 12.13.diHome gene and a significant decrease in SREBP-1 compared with the control group ($P < 0.05$), but no significant difference was observed among the experimental groups ($P > 0.05$).

Conclusion: To lose weight, it is suggested to use endurance, resistance, and HIIT training to reduce the expression of the SREBP-1 gene and increase 12.13.diHome, which are factors influencing lipolysis and lipogenesis.

Cite this article: Akbari M., Rashidlamir A., Bijeh N., & Hosseini Kakhek S.A.R. The Effect of Eight-Week Endurance, Resistance and High-Intensity Interval Training on SREBP-1 and 12.13.diHome Gene Expression in Male Obese Vistar Rats. *Journal of Sport Biosciences*. 2023; 15 (1): 87-103.

DOI: <http://doi.org/10.22059/JSB.2023.354848.1572>



Journal of Sport Biosciences by University of Tehran Press is licensed under [CC BY-NC 4.0](#).
| Web site: <https://jsb.ut.ac.ir/> | Email: jsb@ut.ac.ir



Extended abstract:

Introduction

In mammals, the liver and muscles are the main organs regulating glucose and fat metabolism (2). Fatty liver is regulated by several transcription factors including Sterol Regulatory Element Binding Proteins (SREBP). SREBPs play a major role in lipid metabolism, cell growth, cellular energy, inflammation, and other physiological and pathological products (3). SREBP-1c protein can be stimulated and activated through the insulin messenger cascade, which causes gene expression. It regulates the requirements for glucose metabolism, the production of acetyl-CoA, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, and the production of fatty acids and lipids. Inhibition of SREBP-1c activity inhibits mRNA expression of acetyl-co-diastase 1 (SCD1), acetyl-co-carboxylase 1 (ACC), fatty acid synthetase (FAS), and low-density lipoprotein receptors (LDLr) enzymes, which are responsible for part of the accumulation of fat levels in the body. The suppression of SREBP-1c by various factors protects the development of fatty liver (12). Another factor that plays a role in the absorption of fatty acids and glucose is the dehydroxylation derivatives of linoleic acid which is called 12.13-diHome. The levels of 12.13-diHome are directly related to body mass index, white fat mass, glucose, and fasting insulin, and it has an inverse relationship with brown fat mass, insulin sensitivity, the amount of absorption of fatty acids into the cell, and cause the activation of the transporter. Fatty acids such as trans-protein transporter 1 and differentiating cluster cells 36, leads to the entry of free fatty acids into the cell. This question was created for the researcher whether eight weeks of intense endurance, resistance, and high-intensity interval training affect the expression of SREBP-1 genes in the liver tissue and 12.13-diHome in the soleus muscle of obese male Wistar rats.

Methods

The current research was an experimental type, which was carried out by a laboratory method. The subjects of the present study were 8-week-old male Wistar rats with an average weight of 325 ± 40 grams. In one week of familiarization with the environment, all rats were exposed to the treadmill (10 minutes at a speed of 10 meters for five days a week) and the ladder for mice (36 steps with a slope of 58% and a height of one meter). Then the rats were randomly divided into four Endurance Training (ET), Resistance Training (RT), High-Intensity Interval Training (HIIT), and Control (CG) groups. The rats in the experimental groups performed five sessions of endurance training at an intensity of 70-80% of the maximum speed, resistance training at an intensity of 50-120% of the body weight,

and HIIT at an intensity of 85-90% of the maximum speed for eight weeks. To measure SREBP-1 and 12.13.diHome gene expression, the Real Time-PCR method was used. The statistical method of one-way analysis of variance (ANOVA) with Tukey's post hoc test was used to determine the difference between groups at a significant level of $\alpha = 0.05$.

Results

The results of a one-way analysis of variance showed that eight weeks of endurance, resistance, and HIIT training increased the expression of 12.13.diHome gene and decreased SREBP-1 in male Wistar rats. The results of Tukey's test showed that there was a significant difference in the expression of 12.13.diHome gene between each of the ET, RT, and HIIT groups and the CG ($P < 0.05$), but there was no significant difference between the experimental groups ($P > 0.05$). Also, the results of this test showed that there is a significant difference in SREBP-1 gene expression between each of the ET, RT, and HIIT groups and the CG ($P < 0.05$), but there was no significant difference between the experimental groups ($P > 0.05$).

Conclusion

Based on the results of this research, it can be concluded that endurance, resistance, and high-intensity interval training can reduce fat mass by influencing the factors affecting lipolysis and lipogenesis, while there was no difference between the types of training presented in this research. Therefore, it is suggested to use these exercises to reduce fat mass.

Ethical considerations

Compliance with ethical guidelines: All the steps of the present research were carried out according to the instructions of the ethics committee of the Ferdowsi University of Mashhad with the ethical code IR.UM.REC.1400.295.

Funding: Financial resources were provided by the authors.

Authors' contribution: The contribution of the authors in conducting this research has been the same.

Conflict of interest: The authors declared no conflict of interest.

Acknowledgments: The authors thank all the people who helped and supported us in this research.

تأثیر هشت هفته تمرينات استقامتي، مقاومتی و تناوبی شدید بر بیان ژن SREBP-1 و 12.13.diHome رت‌های نر ویستار چاق

محسن اکبری^۱ ، امیر رشیدلمر^۲ ، ناهید بیژه^۳ ، سید علی‌رضا حسینی‌کاچک^۴

۱. گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. رایانامه: mohsen.akbari64@um.ac.ir

۲. نویسنده مسئول، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. رایانامه: rashidlamir@um.ac.ir

۳. گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. رایانامه: bijeh@um.ac.ir

۴. گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران. رایانامه: hosseinik@um.ac.ir

چکیده

نوع مقاله: پژوهشی

مقدمه: چاقی و اضافه وزن یک اختلال متابولیکی است که سطوح بافت چربی در این اختلال تأثیرگذار است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هشت هفته تمرينات استقامتي، مقاومتی و تناوبی شدید بر بیان ژن پروتئین تنظیم‌کننده استرول متصل‌شونده به عنصر α و β ، در ۱۲، ۱۳ دی هوم رت‌های نر ویستار چاق بود.

روش پژوهش: در پژوهش حاضر، ۳۶ موش صحرابی نژاد ویستار نر چاق با سن هشت هفته و وزن 325 ± 40 گرم، به صورت تصادفي به چهار گروه استقامتي (۱۰ سر)، مقاومتی (۸ سر)، تناوبی شدید (۱۰ سر) و کنترل (۸ سر) تقسیم شدند. موش‌های گروه‌های تجربی به مدت هشت هفته، هفته‌ای پنج جلسه تمرينات استقامتي با شدت ۷۰ تا ۸۰ درصد سرعت بیشینه، مقاومتی با شدت ۵۰ تا ۱۲۰ درصد وزن بدن و تناوبی شدید با شدت ۸۵ تا ۹۰ درصد حداقل سرعت را انجام دادند و برای اندازه‌گیری بیان ژن SREBP-1 و diHome از روش Real Time-PCR استفاده شد. از واریانس یکطرفه و آزمون تعقیبی توکی برای تعیین اختلاف بین گروه‌ها در سطح معناداری $P < 0.05$ استفاده شد.

یافته‌ها: هر سه مدل تمرينی استقامتي، مقاومتی و تناوبی شدید سبب افزایش معنادار بیان ژن diHome، ۱۲، ۱۳ دی و کاهش معنادار SREBP-1 نسبت به گروه کنترل شد ($P < 0.05$). اما تفاوتی بین گروه‌های تجربی مشاهده نشد ($P > 0.05$).

نتیجه‌گیری: از تمرينات استقامتي، مقاومتی و تناوبی شدید با کاهش بیان ژن تنظیم‌کننده استرول متصل‌شونده به عنصر α و افزایش ۱۲، ۱۳ دی هوم که فاکتورهای تأثیرگذار بر لیپولیزند و در افزایش لیپولیز تأثیر دارند، به منظور کاهش وزن استفاده شود.

کلیدواژه‌ها:
استقامتي،
تناوبی شدید،
مقاومتی،
SREBP1
diHome ۱۲، ۱۳

استناد: اکبری، محسن؛ رشیدلمر، امیر؛ بیژه، ناهید؛ و حسینی کاچک، سید علی‌رضا. تأثیر هشت هفته تمرينات استقامتي، مقاومتی و تناوبی شدید بر بیان ژن SREBP1 و 12.13.diHome رت‌های نر ویستار چاق. نشریه علوم زیستی ورزشی. ۱۴۰۲، ۱۵(۱)، ۸۷-۱۰۳.

DOI: <http://doi.org/10.22059/JSB.2023.354848.1572>

دسترسی به این نشریه علمی، رایگان است و حق مالکیت فکری خود را بر اساس لاینسنس کریتیو کامنز (CC BY-NC 4.0) به نویسنده‌گان واگذار کرده است. آدرس نشریه: <https://jsb.ut.ac.ir/> | ایمیل: jsb@ut.ac.ir.



مقدمه

چاقی و اضافه وزن عوارض زیادی بر سیستم‌های بیولوژیک بدن می‌گذارد که به تغییرات پاتولوژیک فراوانی منجر می‌شود. یکی از اندام‌هایی که در این میان دچار آسیب‌ها، تغییرات عملکردی و فیزیولوژیک می‌شود، کبد است [۱]. در پستانداران کبد ارگان اصلی تنظیم‌کننده سوخت‌وساز گلوکز و چربی است [۲]. چربی کبد توسط تعدادی از فاکتورهای رونویسی از جمله پروتئین‌های اتصال‌دهنده عناصر تنظیم‌کننده استرول انتظامی می‌شود. SREBPs نقش اصلی در سوخت‌وساز لیپیدها، رشد سلولی، انرژی سلولی، التهاب و سایر فرآوردهای فیزیولوژیکی و پاتولوژیک ایفا می‌کند [۳]. SREBPs در پاسخ به کلسترول از شبکه اندوپلاسمی به دستگاه گلتری منتقل می‌شوند که در نهایت موجب بیان ژن‌هایی که اغلب در بیوستز استرول و چربی‌ها نقش دارند، می‌شوند [۴]. خانواده SREBPs شامل سه ایزوفرم SREBP-1a، SREBP-1c و SREBP-2 است که فاکتور اصلی تنظیم‌کننده ژن‌های لیپوژن کبد، SREBP-1c است. این فاکتور در سنتز تری‌گلیسرید دخالت دارد که اغلب در کبد، عضله و چربی وجود دارد و به عنوان قوی‌ترین فاکتور تنظیم‌کننده ژن‌های لیپوژنیک شناخته شده است و حدود ۶۹ ژن توسط آن بیان می‌شود [۵]. پروتئین SREBP-1c از طریق آبشار پیامرسان انسولین می‌تواند تحریک و فعال شود که بیان ژن‌های مورد نیاز برای سوخت‌وساز گلوکز، تولید استیل کوآ، نیکوتین آمید آدنین دی‌نوکلئیدفسفات^۱ و تولید اسیدهای چرب و لیپیدها را تنظیم می‌کند. انسولین از طریق مسیرهای mTOR و گیرنده X کبدی^۲ سبب تحریک، فعال شدن SERPB-1c و تحریک گلیکوژن و لیپوژن می‌شود [۶]. سطح بالای انسولین در خون به علت مقاومت به انسولین اغلب به سبب فعال شدن SREBP-1c، به استئاتوز کبدی منجر می‌شود که در افراد چاق نیز مشاهده شده است [۷]. همچنین در تومورهای سرطانی به علت اینکه غشای سلول به پیامرسان‌های ثانویه به منظور تولید انرژی از لیپید نیاز دارد، SREBP-1c بسیار فعال می‌شود. بر اساس نتایج تحقیقات مهار عملکرد SREBP-1c در بسیاری از شرایط پاتولوژیک مانند چاقی و اضافه وزن، تحریک^۳ اعصاب، بیماری‌های قلبی-عروقی و سرطان اهمیت فراوانی داشته و کاهش سطوح آن با بهبود روند سلامتی ارتباط دارد [۸]. مهار فعالیت SREBP-1c موجب مهار بیان mRNA آنزیم‌های استیل کوآکربوکسیلاز^۴، استیل کوآکربوکسیلاز^۵ اسید چرب سنتتاز^۶ و گیرنده‌های لیپوپروتئین‌های کم‌چگالی‌لمی شود که این آنزیم‌ها و گیرنده‌ها مسئول بخشی از تجمع سطوح چربی‌ها در بدن هستند [۹]. همچنین نتایج پژوهشی نشان داد که مسیر داخل‌سلولی SREBP-1c PPAR α /SREBP-1c/FAS/GPAT/AMPK مسیر اصلی در درمان کبد است [۱۰]. سرکوب SREBP-1c توسط فاکتورهای مختلف، از ایجاد کبد چرب محافظت می‌کند [۱۱]. در مجموع می‌توان گفت مهار فعالیت و پیامرسانی SREBP-1c سبب کاهش لیپوژن می‌شود.

از طرفی، فاکتورهای لیپوژنیک مانند SREBP-1c تحت تأثیر فعالیت‌های ورزشی قرار می‌گیرند. فعالیت‌های ورزشی بر اساس نوع و شدت، تأثیرات مختلفی بر سوخت‌وساز چربی‌ها می‌گذارد. در تحقیقی ۱۲ هفته تمرین هوایی سبب کاهش سطوح SREBP-1c در سلول‌های گردش خون محیطی شد [۱۲]. فعالیت ورزشی اغلب از طریق مسیر AMPK و کاهش تعداد گیرنده‌های A1 سطح کبد، موجب سرکوب مسیر لیپوژنیتیکی SREBP-1c کبد می‌شود [۱۳]. در واقع فعال شدن پلی‌مورفیزم اکتین وابسته به سلول چسبان E، مکانیزم‌های فعال شده توسط جریان ورود کلسیم به داخل سلول، تحریک مسیرهای وابسته به سایتواسکلتون‌ها و تغییرات ATP/ADP، موجب فعال شدن AMPK می‌شود. AMPK به عنوان یک گیرنده انرژی حین فعالیت‌های ورزشی، فعال شده و موجب مهار فعالیت SREPB-1c در مقابل، تمرینات هوایی به کاهش آن انجامید [۱۴]. علاوه‌بر این، آذربایجانی و همکاران (۲۰۱۶) در پژوهشی بیان کردند که تمرینات هوایی به کاهش بیان ژن SREBP1 منجر شد [۱۵]. یئونگ^۷ و همکاران (۲۰۱۲) نیز در پژوهشی مشاهده کردند که دو ماه تمرینات شنا سبب کاهش بیان ژن SREBP-1c و توده چربی در موش‌ها شد [۱۶]. اما هووان^۸ و همکاران (۲۰۱۸) تغییر معناداری را در سطوح SREBP-1c

¹. sterol regulatory element binding protein (SREBP)

². Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH)

³. Liver X receptor

⁴. Degeneration

⁵. Stearyl-CoA desaturase (SCD1)

⁶. Acetyl carboxylase (ACC)

⁷. Fatty acid synthetase (FAS)

⁸. low density lipoprotein receptor (LDLr)

⁹. AMP-activated protein kinase

¹⁰. Yeong

¹¹. Haun

۱c متعاقب هشت هفته تمرین مقاومتی در مردان و آسانو^۱ و همکاران (۲۰۱۹) [۲۰] تغییر معناداری در محتوای پروتئینی SREBP1 متعاقب تمرینات ورزشی همراه با رژیم غذایی ژاپنی، مشاهده نکردند. دوربرزین^۲ و همکاران (۲۰۱۰) گزارش کردند که تمرینات استقامتی تأثیری بر محتوای پروتئین SREBP-1c ندارد، اما دیگر آنزیمهای مؤثر بر اکسیداسیون عضلانی را افزایش داد [۲۱]. برخی تحقیقات نیز نشان داده‌اند که فعالیت‌های ورزشی از طریق مسیرهای mTOR/Akt/PI3K موجب فعال شدن SREBP-1c می‌شود [۲۲، ۲۳].

عضلات به عنوان یکی از ارگان‌های مؤثر بر تنظیم سوخت‌وساز بدن، مورد توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. عضلات اسکلتی توانایی زیادی در سوخت‌وساز چربی‌ها و کربوهیدرات‌ها دارند و با دیگر ارگان‌ها مانند بافت چربی تعامل زیادی جهت این فعل و انفعالات شیمیایی دارند [۲۴]. یکی از این فاکتورها که در جذب اسیدهای چرب و گلوکز نقش دارد، مشتقات دی‌هیدروکسیلاسیون اسیدلیپولیک^۳ است. ۱۲.۱۳-di.Home^۴ در ابتدا در موش‌ها به عنوان بخشی از استرس اکسیداتیو نوتروفیل‌ها شناسایی شد که ایزولوکوتوكسین^۵ یا پامیتولیت^۶ نیز نامیده می‌شود. ۱۲.۱۳-di.Home^۷ و ایزومر آن (۰.۹،۱۰-دی‌هوم) ابتدا از فرم ۱۲،۱۳ یا ۹،۱۰-اپی‌هوم^۸ از اسید لیپولیک^۹ توسط سیتوکروم P450 اکسید می‌شود و سپس توسط هیدرولیزهای اپوکسید،^{۱۰} به ۱۲.۱۳-di.Home^{۱۱} و ۹.۱۰-diHome^{۱۲} کاتالیز می‌شود [۲۵]. سطوح بالای ۱۲.۱۳-di.Home^{۱۳} در بافت چربی قهقهه‌ای نسبت به بافت چربی سفید گزارش شده است. سطوح ۱۲.۱۳-di.Home^{۱۴} با شاخص توده بدن، توده چربی سفید، گلوکز و انسولین ناشتا، ارتباط معکوس و با توده چربی قهقهه‌ای، حساسیت به انسولین و میزان جذب اسیدهای چرب به سلول ارتباط مستقیم دارد، اما با هموگلوبین گلیکولیزه شده^{۱۵} و پروتئین واکنشی^{۱۶} همبستگی معناداری ندارد. ۱۲.۱۳-di.Home^{۱۷} سبب فعال شدن انتقال‌دهنده‌های اسید چرب مانند انتقال‌دهنده ترانس پروتئین^{۱۸} و سلول‌های خوش‌های متمایز‌کننده^{۱۹} می‌شود که به ورود اسیدهای چرب آزاد به داخل سلول^{۲۰} می‌انجامد [۲۶].

تحقیقات نشان داده‌اند ۱۲.۱۳-di.Home^{۲۱} سبب کاهش تری‌گلیسیرید در گردش خون و افزایش بیان لیپوپروتئین لیپاز شد. این نتایج بیان می‌کنند افزایش سطوح ۱۲.۱۳-di.Home^{۲۲} به هیدرولیز تری‌گلیسیریدها منجر می‌شود. در واقع موش‌هایی که با ۱۲.۱۳-di.Home^{۲۳} درمان شدند، افزایش توده چربی قهقهه‌ای را تجربه کردند که این تغییرات مشابه با تغییرات ناشی از هورمون اپی‌نفرین و با افزایش بازجذب اسیدهای چرب و گلوکز در سلول‌های چربی قهقهه‌ای همراه بود. همچنین ۱۲.۱۳-di.Home^{۲۴} سبب فعال شدن پروتئین جفت‌نشده^{۲۵} در سلول‌های چربی قهقهه‌ای می‌شود که این افزایش بیان Zn^{۲+} های UCP1، به کاهش اسیدهای چرب آزاد و افزایش حالت ترموزنیک سلول‌های چربی قهقهه‌ای منجر شد. درمان با ۱۲.۱۳-di.Home^{۲۶} سبب بهبود افراد مبتلا به هایپرلیپیدمی^{۲۷}، افزایش تحریک mTOR، پروتئین شوک گرمایی^{۲۸} و نیتریک اکساید^{۲۹} می‌شود که در درمان بیماری‌های هایپرلیپیدمی و قلبی-عروقی مؤثر است [۲۸، ۲۷].

بررسی‌های انجام‌گرفته نشان می‌دهد که تمرینات ورزشی به افزایش سطوح ۱۲.۱۳-di.Home^{۳۰} منجر می‌شود. فوریست^{۳۱} و همکاران (۲۰۱۵) گزارش کردند که تمرینات استقامتی سبب افزایش ۱۲.۱۳-di.Home^{۳۲} و بهبود وضعیت عضلات قلبی شد [۲۹]. همچنین اسنفورد و همکاران (۲۰۱۸) بیان کردند تمرینات هوایی سبب افزایش تولید ۱۲.۱۳-di.Home^{۳۳} ۶ تا ۲۴ ساعت پس از تمرین، کاهش سطوح تری‌گلیسیرید و افزایش جذب اسیدهای چرب آزاد شد، اما تأثیری بر جذب گلوکز نداشت [۳۰]. اما نتایج متناقضی نیز وجود دارد؛ مورویل^{۳۴} و همکاران (۲۰۲۰) گزارش کردند که تنها تمرینات استقامتی سبب افزایش ۱۲.۱۳-di.Home^{۳۵} شد و تمرینات مقاومتی به صورت موقتی موجب کاهش سطوح ۱۲.۱۳-di.Home^{۳۶} شد که پس از دو ساعت ریکاوری شروع به افزایش کرد [۳۱]. همچنین گراپوف^{۳۷} و همکاران (۲۰۲۰) کاهش معناداری در سطوح ۱۲.۱۳-di.Home^{۳۸} متعاقب تمرینات هوایی با ۴۵ درصد VO_{2peak} در زنان دارای اضافه وزن مشاهده

^{۱.} Asano	^{۱۲.} cytochrome P450 (Cyp)	^{۱.} Uncoupling Protein1	8
^{۲.} Dobrzyn	^{۱۳.} epoxide hydrolases	^{۱.} Hyperlipidemia	9
^{۳.} Dihydroxylation of linoleic acid	^{۱۴.} catalyze	^{۲.} Heat Shock Protein72	0
^{۴.} 12.13-di.Home	^{۱۵.} A1C	^{۲.} Nitric Oxide	1
^{۵.} Isoleukotoxin	^{۱۶.} C-reactive Protein	^{۲.} Foryst	2
^{۶.} Palmitoleate (C16:1n7)	^{۱۷.} Fatty Acid Trance Protien1 (FATP1)	^{۲.} Morville	3
^{۷.} 9,10-diHOME	^{۱۸.} cluster of differentiation36 (CD36)	^{۲.} Gropov	4
^{۱۰.} 9,10-epOME	^{۱۹.} Fatty Acid Uptake		
^{۱۱.} linoleic acid			

نکردند [۳۲] با توجه به بررسی دلایل مختلف از جمله اهمیت موضوع، بررسی مسیرهای لیپوژنیک و لیپولیزی در سطوح سلولی مولکولی و شناخت عوامل تأثیرگذار به خصوص فعالیتهای ورزشی که می‌تواند به بیماری‌هایی مانند چاقی، هایپرلیدمی، سندروم متابولیک، بیماری‌های قلبی-عروقی و دیابت نوع دو کمک شایانی کند، همچنین استفاده زیاد از تمرینات مقاومتی و استقاماتی جهت کاهش لیپوژن و تحریک لیپولیز و تأثیرات فراوان تمرینات تناوبی شدید بر این فاکتورها وجود نتایج ضد و نقیض و در عین حال نبود پژوهشی در زمینه قبیررسی تأثیر تمرینات استقاماتی، مقاومتی و تناوبی شدید بر فاکتورهای SREBP-1c و 12.13-di.Home و 12.13-diHome ایجاد شد آیا اثر هشت هفته تمرینات مقاومتی، استقاماتی و تناوبی شدید بر بیان ژن‌های SREBP-1c بافت کبدی و 12.13-diHome عضلهٔ نعلی رت‌های نر ویستار چاق تأثیر دارد یا خیر؟

روش‌شناسی

پژوهش حاضر از نوع تجربی بود که به روش آزمایشگاهی اجرا شد. آزمودنی‌ها ۴۰ سر رت نر بالغ نژاد ویستار هشت‌هفته‌ای با میانگین وزنی ۳۲۵ ± ۴۰ گرم بودند که از انسنتیتو سرم‌سازی رازی مشهد تهیه شدند. رت‌ها در دمای محیطی ۲۲ ± ۵ درجه سانتی‌گراد، رطوبت حدود ۴۴ درصد و چرخه خواب بیداری ۱۲:۱۲ ساعت نگهداری شدند، به طوری که در دسترسی به آب و غذای استاندارد، محدودیتی نداشته باشدند. رت‌ها در قفسه‌های مخصوص جوندگان از جنس PVC با درپوش توری فلزی که کف آنها با تراشه‌های تمیز چوب پوشانده شده بود، قرار گرفتند. غذای موش‌ها از شرکت جوانه خراسان به صورت پلت‌های بسته‌بندی شده ۱۰ کیلوگرمی تهیه شد و آب مصرفی، آب شهری بود. به منظور تعیین حداکثر سرعت از آزمون فراینده استاندارد شده توسط لینداردو و همکاران [۵۵]. برای رت‌های نژاد ویستار استفاده شد [۵۵]. این آزمون شامل ۱۰ مرحله سه دقیقه‌ای است. در مرحله اول $\frac{۱}{۳}$ کیلومتر بر ساعت و در مراحل بعدی $\frac{۲}{۳}$ کیلومتر بر ساعت به سرعت نوار اضافه می‌شود. با توجه به اینکه پنج روش آزمون و امانده‌ساز توسط لینداردو و همکاران معرفی شده است که دارای شبیه‌های متفاوت‌اند، در این پژوهش از شبیه صفر درجه برای تعیین حداکثر سرعت دویدن استفاده شد و سرعت بدست‌آمده در آخرین مرحله که حیوان قادر به دویدن نبود، به عنوان حداکثر سرعت دویدن حیوان استفاده شد. در یک هفته آشناسازی با محیط نگهداری، تمامی رت‌ها به منظور آشناسازی در معرض نوار گردان (۱۰ دقیقه با سرعت ۱۰ متر بر دقیقه و پنج روز در هفته) و نردهان مخصوص موش‌ها (۳۶ پله‌ای با شبیه ۵۸ درصد و ارتفاع یک متری) قرار گرفتند. سپس رت‌ها به روش تصادفی به چهار گروه تمرین استقاماتی (ET)، گروه تمرین مقاومتی (RT)، گروه تمرین تناوبی شدید (HIIT) و گروه کنترل (CG) تقسیم شدند. در هر گروه ۱۰ سر رت قرار گرفت. همه مراحل مربوط به حیوانات با توجه به دستورالعمل اخلاقی و مجوز معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد و کد اخلاق IR.UM.REC.1400.295 انجام گرفت.

جدول ۱. آمارهای گرایش مرکزی و پراکندگی متغیرهای پژوهش

متغیر	(گرم/سانتی‌متر)	قد	شانص توده بدن (گرم/سانتی‌مترمربع ۲)	گروهها	میانگین	انحراف استاندارد
وزن (گرم)	تمرين تناوبی شدید	$۳۴۳/۳۰$	$۶۴/۶۱$			
	تمرين مقاومتی	$۳۵۸/۲۵$	$۵۳/۳۷$			
	تمرين استقاماتی	$۳۷۳/۸۰$	$۵۹/۹۶$			
	کنترل	$۳۶۰/۱۲$	$۳۷/۱۱$			
سانتی‌متر (سانتی‌متر)	تمرين تناوبی شدید	$۲۳/۹۵$	$۱/۸۹$			
	تمرين مقاومتی	$۲۴/۲۰$	$۱/۶۱$			
	تمرين استقاماتی	$۲۳/۶۲$	$۱/۵۰$			
	کنترل	$۲۳/۳۷$	$۱/۵۱$			
شانص توده بدن (گرم/سانتی‌مترمربع ۲)	تمرين تناوبی شدید	$۵/۹۷$	$۰/۸۵$			
	تمرين مقاومتی	$۶/۳۷$	$۰/۷۵$			
	تمرين استقاماتی	$۶/۴۲$	$۰/۸۴$			

		بیان ژن <i>SREBP-1</i>	
		بیان ژن diHome	
۰/۷۲	۶/۶۲	کنترل	
۱/۶۰	۲/۲۳	تمرین تناوبی شدید	
۰/۰۹	۳/۱۶	تمرین مقاومتی	
۰/۰۴	۳/۰۸	تمرین استقامتی	
۰/۰۸	۱/۰۵	کنترل	
۰/۱۳	۳/۲۷	تمرین تناوبی شدید	
۰/۰۴	۳/۲۱	تمرین مقاومتی	
۰/۱۱	۳/۱۴	تمرین استقامتی	
۰/۰۳	۱/۰۲	کنترل	

تمرین استقامتی در تمامی رت‌هایی که در گروه تمرین استقامتی قرار داشتند شامل ۱۰ دقیقه گرم کردن باشد ۵۰ تا ۴۰ درصد بیشینه روی نوار گردان (سرعت دستگاه بر حسب متر بر دقیقه) و سپس به مدت ۳۰ دقیقه باشد ۶۰ درصد سرعت بیشینه در دو هفته اول، ۶۵ درصد سرعت بیشینه در دو هفته دوم و ۷۰ درصد سرعت بیشینه در هفته پنجم به بعد بود (جدول ۲). در انتهای رتها با سرعت ۳۵ تا ۴۵ درصد سرعت بیشینه عملیات سرد کردن را انجام دادند (جدول ۱) [۳۳]. پس از چهار هفته از تمرینات، با توجه به سازگاری حیوانات با تمرین، بار دیگر از رتها آزمون و امانده‌ساز گرفته شد و شدت تمرینات بعدی بر اساس آزمون و امانده‌ساز جدید تعیین شد.

جدول ۲. پروتکل تمرین استقامتی

هفته	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	هشتم
مدت تمرین (دقیقه)	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰	۳۰
سرعت بیشینه (درصد)	۶۰	۶۰	۶۵	۶۵	۷۰	۷۰	۷۰	۷۰

در گروه تمرین مقاومتی تمرینات شامل هشت هفته صعود از نردهای یک‌متری با ۳۶ پله با شیب ۸۵ درجه بود. هر جلسه شامل سه سمت با پنج تکرار است که در فاصله هر تکرار یک دقیقه و در فاصله بین هر سمت دو دقیقه استراحت در نظر گرفته شد. تمرین پس از بستن وزنه به دم رتها، انجام گرفت. در هفته اول میزان وزنه‌های بسته شده به رتها ۵۰ درصد وزن بدن آنها بود که به تدریج ۱۰ درصد در هر هفته افزایش یافت و به ۱۲۰ درصد وزن بدن آنها در هفته پایانی رسید (جدول ۳) [۳۴]. حیوانات در طول هفته‌های پیش از شروع تمرینات با صعود از نردهای آشنا شدند. در صورت امتناع، با تحرکی دستی وادر به صعود شدند.

جدول ۳. پروتکل تمرین مقاومتی

هفته	هفتۀ اول	هفتۀ دوم	هفتۀ سوم	هفتۀ چهارم	هفتۀ پنجم	هفتۀ ششم	هفتۀ هفتم	هفتۀ هشتم
تعداد جلسات	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵
تعداد سمت	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳	۳
تکرار در هر سمت	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵	۵
استراحت بین تکرار (دقیقه)	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲	۲
استراحت بین بار (درصد وزن بدن)	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱

به منظور انجام تمرینات تناوبی ابتدا رت‌ها به مدت ۱۰ دقیقه با سرعت ۱۰ متر بر دقیقه گرم کردند. سپس به مدت دو دقیقه با سرعت ۸۵ تا ۹۰ درصد حداکثر سرعت با شیب صفر درجه دویدند. رت‌ها شش ولهه این کار را انجام دادند و بین هر ست یک دقیقه با سرعت ۱۰ به کار خود ادامه دادند. در هفته‌های بعد تمام موارد مذکور به جز تکرار ایتروال‌ها یکسان بود. ایتروال‌های دویدن از شش بار در هفته اول به ۱۲ بار در هفته هشتم رسید (جدول ۴) [۳۵].

جدول ۴. پروتکل تمرین تناوبی شدید

هفته	ولهه‌های دویدن (دو دقیقه)	سرعت دویدن (درصدی از بیشینه)	شیب نوار گردن	سرعت بین ولهه‌های دویدن (یک دقیقه) (متربردقیقه)
۶	هفته اول	۸۵ ۹۰ تا ۱۰ درصد حداکثر سرعت	.	۱۰
۷	هفته دوم	۸۵ ۹۰ تا ۱۰ درصد حداکثر سرعت	.	۱۰
۸	هفته سوم	۸۵ ۹۰ تا ۱۰ درصد حداکثر سرعت	.	۱۰
۹	هفته چهارم	۸۵ ۹۰ تا ۱۰ درصد حداکثر سرعت	.	۱۰
۱۰	هفته پنجم	۸۵ ۹۰ تا ۱۰ درصد حداکثر سرعت	.	۱۰
۱۱	هفته ششم	۸۵ ۹۰ تا ۱۰ درصد حداکثر سرعت	.	۱۰
۱۲	هفته هفتم	۸۵ ۹۰ تا ۱۰ درصد حداکثر سرعت	.	۱۰
۱۲	هفته هشتم	۸۵ ۹۰ تا ۱۰ درصد حداکثر سرعت	.	۱۰

به منظور اندازه‌گیری نشانگرهای آنتروپومتریک از دور شکم (بالا فاصله جلوی پای جلو)، دور سینه (بالا فاصله پشت پای جلو، طول بدن (فاصله بینی تا مقعد یا همان طول بینی تا مقعد) استفاده شد. همچنین وزن و طول بدن برای محاسبه نمایه توده بدن و از شاخص لی برای تعیین چاقی رت‌ها استفاده شد [۵۵].

Body mass index (BMI) = body mass (g) / length² (cm²)

Lee index = cube root of body weight (g) / nose-to-anus length (cm)

۴۸ ساعت پس از آخرین جلسه تمرین، رت‌ها با تزریق مخلوط کتابیین (۱۰۰ میلی گرم/کیلوگرم) و زایلازین (۱۰ میلی گرم/کیلوگرم) بی‌هوش شدند. پس از اطمینان از بی‌هوشی کامل حیوان، سر توسط دستگاه گیوتین جدا و بافت‌های کبد و عضله نعلی به صورت سالم توسط متخصص بافت‌شناسی حیوانی بیرون آوردند. بافت‌ها با دقت روی بخ قرار داده شدند و در مایع نیتروژن منجمد قرار گرفتند و برای تجزیه و تحلیل بعدی به یخچال با دمای منفی ۸۰ درجه سانتی‌گراد آزمایشگاه فیزیولوژی ورزش دانشکده علوم ورزشی دانشگاه فردوسی و پس از آن به آزمایشگاه خون‌شناسی بیمارستان قائم(ع) مشهد منتقل شدند.

اندازه‌گیری بیان ژن SREBP-1 و 12.13.diHome به وسیله تکنیک Real-Time-PCR سنجش و پس از کمی‌سازی مقادیر بیان ژن با استفاده از فرمول $2\Delta\Delta CT$ استفاده شد. از اهداف اصلی پژوهش، بررسی سه مدل تمرین استقامتی، مقاومتی و تناوبی شدید بر روند لیپولیز و لیپوژن توسط ژن‌های 12.13.diHome بافت عضله نعلی به عنوان معرف مسیر لیپولیزی و SREBP-1 بافت کبدی به عنوان معرف مسیر لیپوژنی بود. به همین منظور پس از بی‌هوشی و کالبدشکافی موش‌ها، بافت کبدی و عضله نعلی استخراج شد و پس از شستشو در سرم فیزیولوژیک بالا فاصله در نیتروژن مایع منجمد شد. بافت کبدی و بافت عضله نعلی، به منظور بررسی تأثیر تمرینات مقاومتی، استقامتی و تناوبی شدید و بررسی تغییرات بیان ژن‌های موردنظر بر این بافت‌ها اندازه‌گیری شد.

همچنین پس از نرمال بودن توزیع داده‌ها، به منظور نشان دادن اختلاف معناداری مقادیر ژن‌های 12.13.diHome و SREBP-1 بین گروه‌ها از روش آماری تحلیل واریانس یکطرفه و به منظور تبیین تفاوت بین گروه‌ها، از آزمون تقيیمی توکی استفاده شد. تمامی تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه ۲۲ در سطح معناداری $P < 0.05$ انجام گرفت.

یافته‌ها

نتایج تحلیل واریانس یکطرفه (جدول ۵) نشان داد که هشت هفته تمرینات استقامتی، مقاومتی و تناوبی شدید سبب افزایش بیان ژن 12.13.diHome و کاهش SREBP-1 در رت‌های ویستار نر چاق شد ($P < 0.05$). بر همین اساس به منظور بررسی اختلاف بین گروه‌ها از آزمون تعییبی توکی استفاده شد که در جدول ۶ گزارش شده است.

جدول ۵. مقایسه متغیرهای SREBP-1 و 12.13.diHome در گروه‌های مورد بررسی (گروه استقامتی ET: ۸ سر - گروه تمرین مقاومتی RT: ۱۰ سر - گروه تمرین تناوبی شدید HIIT: ۱۰ سر - گروه کنترل CG: ۸ سر)

متغیرها	گروه‌ها	گروههای استقامتی		گروههای مقاومتی		گروههای تناوبی		گروههای کنترل (CG)		معناداری	سطح	
		پیش‌آزمون	پس‌آزمون	پیش‌آزمون	پس‌آزمون	پیش‌آزمون	پس‌آزمون	(RT)	(ET)			
		HIIT	ET	HIIT	ET	HIIT	ET	HIIT	ET			
		*	۰/۰۰۱	۷/۷۷۸۷	۰/۹۹۶ ± ۰/۰۱	۱	۲/۳۵ ± ۰/۰۷۸	۱	۳/۰۵ ± ۱/۲۴	۱	۳/۱۴ ± ۱/۳۹	۱
		*	۰/۰۰۱	۹/۱۶۸	۰/۹۹۷ ± ۰/۰۴	۱	۰/۴۸۸ ± ۰/۰۳۳	۱	۰/۳۹۰ ± ۰/۰۲۸	۱	۰/۴۲۸ ± ۰/۰۲۹	۱

(سطح معناداری $P \leq 0.05$)

نتایج (جدول ۶) آزمون تعییبی توکی نشان داد بین گروه تمرین استقامتی، گروه تمرین مقاومتی و گروه تمرین تناوبی شدید با گروه کنترل در بیان ژن 12.13.diHome تفاوت معناداری وجود داشت ($P = 0.001$), اما بین گروه‌های تجربی تفاوت معناداری وجود نداشت ($P = 0.998$; $P = 0.334$; $P = 0.487$). نتایج آزمون تعییبی توکی نشان داد که بین گروه تمرین استقامتی، گروه تمرین مقاومتی و گروه تمرین تناوبی شدید با گروه کنترل در بیان ژن SREBP-1 تفاوت معناداری وجود دارد ($P = 0.001$), اما بین گروه‌های تجربی تفاوت معناداری وجود نداشت ($P = 0.991$).

جدول ۶. نتایج آزمون تعییبی توکی به منظور بررسی اختلاف بین گروه‌ها

متغیرها	گروه‌ها						سطح معناداری	
	بیان ژن 12.13.diHome		بیان ژن SREBP-1		بیان ژن 12.13.diHome			
	CG	HIIT	CG	ET	HIIT	RT		
مقایسه (CG) و (HIIT) با اختلاف P	P	۰/۰۰۱	۰/۵۰۹	* ۰/۰۰۱	۰/۶۰۷	* ۰/۰۰۱	۰/۵۶۹	
مقایسه (RT) و (CG) با اختلاف P	P	۰/۰۰۱	۰/۵۰۹	* ۰/۰۰۱	۰/۶۰۷	* ۰/۰۰۱	۰/۵۶۹	
مقایسه (ET) و (CG) با اختلاف P	P	۰/۰۰۱	۰/۵۰۹	* ۰/۰۰۱	۰/۶۰۷	* ۰/۰۰۱	۰/۵۶۹	
مقایسه (ET) و (HIIT) با اختلاف P	P	۰/۰۰۱	۰/۵۰۹	* ۰/۰۰۱	۰/۶۰۷	* ۰/۰۰۱	۰/۵۶۹	
مقایسه (RT) و (HIIT) با اختلاف P	P	۰/۰۰۱	۰/۵۰۹	* ۰/۰۰۱	۰/۶۰۷	* ۰/۰۰۱	۰/۵۶۹	
مقایسه (ET) و (RT) با اختلاف P	P	۰/۰۰۱	۰/۵۰۹	* ۰/۰۰۱	۰/۶۰۷	* ۰/۰۰۱	۰/۵۶۹	

گروه یک: تمرین استقامتی (ET) - گروه دو: تمرین مقاومتی (RT) - گروه سه: تمرین تناوبی شدید (HIIT) - گروه چهار: کنترل (CO)

(سطح معناداری $P \leq 0.05$)

با توجه به اختلاف معنادار در متغیرهای پژوهشی بین گروه‌های تجربی، لازم است که تأثیر مداخله‌های پژوهشی بر آزمودنی‌ها بررسی شود. جدول ۷ به بررسی متغیرهایی که بین سه گروه تجربی تفاوت وجود داشت، اشاره می‌کند و نشان می‌دهد کدام گروه تمرینی بیشترین درصد تغییرات و میزان اثرگذاری را در آزمودنی‌ها داشته است. در این جدول میزان درصد تغییرات و اندازه اثر محاسبه و از فرمول‌های آماری زیر استفاده شد.

$$\text{درصد تغییرات} = [(\text{میانگین پس‌آزمون} - \text{میانگین پیش‌آزمون}) / \text{میانگین پیش‌آزمون}] * 100$$

¹. Percentage of changes (PC)


². Effect size (ES)

اندازه اثر: (میانگین پیش آزمون – میانگین پس آزمون) / انحراف استاندارد پیش آزمون


جدول ۷. درصد تغییرات و اندازه اثر

متغیرها	گروه‌ها	اندازه اثر٪	ضریب تغییرات٪	میانگین‌ها	تفاوت
				پیش آزمون	میانگین‌ها
بیان ژن	HIIT	۴۰	۲۵	0.48 ± 0.3	$0/12$
SREBP-1	ET	۹۰	۴۲/۸۵	0.42 ± 0.2	$0/18$
RT		۱۰۵	۵۳/۸۴	0.39 ± 0.2	$0/21$
بیان ژن	HIIT	۱۹۲/۸۵	۵۷/۴۴	0.35 ± 0.7	$1/35$
12.13.diHome	ET	۱۶۴/۶۱	۶۸/۱۵	0.14 ± 0.3	$2/14$
RT		۱۷۰/۸۳	۶۷/۲۱	0.05 ± 0.2	$2/05$

نتایج روش‌های آماری اندازه اثر و درصد تغییرات در جدول ۷ نشان داد تمرينات مقاومتی نسبت به تمرينات تناوبی شدید و تمرينات استقامتی، تأثیر بیشتری بر تغییرات ژن‌های SREBP-1 و 12.13.diHome داشته است.



شکل ۱. تغییرات بین گروهی بیان ژن SREBP-1



شکل ۲. تغییرات بین گروهی بیان ژن diHome

بحث

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هشت هفته تمرینات استقامتی، مقاومتی و تناوبی شدید سبب افزایش معنادار بیان ژن *12.13.diHome* و کاهش معنادار *SREBP-1* در رت‌های نر ویستار چاق شد.

با توجه به نتایج همسو با نتایج حاضر [۹، ۱۳، ۲۱، ۲۳، ۳۶-۴۲] و نتایج نامهمسو [۲۰، ۴۳-۴۷] نیز به بحث دقیق‌تر و جامع‌تر بر تغییرات این دو ژن متعاقب تمرینات ورزشی الزامی است.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هشت هفته تمرینات استقامتی، مقاومتی و تناوبی شدید سبب کاهش بیان ژن *SREBP-1* بافت کبدی در رت‌های نر ویستار چاق شد.

از دلایل احتمالی کاهش بیان ژن *SREBP-1* بافت کبدی متعاقب تمرینات استقامتی، مقاومتی و تناوبی شدید در پژوهش حاضر، افزایش فعالیت گیرنده ایکس فازنزوید است. FXR نقشی کلیدی در هوموستاز کلسترول و اسیدهای صفراء را بر عهده دارد. فعال شدن FXR سبب تنظیم مثبت گیرنده لیپوپروتئین بسیار پرچگال^۱ و تعدیل برداشت کبدی LDL می‌شود. علاوه‌بر این، FXR در چرخه انتقال مکوکس کلسترول^۲ از بافت‌های محیطی به کبد دخیل است و با تنظیم منفی *SREBP-1*^۳، و ژن‌های حذف آن از طریق ژن هترودیمری کوچک شریک^۴، مسیر سنتر اسیدها چرب و کلسترول را مهار می‌کند [۶]. در نتیجه می‌توان این احتمال را بیان کرد که از علل کاهش بیان *12.13.diHome* بافت کبدی متعاقب تمرینات استقامتی، مقاومتی و تناوبی شدید در رت‌های نر ویستار چاق در این پژوهش، افزایش فعالیت FXR باشد. برخی تحقیقات نیز گزارش کردنده که آنزیم‌های لیپوژنیک مانند *SREBP-1* تحت تأثیر فعالیت‌های ورزشی قرار می‌گیرند. فعالیت‌های ورزشی بر اساس نوع و شدت، تأثیرات مختلفی بر ساخت و ساز چربی‌ها می‌گذارد. در تحقیقی ۱۲ هفته تمرین هوایی سبب کاهش سطوح *SREBP-1* در سلول‌های گردش خون محیطی شد [۱۳]. فعالیت ورزشی اغلب از طریق مسیر APMK^۵ و کاهش

۱. Farnesoid X Receptor (FXR)

۳. Reverse cholesterol transport

۵. AMP-activated protein kinase

۲. Very Low-Density Lipoprotein

(RCT)

Receptor

۴. Small Heterodimer Partner

تعداد گیرنده‌های A1 سطح کبد، موجب سرکوب مسیر لیپوژنیتیکی SREBP-1 کبد می‌شود [۱۴]. پس می‌توان گفت که از دلایل دیگر کاهش بیان ژن SREBP-1 بافت کبدی متعاقب تمرینات استقامتی، مقاومتی و تناوبی شدید در رتهای نر ویستار چاق، فعال شدن AMPK و مسیرهای پایین‌دستی داخل‌سلولی آن باشد. از طرفی برخی تحقیقات به این مسئله مهر تأیید زدند که کاهش سنتر لیپیدها در گیرنده‌های از گیرنده‌های سلولی به نام گیرنده‌های سلولی پروگسیزومی باشد. گیرنده‌های از گیرنده‌های سلولی که تنظیم کننده‌های کلیدی اکسیداسیون اسیدهای چرب است، متعاقب تمرینات ورزشی فعال و سبب مهار فعالیت SREBP-1 می‌شود. در تأیید این موضوع پژوهشی گزارش کرد تمرینات هوایی با افزایش بیان ژن PPAR-a سبب مهار SREBP-1 می‌شود [۴۱]. پس می‌توان گفت که یکی دیگر از دلایل احتمالی کاهش بیان ژن SREBP-1 بافت کبدی، افزایش بیان ژن PPAR-a باشد که سبب مهار SREBP-1 می‌شود. علاوه‌بر این، برخی دلایل دیگر را می‌توان به این موارد اضافه کرد که دلیلی بر کاهش بیان ژن SREBP-1 متعاقب تمرینات ورزشی باشد که به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.

پروتئین‌های خانواده آدنوزین دی‌فسفات‌ریبوز پلیمراز^۳، خانواده‌ای از پروتئین‌های سلولی اند که در پروسه‌های سلولی مانند اختلالات مربوط به DNA، مرگ برنامه‌ریزی‌شده سلولی و سوخت‌وساز لیپیدها دخالت دارند. با کاهش فعالیت گیرنده ایکس کبدی، سبب کاهش بیان SREBP-1 و تجمع لیپیدها در کبد می‌شوند [۴۸]. در تأیید این موضوع، سزانتو^۴ و همکاران (۲۰۲۱) تأیید کردند که کاهش بیان ژن SREBP-1 می‌تواند به دلیل تأثیر PARP7 بر مسیر سیگنالینگ LXR/SREBP-1 باشد [۴۹]. همچنین خانواده‌ای از پروتئین‌های بازدارنده به نام پروتئین بازدارنده پستانداران فعال^۵ که شامل چهار زیرواحد؛ PIAS1، PIAS2 و PIAS3، با فعال کردن لیگازهاسوموای^۶، سبب مهار SREBP-1 می‌شوند و از این طریق در مهار سنتر لیپیدها نقش دارند.

در واقع SUMOE3 به روش اتصال به سومولوسی^۷ شهرت دارد که واکنش سریع و برگشت‌پذیر است و توسط پروتئین‌هایی به نام سوموپروتئین^۸ و آنزیمهای لیگاز^۹ اختصاصی لیگاز ۱، لیگاز ۲ و لیگاز ۳ اتفاق می‌افتد [۵۰]. چنفی^{۱۰} و همکاران (۲۰۲۲) گزارش کردند که تمرینات استقامتی سبب افزایش فعالیت سومولوسیون E3 و کاهش سطوح SREBP-1 و گزارش کاهش تجمع لیپیدها می‌شود [۳۷]. همچنین گهلهرت^{۱۱} و همکاران (۲۰۱۶) گزارش کردند که تمرینات مقاومتی باشد بالا سبب افزایش SUMO-1 و این افزایش موجب کاهش تجمع لیپیدها می‌شود [۵۱]. علاوه‌بر این، برخی تحقیقات گزارش کردند که عضلات اسکلتی متعاقب تمرینات مقاومتی با ارسال پیام‌ها و ترشح برخی هورمون‌ها، سبب کاهش تجمع لیپیدها در کبد می‌شوند. در تأیید این موضوع، تحقیقی نیز گزارش کرد که سبب ایجاد تغییرات مناسب در جهت کاهش تجمع و انباست لیپیدها در کبد می‌شوند. در تأیید این موضوع، تحقیقی نیز گزارش کرد که تمرینات مقاومتی با تحریک ترشح آبریزین^{۱۲} و میتئورین^{۱۳} و تحریک SREBP-1، سبب مهار PGC1a کبدی و مانع انباست لیپیدها در کبد می‌شوند [۴۰]. همچنین متعاقب تمرینات ورزشی و بررسی تغییرات بیان ژن SREBP-1، می‌توان به افزایش هورمون آدیپونکتین اشاره کرد. آدومسینپراسرت^{۱۴} و همکاران (۲۰۱۸) گزارش کردند که این هورمون با اتصال به گیرنده‌های آدیپورسپتور^{۱۵} سبب فعال شدن پروتئین تعامل آدیپتور فسفوتویروزین^{۱۶} می‌شود. APP1 با تحریک PPARα و AMPK، سبب فسفوریالاسیون و مهار SREBP-1 می‌شود [۵۲]. دیگر هورمون تأثیرگذار بر تغییرات SREBP-1 لپتین است. لپتین، آدیپوکاینی است که موجب ایجاد تغییرات زیادی در بدن می‌شود و در کاهش اشتها توسط نروپیپتید^{۱۷}، افزایش مصرف انرژی با تحریک هورمون آزادکننده تیروزین^{۱۸} و هورمون آزادکننده گنادوتروپین^{۱۹} نقش دارد. این تغییرات در نهایت سبب مهار SREBP-1 و از این طریق مهار لیپوژن و کاهش تولید اسیدهای چرب در کبد می‌شود [۵۳].

۱. Peroxisomal cell receptors

۷. SUMOylation

۱۰. adaptor protein phosphotyrosine interaction(APPL1)

۲. Peroxisome Proliferator Activated Receptor Alpha (PPAR-α)

۸. SUMOprotein

۱۱. Neuropeptide Y

۳. Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP)

۹. E ligas

۱۲. Thyrotropin-releasing hormone (TRH)

۴. Szántó

۱. Chenfei

۰

۱۳. Gonadotropin-releasing hormone (GnRH)

۵. The mammalian protein inhibitor of activated STAT (PIASs)

۱. Gehlert

۱

۶. SUMO E3 ligase

۱. Irisin

۲

[۵۳] پس می‌توان گفت که دلیل احتمالی دیگر کاهش بیان ۱- SREBP متعاقب تمرینات استقامتی، مقاومتی و تناوبی شدید در رت‌های نر ویستار چاق، سطوح آدیپونکتین و لپتین باشد. دیگر هورمون‌هایی که سبب کاهش بیان و فعالیت ۱-SREBP می‌شوند، گلوکاگن و آدرنالین هستند این دو هورمون توسط آبشار سیگنانالینگ پروتئین کینار^A، سبب مهار ۱-SREBP می‌شوند. البته هنوز جزئیات دقیق این مسیر شناخته نشده است، اما لاندون^۲ و همکاران (۲۰۲۲) گزارش کردند که گلوکاگن و آدرنالین از عوامل مهاری ۱-SREBP محسوب می‌شوند.^[۵۴]

در مجموع می‌توان نتیجه گرفت که کاهش بیان ۱-SREBP بافت کبدی متعاقب تمرینات استقامتی، مقاومتی و تناوبی شدید در رت‌های نر ویستار چاق، احتمالاً به دلیل افزایش فعالیت NEM، PIASs، PARP7، SUMO/E3، گلوکاگن، آدرنالین، لپتین و آدیپونکتین باشد.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که هشت هفته تمرینات استقامتی، مقاومتی و تناوبی شدید سبب افزایش بیان ۱-SREBP عضله ۱2.13-diHome نعلی در رت‌های نر ویستار چاق شد. از دلایل احتمالی افزایش بیان ۱-SREBP عضله ۱2.13-diHome، سومولوسیون^B، آدرنالین، گلوکاگن، آدنالین، لپتین و تناوبی شدید در رت‌های نر ویستار چاق، افزایش سطوح اپی‌نفرین و توده چربی قهقهه‌ای است.

تحقیقی گزارش کرد که متعاقب انجام انواع تمرینات ورزشی، سطوح اپی‌نفرین و توده چربی قهقهه‌ای افزایش می‌باشد در تأیید این موضوع، لاینس^۳ و همکاران (۲۰۱۷) گزارش کردند که افزایش اپی‌نفرین و سطوح چربی قهقهه‌ای سبب افزایش بیان ۱-SREBP عضله ۱2.13-diHome می‌شود.^[۲۶] با ایجاد ارتباط علمی و منطقی بین این تحقیقات، به افزایش بیان ۱-SREBP عضله نعلی در پی افزایش سطوح اپی‌نفرین و توده بدون چربی متعاقب تمرینات استقامتی، مقاومتی و تناوبی شدید در رت‌های نر ویستار چاق پی برد. از طرفی، لاینس و همکاران (۲۰۱۷) گزارش کردند که فعالیت ورزشی استقامتی با افزایش آنزیم‌های اپوکسیدهیدرولاز^۴ مانند اپوکسیدهیدرولاز^۵ و اپوکسیدهیدرولاز^۶ که از بافت چربی ترشح می‌شوند، در افزایش سطوح پروتئینی و بیان ۱-SREBP عضله ۱2.13-diHome نقش دارند. افزایش بیان ۱-SREBP در عضلات اسکلتی سبب افزایش بیان چندین ژن مانند ژن‌های درگیر در فعالیت میتوکندریایی مانند سیترات سنتاز، فاکتور تنفسی هسته‌ای^۷ و فاکتور تنفسی هسته‌ای^۸، انتقال دهنده‌های اسید چرب مانند پروتئین انتقال دهنده اسید چرب^۹ و SD36 می‌شود.^[۲۶] در نتیجه می‌توان افزایش آنزیم‌های اپوکسیدهیدرولاز را از دلایل افزایش بیان ۱-SREBP عضله نعلی متعاقب تمرینات استقامتی، مقاومتی و تناوبی شدید در رت‌های نر ویستار چاق معرفی کرد.

نتیجه گیری

نتیجه اینکه، تمرینات استقامتی، مقاومتی و تناوبی شدید با تأثیر بر عوامل تأثیرگذار بر لیپولیز و لیپوژن سبب کاهش توده چربی می‌شوند. در حالی که تفاوتی بین انواع تمرینات ارائه شده در این پژوهش وجود نداشت، اما پیشنهاد می‌شود از این تمرینات به منظور کاهش توده چربی استفاده شود. نتایج نشان داد که سه مدل تمرینات استقامتی، مقاومتی و تناوبی شدید به دلیل ایجاد تغییرات داخل‌سلولی و تحریک مسیرهای لیپولیزی و لیپوژنیکی در میزان توده چربی نقش زیادی دارند که این تغییرات در سطوح ژنی به این روند کمک زیادی می‌کند.

تقدیر و تشکر

از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد / دانشکده علوم ورزشی به سبب حمایت مالی / حمایت معنوی / همکاری در اجرای پژوهش حاضر سپاسگزاری می‌شود. همچنین از آقای دکتر رشید لمیر / خانم دکتر ناهید بیژن به خاطر بازبینی متن مقاله و ارائه نظرهای

^{۱۴}. PKA

^{۱۵}. Lee

^{۱۶}. Lynes

^۴. Epoxide hydrolase (EHs)

^۵. Ephx1

^۶. Ephx2

^۷. Nuclear respiratory factor 1

^۸. Nuclear respiratory factor 2

^۹. Fatty acid transfer protein 4

ساختاری ت歇کر و قدردانی می‌شود. نگارندگان بر خود لازم می‌دانند از آقای دکتر حسینی کاخکی بهدلیل مطالعه متن مقاله و ارائه نظرهای ارزشمند سپاسگزاری کنند.

References

- [1] Cimini FA, Barchetta I, Ciccarelli G, Leonetti F, Silecchia G, Chiappetta C, Di Cristofano C, Capoccia D, Bertoccini L, Ceccarelli V, Carletti R. Adipose tissue remodelling in obese subjects is a determinant of presence and severity of fatty liver disease. *Diabetes/Metabolism Research and Reviews*. 2021 Jan;37(1):e3358. <https://doi.org/10.1002/dmrr.3358>
- [2] Ramos LF, Silva CM, Pansa CC, Moraes KC. Non-alcoholic fatty liver disease: molecular and cellular interplays of the lipid metabolism in a steatotic liver. *Expert Review of Gastroenterology & Hepatology*. 2021 Jan 2;15(1):25-40.<https://doi.org/10.1080/17474124.2020.1820321>
- [3] Yan F, Wang Q, Lu M, Chen W, Song Y, Jing F, Guan Y, Wang L, Lin Y, Bo T, Zhang J. Thyrotropin increases hepatic triglyceride content through upregulation of SREBP-1c activity. *Journal of Hepatology*. 2014 Dec 1;61(6):1358-64.<https://doi.org/10.1016/j.jhep.2014.06.037>
- [4] Zhou Z, Liang S, Zhou Z, Liu J, Zhang J, Meng X, Zou F, Zhao H, Yu C, Cai S. TGF- β 1 promotes SCD1 expression via the PI3K-Akt-mTOR-SREBP1 signaling pathway in lung fibroblasts. *Respiratory Research*. 2023 Dec;24(1):1-5. <https://doi.org/10.1186/s12931-023-02313-9>
- [5] Wu L, Guo T, Deng R, Liu L, Yu Y. Apigenin ameliorates insulin resistance and lipid accumulation by endoplasmic reticulum stress and SREBP-1c/SREBP-2 pathway in palmitate-induced HepG2 cells and high-fat diet-fed mice. *Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics*. 2021 Apr 1;377(1):146-56.<https://doi.org/10.1124/jpet.120.000162>
- [6] Jayachandran M, Zhang T, Wu Z, Liu Y, Xu B. Isoquercetin regulates SREBP-1C via AMPK pathway in skeletal muscle to exert antihyperlipidemic and anti-inflammatory effects in STZ induced diabetic rats. *Molecular Biology Reports*. 2020 Jan;47:593-602.<https://doi.org/10.1007/s11033-019-05166-y>
- [7] Nakamura M, Fujino T, Yada R, Yada M, Yasutake K, Yoshimoto T, Harada N, Higuchi N, Kato M, Kohjima M, Taketomi A. Impact of cholesterol metabolism and the LXRx-SREBP-1c pathway on nonalcoholic fatty liver disease. *International journal of molecular medicine*. 2009 May 1;23(5):603-8.https://doi.org/10.3892/ijmm_00000170
- [8] Sun Q, Yu X, Peng C, Liu N, Chen W, Xu H, Wei H, Fang K, Dong Z, Fu C, Xu Y. Activation of SREBP-1c alters lipogenesis and promotes tumor growth and metastasis in gastric cancer. *Biomedicine & Pharmacotherapy*. 2020 Aug 1;128:110274.. <https://doi.org/10.1016/j.biopha.2020.110274>
- [9] Abukhalil MH, Hussein OE, Bin-Jumah M, Saghir SA, Germoush MO, Elgebaly HA, Mosa NM, Hamad I, Qarmush MM, Hassanein EM, Kamel EM. Farnesol attenuates oxidative stress and liver injury and modulates fatty acid synthase and acetyl-CoA carboxylase in high cholesterol-fed rats. *Environmental Science and Pollution Research*. 2020 Aug;27:30118-32.<https://doi.org/10.1038/labinvest.2014.98>
- [10] Abukhalil MH, Hussein OE, Bin-Jumah M, Saghir SA, Germoush MO, Elgebaly HA, Mosa NM, Hamad I, Qarmush MM, Hassanein EM, Kamel EM. Farnesol attenuates oxidative stress and liver injury and modulates fatty acid synthase and acetyl-CoA carboxylase in high cholesterol-fed rats. *Environmental Science and Pollution Research*. 2020 Aug;27:30118-32.. <https://doi.org/10.1007/s11356-020-09296-w>
- [11] Zhang W, Li JY, Wei XC, Wang Q, Yang JY, Hou H, Du ZW, Wu XA. Effects of dibutyl phthalate on lipid metabolism in liver and hepatocytes based on PPAR α /SREBP-1c/FAS/GPAT/AMPK signal pathway. *Food and Chemical Toxicology*. 2021 Mar 1;149:112029. <https://doi.org/10.1016/j.fct.2021.112029>
- [12] Sharma A, Anand SK, Singh N, Dwarkanath A, Dwivedi UN, Kakkar P. Berbamine induced activation of the SIRT1/LKB1/AMPK signaling axis attenuates the development of hepatic steatosis in high-fat diet-induced NAFLD rats. *Food & Function*. 2021;12(2):892-909.<https://doi.org/10.1039/DFOO2501A>
- [13] Oh S, Shida T, Yamagishi K, Tanaka K, So R, Tsujimoto T, Shoda J. Moderate to vigorous physical

- activity volume is an important factor for managing nonalcoholic fatty liver disease: a retrospective study. *Hepatology*. 2015 Apr;61(4):1205-15.. <https://doi.org/10.1002/hep.27544>
- [14] Cintra DE, Ropelle ER, Vitto MF, Luciano TF, Souza DR, Engelmann J, Marques SO, Lira FS, de Pinho RA, Pauli JR, De Souza CT. RETRACTED: Reversion of hepatic steatosis by exercise training in obese mice: the role of sterol regulatory element-binding protein-1c..<https://doi.org/10.1016/j.lfs.2012.08.002>
- [15] Yang J, Sáinz N, Félix-Soriano E, Gil-Iturbe E, Castilla-Madrigal R, Fernández-Galilea M, Martínez JA, Moreno-Aliaga MJ. Effects of long-term DHA supplementation and physical exercise on non-alcoholic fatty liver development in obese aged female mice. *Nutrients*. 2021 Feb 3;13(2):501.<https://doi.org/10.3390/nu13020501>
- [16] Ebrahimi.M, Fathi, R, Ansari-Pirsaraei, Z, Talebigerkani.E. Relative expression of key lipid metabolism genes following high-fat diet and aerobic exercise in rat liver. *Sport physiology*. 2017;34(9):201-16. <https://doi.org/10.22089/spj.2017.2767.1374>.[in persian].
- [17] Hedayati katouli A, Azarbajjani M, Banaeifar A, Arshadi S. The Effect of Aerobic Training and Adenosine on the Expression of SREBP-1C and A1 Receptor in Hepatic Fat-fed Rats. *Iranian J Nutr Sci Food Technol* 2019; 14 (1) :1-9 <http://nsft.sbm.ac.ir/article-1-2703-fa.html>.[in persian].
- [18] Jeong S. Regulation of PPAR and SREBP-1C Through Exercise in White Adipose Tissue of Female C57BL/6J Mice. *대한의생명과학회지*. 2012 Sep;18(3):227-36.
- [19] Haun CT, Mobley CB, Vann CG, Romero MA, Roberson PA, Mumford PW, Kephart WC, Healy JC, Patel RK, Osburn SC, Beck DT. Soy protein supplementation is not androgenic or estrogenic in college-aged men when combined with resistance exercise training. *Scientific reports*. 2018 Jul 24;8(1):11151.. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-29591-4>
- [20] Asano M, Iwagaki Y, Sugawara S, Kushida M, Okouchi R, Yamamoto K, Tsuduki T. Effects of Japanese diet in combination with exercise on visceral fat accumulation. *Nutrition*. 2019 Jan 1;57:173-82.<https://doi.org/10.1016/j.nut.2018.05.023>
- [21] Dobrzyn P, Pyrkowska A, Jazurek M, Szymanski K, Langfort J, Dobrzyn A. Endurance training-induced accumulation of muscle triglycerides is coupled to upregulation of stearoyl-CoA desaturase 1. *Journal of Applied Physiology*. 2010;109(6):1653-61 <https://doi.org/10.1152/japplphysiol.00598.2010>
- [22] Ziaaldini MM, Koltai E, Csende Z, Goto S, Boldogh I, Taylor AW, Radak Z. Exercise training increases anabolic and attenuates catabolic and apoptotic processes in aged skeletal muscle of male rats. *Experimental gerontology*. 2015 Jul 1;67:9-14.<https://doi.org/10.1016/j.exger.2015.04.008>
- [23] Symonds M, Bloor I, Galvez F, Domfeh E, Maicas B, Poston L, et al. Effect of a dietary and exercise intervention during pregnancy and lactation on white adipose tissue gene profiles and adiposity with maternal obesity. *The FASEB Journal*. 2016;30:1214.3-.3. https://doi.org/10.1096/fasebj.30.1_supplement.1214.3
- [24] Sui SX, Williams LJ, Holloway-Kew KL, Hyde NK, Pasco JA. Skeletal muscle health and cognitive function: A narrative review. *International journal of molecular sciences*. 2020;22(1):255. <https://doi.org/10.3390/ijms22010255>
- [25] Hildreth K, Kodani SD, Hammock BD, Zhao L. Cytochrome P450-derived linoleic acid metabolites EpOMEs and DiHOMEs: a review of recent studies. *The Journal of nutritional biochemistry*. 2020;86:108484. <https://doi.org/10.1016/j.jnutbio.2020.108484>
- [26] Lynes MD, Leiria LO, Lundh M, Bartelt A, Shamsi F, Huang TL, et al. The cold-induced lipokine 12, 13-diHOME promotes fatty acid transport into brown adipose tissue. *Nature medicine*. 2017;23(5):631-7. <https://doi.org/10.1038/nm.4297>
- [27] Badi I, Antoniades C. Brown Adipose Tissue and the Take (12, 13-di) HOME Message to the Heart. *Am Heart Assoc*; 2021. p. 160-2. <https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.051981>
- [28] Pinckard KM, Shettigar VK, Wright KR, Abay E, Baer LA, Vidal P, et al. A novel endocrine role for the BAT-released lipokine 12, 13-diHOME to mediate cardiac function. *Circulation*. 2021;143(2):145-59.

<https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.120.049813>

- [29] Foryst-Ludwig A, Kreissl MC, Benz V, Brix S, Smeir E, Ban Z, Januszewicz E, Salatzki J, Grune J, Schwanstecher AK, Blumrich A. Adipose tissue lipolysis promotes exercise-induced cardiac hypertrophy involving the lipokine C16: 1n7-palmitoleate. *Journal of Biological Chemistry.* 2015 Sep 25;290(39):23603-15 <https://doi.org/10.1074/jbc.M115.645341>
- [30] Stanford KI, Lynes MD, Takahashi H, Baer LA, Arts PJ, May FJ, et al. 12, 13-diHOME: an exercise-induced lipokine that increases skeletal muscle fatty acid uptake. *Cell metabolism.* 2018;27(5):1111-20. e3. <https://doi.org/10.1016/j.cmet.2018.03.020>
- [31] Morville T, Sahl RE, Moritz T, Helge JW, Clemmensen C. Plasma metabolome profiling of resistance exercise and endurance exercise in humans. *Cell reports.* 2020;33(13):108554. <https://doi.org/10.1016/j.celrep.2020.108554>
- [32] Grapov D, Fiehn O, Campbell C, Chandler CJ, Burnett DJ, Souza EC, Casazza GA, Keim NL, Hunter GR, Fernandez JR, Garvey WT. Impact of a weight loss and fitness intervention on exercise-associated plasma oxylipin patterns in obese, insulin-resistant, sedentary women. *Physiological reports.* 2020 Sep;8(17):e14547.<https://doi.org/10.14814/phy2.14547>
- [33] Steki A, Valipour V, Ghahramanlo E, Kargarfard M. The effect of endurance training in air pollution on the expression of brain cortex PGC-1 α and Atf2 genes in Wistar male rats. *KAUMS Journal (FEYZ).* 2019;23(6):615-26 <http://feyz.kaums.ac.ir/article-1-3955-fa.html>. [in persian].
- [34] Karbasi S, Zaeemi M, Mohri M, Rashidlamir A, Moosavi Z. Effects of testosterone enanthate and resistance training on myocardium in Wistar rats; clinical and anatomical pathology. *Andrologia.* 2018 Apr;50(3):e12908.. <https://doi.org/10.1111/and.12908>
- [35] Norouzi Moin, Sadegh Yabas *, Pakdehimhadseh Aksir, Turabi Ghasem. 1400. The effect of eight weeks of intense intermittent exercise and caffeine consumption on the expression of glycogen synthase and the amount of liver glycogen in large diabetic rats. *Medical Scholar* 156. 41-55/[in persian].
- [36] Ikeda S, Miyazaki H, Nakatani T, Kai Y, Kamei Y, Miura S, Tsuboyama-Kasaoka N, Ezaki O. Up-regulation of SREBP-1c and lipogenic genes in skeletal muscles after exercise training. *Biochemical and biophysical research communications.* 2002 Aug 16;296(2):395-400. [https://doi.org/10.1016/S0006-291X\(02\)00883-5](https://doi.org/10.1016/S0006-291X(02)00883-5)
- [37] Chenfei Z, Haizhen Y, Jie X, Na Z, Bo X. Effects of aerobic exercise on hippocampal SUMOylation in APP/PS1 transgenic mice. *Neuroscience Letters.* 2022 Jan 10;767:136303.<https://doi.org/10.1016/j.neulet.2021.136303>
- [38] Egan B, Sharples AP. Molecular responses to acute exercise and their relevance for adaptations in skeletal muscle to exercise training. *Physiological Reviews.* 2023 Jul 1;103(3):2057-170 <https://doi.org/10.1152/physrev.00054.2021>
- [39] Ghiasi S, Bashiri J, Pourrazi H, Jadidi RP. The Effect of High-Intensity Interval Training and Coenzyme Q10 on the Expression of Hepatic IRS-2 and SREBP1 Proteins in Obese Male Rats. *Gene, Cell and Tissue.* 2021;8(4). <https://doi.org/10.52547/joeppa.15.2.29> .[in persian].
- [40] Bae JY. Resistance exercise regulates hepatic lipolytic factors as effective as aerobic exercise in obese mice. *International Journal of Environmental Research and Public Health.* 2020 Nov;17(22):8307. <https://doi.org/10.3390/ijerph17228307>
- [41] Ebrahimi M, Fathi R, Ansari Pirsarii Z, Talebi-Garakani E. Relative gene expression of key genes involved in lipid metabolism, following high fat diet and moderate and high intensity aerobic training in rat's liver. *Sport Physiology.* 2017;9(34):201-16. <https://doi.org/10.22089/spj.2017.2767.1374>
- [42] Azarbayjani M, Banaeifar A, Arshadi S. The Effect of Aerobic Training and Adenosine on the Expression of SREBP-1C and A1 Receptor in Hepatic Fat-fed Rats. *Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology.* 2019;14(1):1-9. . <http://nsft.sbu.ac.ir/article-1-2703-fa.html>.[in persian].
- [43] Shahouzehi B, Masoumi-Ardakani Y, Nazari-Robati M, Aminizadeh S. The Effect of High-intensity

- Interval Training and L-carnitine on the Expression of Genes Involved in Lipid and Glucose Metabolism in the Liver of Wistar Rats. Brazilian Archives of Biology and Technology. 2022;66. <https://doi.org/10.22089/spj.2019.6447.1818> .[in persian].
- [44] Zarei F, Sherafati Moghadam M, Shabani M, Jokar M. the effects of 4 weeks high intensity interval training on mammalian rapamycin target protein (mTOR) and sterol transcription factor regulatory protein-1 (srebp1) proteins content in diabetics obese rats adipose tissue. Iranian Journal of Diabetes and Metabolism. 2020;19(1):26-35. <http://ijdld.tums.ac.ir/article-1-5905-fa.html> . [in persian].
- [45] Teixeira GR, Mendes LO, Veras ASC, Thorpe HHA, Fávaro WJ, de Almeida Chuffa LG, et al. Physical resistance training-induced changes in lipids metabolism pathways and apoptosis in prostate. Lipids in Health and Disease. 2020;19(1):1-9. <https://doi.org/10.1186/s12944-020-1195-0>
- [46] Nadeau KJ, Ehlers LB, Aguirre LE, Moore RL, Jew KN, Ortmeyer HK, Hansen BC, Reusch JE, Draznin B. Exercise training and calorie restriction increase SREBP-1 expression and intramuscular triglyceride in skeletal muscle. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism. 2006 Jul;291(1):E90-8. <https://doi.org/10.1152/ajpendo.00543.2005>
- [47] Jokar M, Zarei F, Sharafati M*, Alizadeh P. H. . The effect of 8 weeks of endurance training on the content of mTOR and SREBP1 proteins in the subcutaneous fat tissue of obese male Sprague-Dawley rats with type 2 diabetes. Shahid Sadoughi University of Medical Sciences Yazd. 2019 . 2755-2765. <http://ijdld.tums.ac.ir/article-1-5996-fa.html> .[in persian].
- [48] Yu Z, Feng Z, Fu L, Wang J, Li C, Zhu H, Xie T, Zhou J, Zhou L, Zhou X. Qingluotongbi formula regulates the LXRA-ERS-SREBP-1c pathway in hepatocytes to alleviate the liver injury caused by Tripterygium wilfordii Hook. f. Journal of Ethnopharmacology. 2022 Apr 6;287:114952.. <https://doi.org/10.1016/j.jep.2021.114952>
- [49] Szántó M, Gupte R, Kraus WL, Pacher P, Bai P. PARPs in lipid metabolism and related diseases. Progress in Lipid Research. 2021 Nov 1;84:101117.<https://doi.org/10.1016/j.plipres.2021.101117>
- [50] Vertegaal AC. Signalling mechanisms and cellular functions of SUMO. Nature Reviews Molecular Cell Biology. 2022 Nov;23(11):715-31<https://doi.org/10.1038/s41580-022-00500-y>
- [51] Gehlert S, Klinz FJ, Willkomm L, Schiffer T, Suhr F, Bloch W. Intense resistance exercise promotes the acute and transient nuclear translocation of small ubiquitin-related modifier (SUMO)-1 in human myofibres. International Journal of Molecular Sciences. 2016 Apr 29;17(5):646.<https://doi.org/10.3390/ijms17050646>
- [52] Udomsinprasert W, Honsawek S, Poovorawan Y. Adiponectin as a novel biomarker for liver fibrosis. World journal of hepatology. 2018 Oct 10;10(10):708.<https://doi.org/10.4254/wjh.v10.i10.708>
- [53] Liu Y, Li Y, Liang J, Sun Z, Wu Q, Liu Y, Sun C. Leptin: an entry point for the treatment of peripheral tissue fibrosis and related diseases. International Immunopharmacology. 2022 May 1;106:108608. <https://doi.org/10.1016/j.intimp.2022.108608>
- [54] London E, Stratakis CA. The regulation of PKA signaling in obesity and in the maintenance of metabolic health. Pharmacology & Therapeutics. 2022 Jan 17;108113.<https://doi.org/10.1016/j.pharmthera.2022.108113>
- [55] Leandro CG, Levada AC, Hirabara SM, MANHAS-DE-CASTRO RA, De-Castro CB, Curi R, Pithon-Curi TC. A program of moderate physical training for wistar rats based on maximal oxygen consumption. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2007 Aug 1;21(3):751-6. <https://doi.org/10.1519/R-20155.1>